Opusculū repertorij pronosticon in mutationes aeris tam via astrologica q̄3 metheorologica vti sapiētes experientia comperientes voluerunt ꝑq̄3 vtilissime ordinatū incipit sidere felici ⁊ primo prohemiū.

Um i multis voluminibus sapientes antiqui de mutationibus aeris multa scripta fecerunt ⁊ diuersimode de hac materia tractauerūt: Quidā eni cū alijs a ꝓposito extraneis cōmiscendo: Alij v̄o tractatus speciales ꝓlixos tn̄ ⁊ obscuros super hoc faciēdo: Alij autē tantūmodo recitando nullū tn̄ auctoris a quo dicta sua acceperunt allegando. Quia etiaȝ qui voluerit aliquid iudicare: durū ē tot libros inspicere: totiensq3 verba obscura ſm suum intellectum exponere. Auctores etiā si videant̄ discordes concordare: aut illa que faciūt ad suū ꝓpositū ab alijs separe: ꝓpter que dicta auctorū specialiter in istis ꝑtibus remanent inexꝑta. Ideo cōsideraui ꝓ bono snīas: aut dicta auctorū que faciunt ad ꝓpositū nostrū: eosq3 si discordes videant̄ ſm ꝓposse cōcordare atq3 libros ⁊ capitula quorū verba aut sententiā recitabo fideliter allegare: ut si aliquis mihi nō crediderit: aut in ꝓpositionib⁹ in hoc repertorio positis addere uel minuere voluerit ad libros de quibus me iuuare intendo facilius possit recurrere. Utilitas autem operis in hoc cōsistit ut videlicet absq3 pluriū librorū inspectiōe snīas pluriū doctorū facili⁹ ⁊ citius possum⁹ ad inuicē comꝑare: ⁊ collatione facta ad inuicē ad minus illa in quib⁹ magis cōcordare videbunt̄ tꝑib⁹ ⁊ climatib⁹ nostris ꝑ exꝑientiā certā cōprobent̄ ⁊ approbent̄ si approbanda fuerint: uel ſm exigentiā exꝑientie exponantur. Aut si isto tꝑe aut climate inutilia vi-

deanť qui de hac arte se intromittēt alias in suis iudicijs nō decipianť: libri enim plures de quibus nos iuuare intendimꝰ in alijs temporibus ⁊ climatibus facti sunt. Ideo certū est ꝙ nō easdem dispositiones debemus habere tam ꝓpter mutationem octaue sphere ⁊ aliarū que vix uel nunq̄ poterint similia redire: q̄ etiā ꝓpter diuersitatē climatū in quibꝰ eadem constellatio contrarios effectus nitiť operari. ¶ Huiꝰ autē operis septē sunt partes principales ¶ Prima pars est quasi introductoria sequentiū partiū: ⁊ est de naturis partiū celi ⁊ stellarū: quattuor etiā tēporū anni ⁊ climatū atq̧ ꝓuintiaꝝ terre. ¶ Secūda pars est de iudicijs vniuersalibus mutationū aeris ꝑ cōiunctiones magnas ⁊ eclypses: ⁊ ꝑ introitū solis in punctis equinoctialibus ⁊ solstitialibꝰ ⁊ locis alijs determinatis in zodiaco signoruz. ¶ Tertia est de iudicijs vniuersalibus mutationū aeris ꝑ cōiunctiones ⁊ oppositiones luminariū. ¶ Quarta pars est de iudicijs particularibꝰ que nō solū fiunt ꝑ cōiunctiones ⁊ oppositiones luminariū sȝ etiā ꝑ alias figuras particulares. ¶ Quinta ꝑs est de iudicijs mutationū aeris ꝑ cōiunctiones ⁊ aspectus lune cū alijs stellis: ⁊ aliarū stellarū ad inuicē ⁊ de presentia lune ⁊ aliorum a sole in certis locis zodiaci. ¶ Sexta pars est de hora pluuie ⁊ vbi ⁊ quādo fortior ⁊ debilior fuerit: ⁊ que sint loca apta ad hoc ⁊ de duratione eiusdē. ¶ Septima pars est de mutatione aeris ꝑ signalia suꝑiora que per methauroꝝ scientiā habent cognosci, ⁊ quedā alia signalia vulgariter approbata.

¶ Prima pars libri qu[illegible] est quasi introductoria sequentiū de naturis partiū celi ⁊ stellarū quattuor temporū anni climatū atq̧ prouinciarū terre incipit feliciter.

Capitulū primū de naturis ⁊ ꝓprietatibus vniuersalibus signorū ⁊ stellarum.

Dodecim sunt signa quorū qualitates vniuersaliores ⁊ nature vniuersales fm ꝙ sol operať in quolibet eorum ⁊ intensio seu remissio eiusdez nature ꝓueniens ex oꝑatiōibꝰ cōibꝰ stellarū fixarū existentiū tempore Ptolemei in partibꝰ predictorum signorū fm longitudinem ⁊ latitudinem patent ꝑ hanc tabulam.

Signa	Qualitates	Nature vniuerſales	Prime partes
Aries ♈	Igneus	facit ful- gura ⁊ to nitrua.	pluuioſe ventoſe
Taurus ♉	Terreus	duas cõple xiões hȝ pa rũ calidi ſic hu.eq̃liter vicit tñ caᵐ	motus ter- re venti nu- bes mercu- riales.
Gemini ♊	Aerei	facit tẽpe- rantiam de nã ionis.	humide cor rñdentes ſa turni.
Cancer ♋	Aquaticꝰ	ſerenũ calidum	calide terre motus ♂ ⁊ parũ ♄
Leo ♌	Igneus	calidũ hu. corrñdet ſo lari.	calidũ cor- rñdet mor. ☉ ⁊ ♂.
Virgo ♍	Terrea	humectat ⁊ tonat ☿ cum ♀.	maioriſ ca- loris dãno- ſe martis.
Libra ♎	Aerea	mutans ⁊ cambiens	tẽperate io uis ⁊ veneri
Scorpius ♏	Aquaticus	igneus ⁊ to nitruoſus martis	grandinoſꝰ pncipiũ tñ ẽ ſiccũ ſatni
Sagictariꝰ ♐	Igneus	vẽtoſꝰ mer- curij cũ ioue	humectãteſ veneris
Capricornꝰ ♑	Terreus	multũ hu- midum	cõburentes dãnoſe martis
Aquarius ♒	Aereus	frigidum aquoſum	multũ hu- mide lune
Piſces ♓	Aquatici	frigidũ ventoſũ	temperate veneris.

	2e ptes	3e ptes	septētrionales	meridionales	
♈	Tpate iouis ⁊ veneris	faciet mortalitatē martis putrefcōe	calescunt martis	infrigidant saturnine	
♉	frigide ⁊ humide veneris	igneꝰ corruptionē ♂	Tēperate iouis	motus fortes mercurij cū sat̄	no
♊	Tpate iouis	ꝯmixte mercurij directi	ventꝰ terremotus mercurij	ignee cōburētes martis	
♋	Tpate iouis	vētose mercurij cū ♄	ignee cōburētes martis	ignee cōburētes martis	
♌	Tpate iouis	multū humide corrūpētes saturni	cōburentes martis	humectantes mercurij cum venere.	
♍	Tpate iouis	aquose saturni	ventose mercurij	Tem erate iouis	
♎	Tpate iouis	aquose lune ⁊ saturni	vētose mercurij cū ioue	h umectantes saturni	
♏	Tpate iouis	terremotꝰ mercurij	cōburentes martis	humectantes saturni	
♐	Tpate iouis	ignite martis	ventosꝰ cū ☿ ⁊ ♄	multū hūide saturni i loco humido	
♑	Tpate iouis	mouentes pluuias lūe ⁊ mercurij	multū hūide dānose in loco aquoso	multū hūide dānose sat̄ni i loco aquoso	
♒	Tpate veneris	facit vētos mercurij	cōburentes martis	facit grandinem saturni	
♓	multū humide lūe	cōburētes martis	ventose iouis	aquose lune i loco aquoso	

Uodecim signa sunt &c. Hec pticula nõ est nisi suptitul' tabule precedentis. Qualitates autẽ signorũ vniuersalio res que versus sinistrã ponunt' qsi ab oib' auctorib' de iudicijs conceduntur. totũ autem residuũ tabule fruimur a Ptolemeo & Haly eius cõmentatore in secũdo capitulo secũde ptis quadripartiti sui ita q natura illius signi uel ptis eius ponit' supius fm Ptolemeũ. & nature stellarũ fixarũ que erant tpe Ptolemei ut dicit haly in illis partibus ponunt' inferius fm haly. Itẽ ab haomar hoc idem habet' quod a ptolemeo: accipit' a leopaldo etiã vnde qlibet istorũ fecit vnũ capitulũ de signorũ naturis sz totũ sum pserũt a Ptolemeo nec est ibi credo discordia. ¶ Notandũ fm haly vbi supra q debemus scire pprietates locorũ in quibus coniunctiones uel oppositiones: uel in quibus fuerit planeta predominãs: & alia ptinentia ad gubernationẽ pmiscendo cum virtute planete dñantis & cum sole & luna & alijs multis ad hoc requisitis: ut inde cognoscam' virtutem vincentẽ: & ad hoc est hec tabula vtilis valde. Unde sciendũ q cũ pprietatib' vniuersalib' signorũ potes addere naturas stellarum que sũt tẽpore moderno i illis signis si natura eorũ fuerit cõsimilis: uel minuere si dissimilis. ¶ Item sciendũ q stelle fixe que erãt tpe Ptolemei q fecit librũ almagesti nõ cõcordant cũ stellis quas recitauit Haly fore in predictis partib' signorũ tpe Ptolemei qui fecit quadriptitũ. & hoc est argumentũ q fuerint duo quorũ qlibet vocabat' Ptolome' fm opinionẽ Albumazaris in introductorio suo magno. qre ad hoc & solue illud dubiũ. ¶ Itẽ nota fm haly vbi supra q signa sunt que nõ habent opera. opera eni sũt stellarũ fixarũ q sũt in eis. & noiat' qdlibet eorũ fm q sol opat' in eo. Potest etiã dici q signũ accipit nomen a stellis fixis i eo existentib' qr valde diu manẽt ibi. ¶ Itẽ illa que p pdictã tabulã habent' dicũtur fm q fuerit tpe Ptolemei. oportet igit' iudicia mutare qr stelle fixe iã mutauerũt loca. patet igit' fm haly q qdlibet signũ & sue partes recipiunt a sole & a stellis fixis virtutem cũ qua operant' virtutes solis & stellarũ fixarũ. ¶ Item haly dicit ibidem q pleiades erant tpe Ptolemei in primis gradibus tauri. tempore autẽ suo in medio tauri erãt. ¶ Itẽ notandũ fm haly vbi supra q totũ signũ habere talẽ uel talẽ pprietatẽ. hoc intelligit' dupliciter. vno mõ q recipiat a sole vtutẽ q ccordat cũ suo ope cũ sol illud signũ ingredit'. Alio mõ q recipiat ab oib' stell' fixis i eo existẽtib' vim vnã q ccordat cum cplexiõe que fit p cõmixtionẽ omniũ stellarũ illarum. Primũ tamen est cõuenientius dictis Ptolemei. hec haly. Et ego dico q intentio ptolemei fuit q proprietates signorum in proposito accipiũtur fm q sol operatur in eis. Primo qr hoc magis

Nõ qd fuerũt duo Ptolemei quorũ alter cposuit Almagestũ & alter quadripartitum

facit ad sciendũ factum anni quod est intentũ principale Ptolemei in
ꝓposito. Secũdo qꝛ ipse dicit ꝙ ꝓprietas arietis est facere tonitrua qꝛ
equinoctiũ fit in eo. Equinoctiũ autẽ fit per solem ⁊ nõ ꝑ stellas fixas.
Tertio ipse dicit ꝙ nature partiũ arietis in addendo uel minuendo fiũt
ꝑ stellas fixas que sunt in eis. ¶ Patet igiť ꝙ signa none sphere q̃uis ꝑ
se sint mansiones nõ habentes opa: tñ attribuimus eis opera ſm ꝙ sol
opať in eis diuersimode ꝓpter diuersitates situs ⁊ ſm ꝙ sol inuenit ma
teriã preiacentẽ aliter dispositã a temporibus p̃cedentibus. vnde aliaꝫ
ꝓprietatẽ attribuimꝰ virgini q̃ꝫ arieti q̃uis sitũ cõsimilẽ habeat: qꝛ alio
modo sol inuenit elementa disposita ab estate q̃ꝫ ab hyeme. Et ex his sa-
tis patet qualiť in ꝓposito fiãt iudicia scꝫ vtrũ ſm nonã spherã uel octa
uam. Patet etiã ꝙ sol in eodẽ signo nõ operať similiter in oibus clima-
tibus. ¶ Itẽ stelle fixe que erãt tpe Ptolemei in principio alicuiꝰ signi
sunt modo. s. anno dñi. 1338. vltra mediũ eiusdẽ signi: ideo forsan non
easdeꝫ experientias haberemꝰ de virtute solis ꝑ signa sicut Ptolemeus
ꝓpter aliam mixtionẽ stellarũ fixarũ cũ virtute solis nũc ⁊ tũc. ¶ Intel-
ligendũ est tñ ꝙ virtus que attribuiť alicui signo habet magnã latitudi
nem ita ꝙ ſm naturas stellarũ fixarũ intendiť uel remittiť non tñ oino
corrũpiť. ⁊ sic remanet snia Ptolemei vtilis valde: dum tamen acuitas
tui intellectus possit ad hoc sufficere. ¶ Modũ autẽ ꝑ quem poteris te
iuuare de tabula prehabita inferius te docebo. Iteꝫ iuuamentũ quod
possumꝰ habere ex stellis versus septẽtrionẽ uel versus austrũ fit ſm ꝙ
dicit haly vbi supra qñ accidit pars eclypsis aut latitudo lune tpe cõiun
ctionis uel oppositionis uel planete dñantis versus septẽtrionẽ uel au-
strum cõmiscebiť eis virtus stellarũ fixarũ que sũt versus illã. Itẽ intel-
ligendũ ſm haly ꝙ qñ diciť talis est tẽperata intelligiť hoc ſm ꝙ calidi-
tas ⁊ frigiditas cõuenit tpi ſm naturã.

Capitulũ secundũ de. 28. mansionibus lune.

MAnsiones lune sũt. 28. ⁊ noia eorũ atq̄ꝫ gradus none sphere i
quibus incipiunt. patent ꝑ tabulam sequentem.

¶ Mansiones lune ⁊c̃. Hec tabula trahitur ex dictis Alkin
di in libello suo de pluuijs capitulo sexto ⁊ ponit ibi nomina nõ latina.
Item idem de hac materia in eodem libro in illo capitulo: Cũ substan
tia veneris ⁊c̃. Item hyspalensis in illo capitulo Indi distribuũt circu-
lum ⁊c̃. Item Japhar in libello suo de pluuijs versus principiũ. Item
abraham de seculo in illo capituso Sapiens quidem indorũ ⁊c̃. Item
plures alij. ¶ Notandũ ꝙ auctores ut in pluribus concordãt in nume-
ro ⁊ in qualitatibus mansionũ. Unde si discordauerint in qualitatibus

Numerus	mansionū lune. Noīa stellarū latina	q̄litates	Initia s̄m aliq̄s q̄ ad ḡdꝰ.9c sphere	Initia s̄z byẞ. ad ḡdꝰ 9c sphę rę r̄du ctis.	Initia s̄z abra hā de se culo ad ḡdꝰ 9c sphęrę reduct]
1	Cornua arietis	c.b.	1 ♈	24 ♈	16 ♈
2	venter arietis	.s.	13 ♈	6 ♉	28 ♈
3	Caput tauri	c.b.	26 ♈	19 ♉	14 ♉
4	Oculus tauri	b.c.	9 ♉	2 ♊	21 ♉
5	Caput canis	l.c.	22 ♉	15 ♊	7 ♊
6	sidꝰ puū luc] magne	c.b.	5 ♊	28 ♊	20 ♊
7	Brachiū leonis	b.	18 ♊	11 ♋	2 ♋
8	Nebulosa	c.	1 ♋	24 ♋	16 ♋
9	Oculus leonis	s.	13 ♋	6 ♌	28 ♋
10	Frons leonis	b.	26 ♋	19 ♌	11 ♌
11	Capillus	c.	9 ♌	2 ♍	24 ♌
12	Cauda leonis	b.	22 ♌	15 ♍	7 ♍
13	Canis	c.	5 ♍	28 ♍	20 ♍
14	Spica	c.	18 ♍	11 ♎	3 ♎
15	Cooperta	b.	1 ♎	[illegible]4 ♎	16 ♎
16	Cornua scorpiōis	b.c.	13 ♎	6 ♏	28 ♎
17	Corona sup caput	b.c.	26 ♎	18 ♏	11 ♏
18	Cor scorpionis	f.	9 ♏	2 ♐	24 ♏
19	Cauda scorpionis	b	22 ♏	15 ♐	7 ♐
20	Trabs	c.b.	5 ♐	28 ♐	20 ♐
21	Desertum	c.b.	18 ♐	11 ♑	3 ♑
22	Pastor	c.b.	1 ♑	24 ♑	16 ♑
23	Glutiens	c.	13 ♑	6 ♒	28 ♑
24	Fortune sidus	c.l.	26 ♑	19 ♒	11 ♒
25	Papilio	f.	9 ♒	2 ♓	24 ♒
26	Hauriens primꝰ	l.b.	22 ♒	15 ♓	7 ♓
27	Hauriens secūdus	b.	5 ♓	28 ♈	20 ♓
28	Pisces	c.b.	18 ♓	11 ♈	3 ♈

hoc nō ē nisi ex vitio scriptoris: ⁊ ideo accepi illā qualitatē i quā plures
vidi cōcordare: ita ꝙ tꝑata humida discordāt tñ i noībus: qꝛ quidā no
minant eas in greco. Alij in arabico. Alij vō in latino: sꝫ nō est magnā
vis ad pñs. Ubi autē debemꝰ inchoare videt̃ etiā discordia ſm ꝙ pꝫ ꝑ
tabulā. Dico tñ ꝙ oēs debent cōcordare in principijs mansionū: qꝛ si
vnus inceperit a principio arietis none sphere. Alter a principio arie-
tis octaue nō essent ita cōcordes in qualitatibꝰ sicut sūt. ⁊ oēs hoc acce-
perunt ab indis. ¶ Uidet̃ tñ ꝙ hyspalēsis incipiat a duobꝰ siderībꝰ ma-
gnis q̃ cornua ariet*is* dicunt̃: quarū prima ē nūc i. 24. gradu ariet*is* none
sphere ſm ꝙ intellexit ex dictis indorū ⁊ vnaqueqꝫ est. 13. gradus ⁊. 3^{e}
vniꝰ gradus ut dicit. Et ꝙ oēs alij etiā tantā qualitatē cuilibet mansio-
ni attribuunt. Sꝫ ista cōputatio nō diuidit totū celū in. 28. partes equa
les: ⁊ ideo dico quēadmodū dicit abrahā de seculo. s. ꝙ quelibet man-
sio cōtinet. 12. gradus ⁊. 52. minuta fere ita debet esse. 13. gradꝰ ⁊. 51. mi
nuta. Ipse etiā incipit cōputationē ꝑ. 8. gradꝰ ante cornua arietis sicut
patet in tabula: qꝛ imago arietis ē ꝑua. hoc dicit expresse q̃uis dicat po
stea quō inueniat̃ in qua mansione luna sit valde obscure. nec bene vi
dent̃ sua dicta ibi cōcordare cū ꝓdictis: ⁊ ideo nō indiget ibi expositiōe
¶ Uidet̃ quibusdā modernis ꝙ debeamꝰ incipere a principio gradus
primi arietis. i. a primo gradu ariet*is* none sphere. sꝫ nō videt̃ cū noient̃
ſm stellas fixas que sūt ibi. Alij etiā volūt ꝙ incipiūt a principio octa-
ue sphere vnde planete ⁊ luna solēt calculari ad octauā spherā. Et di-
cunt ꝙ iudicia a formato astronomo potiꝰ fiunt ſm eā q̃ꝫ ſm nonaꝫ. Et
ego dico ꝙ nō sufficit eo ꝙ motus octaue sphere quē ipsi dicūt nō ē nisi
correctio sua ad equationē sicut solebat distare locꝰ solis inuentꝰ ꝑ in-
strumenta ꝑ. 8. gradꝰ a loco eius inuento ꝑ suas tabulas. ideo dicebant
ꝙ hoc est ꝓpter motū octaue ⁊c̃. sicut debet videri in canonibꝰ tabularū
¶ Dico igit̃ ꝙ debemꝰ incipere sicut dicit abrahā. s. ꝑ. 8. gradus añ cor-
nua arietis. si eni incipere mꝰ a linea equalitatis. cornua arietis nō eēnt
in prima mansione imo vltra mediū secūde. nec aldebaran i q̃rta sꝫ vl-
tra mediū quinte. nec cornua scorpionis in. 16^{a} sꝫ vltra mediū. 19^{e}. Itē
si inciperemꝰ in cornibꝰ arietis aldebaran esset in fine tertie ⁊ nō in q̃rta
⁊ cor scorpionis in fine. 18^{e} ⁊ nō in. 18^{a}. Si tñ incipiamꝰ ꝑ. 8. gradꝰ ante
cornua arietis erūt versus mediū prime ⁊ aldebaran versus mediū q̃r-
te ⁊ cor scorpionis versus mediū. 18^{e} sicut debēt inueniri. Alia incōue
nientia sūt ſm ꝙ id a quo mansio accipit denoīationē sit extra mansio
nē quā denoīant. ¶ Notandū ꝙ Iaphar versus principiū vbi facit mē-
tionē de mansionibꝰ ꝙ qualitates ꝓueniūt ex natura stellarū in eisdem
situatarū ⁊ ex stellarū dignitatibꝰ ⁊ ex radiorū ſm fortes aspectꝰ in eis-

dem locis ꝓiectionibꝰ. ¶ Itē notandū ſm albumazar in capitulo 2º ſe-
cūde differentie primi tractatꝰ ſui magni introductorij ꝙ multe gentiū
ſciūt qcqd euenit in diebꝰ ex calore uel frigore ventis ⁊ pluuijs ex pn̄tia
lune in vnaquaqꝫ. 28. manſionū. ⁊ cuꝫ viderint vnāquāqꝫ manſionū in
occidente mane. dicūt ꝙ aer mutabit̄ ꝑ ventū pluuiā uel calorē uł frigꝰ
¶ Sciendū ꝙ Iaphar recitat q̄liter antiq nō ponebāt niſi. 27. manſio-
nes qꝛ cōputabāt. 13. gradꝰ ⁊ tertiā vniꝰ ꝓ vna manſione ⁊ alij. 29. ⁊c̄. ſꝫ
nō eſt hoc multū vtile nec eſt opinio ſua ut dicit. dicit tn̄ poſtea ꝙ vna-
queqꝫ manſionū eſt ex. 13. gradibꝰ ⁊. 3ª vniꝰ. ⁊ debet incipi cōputatio a
primo puncto arietis: ſꝫ nō dicit cuiꝰ arietis none videlicet uel octaue.
Ideo ſi volueris ſcire q̄ opinio ſit melior ⁊ verior: oportet ꝙ ꝑ longam
exꝑientiā hoc exꝑtus ſis. Qualiter aūt hoc ſit experiendū videbit̄ in pra-
cticis poſtea. ¶ Itē querit̄ q̄re hec ꝑtitio potiꝰ ſit ꝑ. 28. q̄ꝫ ꝑ aliū numerū
⁊ dico ꝙ hec potuit eſſe cā: qꝛ iſte numerꝰ eſt ꝓpinquius diebꝰ ꝑagratio-
nis lune ꝑ zodiacū. ſicut diuidimꝰ zodiacū in. 360. qꝛ eſt numerꝰ abun-
dans ꝓpinquius numero dierū ꝑagratiōis ſolis ꝑ zodiacum.

Capitulū tertiū de ſignis pluuioſis.

ITē ſigna pluuioſa ſūt cancer leo ſcorpio ſagictariꝰ aqua-
rius piſces. ꝑtes autē ſignorū q̄ potiſſime dicunt̄ humide
ſūt finis arietis. principiū tauri. finis capricorni. princi-
piū aquarij. principiū leonis. Signa aūt pauca ꝛ imbriū
ſūt taurus p̄ter eiꝰ principiū: gemini virgo libra. Itē ca-
pricornꝰ plus habet frigoris ⁊ ſiccitatis q̄ꝫ pluuie. ¶ Itē
ſigna pluuioſa ⁊c̄. Hec ꝑticula extrahit̄ a quodā libro de pluuijs q inci-
pit Cū multa in duobꝰ locis ⁊c̄. Itē haomar in vltimo caº. Itē alkindus
in vltimo caº. Itē hyſpalenſis in caº. volēs ſcire. Itē Leopaldus i duobꝰ
locis. Itē ꝙ vnꝰ accepit ab alio qn̄qꝫ id quidē dicit. Itē abrahā de ſecu-
lo in caº. Dicit iacob. ¶ Notādū ꝙ ille auctor cuiꝰ liber incipit Cū mul-
ta. enumerat capricornū inter ſigna pluuioſa: ⁊ poſtea dicit ꝙ plus ha-
bet frigoris ⁊ ſiccitatis q̄ꝫ pluuie. hoc exponit: qꝛ cum luna in locis alijs
pluuioſis applicans veneri ſignificet pluuias q̄ꝫuis nō ita fortit̄ ſi venꝰ
nō ſit in locis pluuioſis. tn̄ luna nō facit in capricorno pluuias niſi ſtel-
las in loco aquarū inſpiciat. ⁊ cū luna ⁊ mars in capricorno aſpiciunt
venerē ⁊ mercuriū. tūc eni nō obſtāte marte pluuias ſig̃ret. In alijs aūt
ſignis pluuioſis nō ita apparet effectus reſecatiōis luminis ſicut intel-
ligo, iſtū auctorem. ¶ Item ſciendū ſm iſtum auctorē ⁊ alios qui etiaꝫ
hoc recitant ꝙ piſcis eſt ſignum pluuioſum propter riuos quos habet
⁊ flumina: ⁊ ſagictarius etiam ꝓpter maria que in eius extremo exiſtūt

⁊ scorpio propter sua loca ⁊ littora. hoc potest exponi. s. ꝙ ista signa habent ista in suis cõstellationibꝰ figurata. uel sic ꝙ ista signa habẽt maiꝰ dominiũ in locis terre aquosis sicut maria ⁊c. ¶ Sciendũ haomar dicit ꝙ p̃cipue aquarius ⁊ leo sunt aquatica. ⁊ hyspalensis dicit signa pluuie ⁊ signatiua aque sũt aquarius. finis capricorni aries taurus leo. his fortiora piscis aquarius scorpio. Alkindus dicit ꝙ loca pluuiosa sunt aquarius finis capricorni arietis ⁊ tauri principium leonis: ⁊ amplius illis scorpiꝰ piscis ⁊ aquarius ita ꝙ hysaplẽsis ab alkindo hoc accepit. ¶ Item abrahaz de seculo dicit ꝙ signũ aquarij significat aquas ꝓpter stellas que effusor appellant̃. Similiter etiã signum leonis ꝓpter figuram nauis que in eo existit. ¶ Dubitat̃ vtrũ iste nature signorũ debeantur signis octaue uel none sphere: ⁊ videt̃ ꝙ in nona quia domꝰ capiuntur in nona. ⁊ ille auctor Cũ multa ⁊c. dicit vtraqꝫ domus saturni ẽ pluuiosa ⁊c. oppositum patet: quia causa quare sũt pluuiosa est ꝓpter stellas fixas que sunt in eis ut dictum est. Stelle autem fixe sunt in octaua quere de hoc.

Capitulũ quartũ de mutatione signorũ nature.

Item nature signorum mutant̃ ꝓpter motus eorũ in circũferentia quia eorũ calidum efficitur frigidum ⁊ humidum siccũ. Taurus in oriente est tepidus: in occidẽte frigidus. Gemini est in oriente calidus ⁊ siccus: in occidente frigidus ⁊ humidus. Cancer in oriente calidꝰ ⁊ siccus in occidente frigidus ⁊ humidus. Leo est in oriente calidus ⁊ siccus. in occidente frigidus ⁊ humidus. Uirgo in oriente calida ⁊ tepida. in occidente frigida ⁊ humida. Sagictarius in oriente frigidus ⁊ humidus. in occidente calidus ⁊ siccus. Capricornus in oriente frigidus ⁊ siccus. in occidente frigidus ⁊ humidus. Aquarius in oriente ⁊ piscis ambo sunt in oriente frigidi ⁊ sicci: ⁊ in occidẽte frigidi ⁊ humidi ⁊c. ¶ Item nature signorum ⁊c. hec habent̃ in libro haly abenragel capitulo primo prime partis. hoc etiam exponitur sic verbi gratia: Sole existente in aliquo signorũ que sunt calida in oriente ⁊ occidente frigida. si fuerit significatio suꝑ caliditatem plus apparebit illa die calor in mane q̃ꝫ vespere ceteris paribus ⁊ sic de alijs. uel sic. Quando significatores temporũ fuerint in aliquo signo qđ fuerit calidũ in oriẽte ⁊ frididũ in occidente si significauerũt caliditatẽ prius apparebit effectus in partibus terre versus orientem q̃ꝫ versus occidentem. ꝯm vero econuerso frigiditatem fiet econuerso. Uel sic. Si aliquod signum esset in oriente hora coniunctionis uel oppositionis uel alijs temporibus

significationū: magis apparebit effectus caliditatis si fuerit calidus in oriente ꝛ frigiditatis in occidente ꝙ̄ si esset ī alia domo .s. in parte occi dentali ꝛ sic de alijs. Primi autem duo modi magis mihi videnť ad ꝓpositum. ¶ Item sciendū ꝙ nō facit mentionē de ariete ꝛc̄. qꝛ forte effectus eorū nō sunt ita fortes uel inuariabiles uel qꝛ non habemus librum correctū.

Capitulū quintum de dignitatibus planetarū.

Dignitates essentiales planetarū ꝛ quis eoruꝫ sit almuteꝫ in vnaquaqꝫ partiū celi atqꝫ vent⁹ triplicitatis cuiuslibet .s. signi patent ex tabula sequēti. ¶ Dignitates essentiales ꝛc̄. hoc est titulus tabule dignitatū essentialiū: ꝛ extrahiť ex itroductorio Alchabicij: ex quadripartito Ptolemei in .18°. 19°. 20°. 21°. 22°. capitulis prime partis: ex quinto tra ctatu introductorij magni quasi ꝑ totum: ꝛ ₰m plures alios. Tabulam autē almuteꝫ cōposui ꝑ computationē pluriū dignitatū ₰m ꝙ domin⁹ domus habet quinqꝫ fortitudines: exaltationis quattuor: triplicitatis tres: termini duas: faciei vnā. Tabulam autē ventorū ₰m Ptolemeum extraxi ex dictis Ptolemei ꝛ Haly. 19°. capitulo prime ꝑtis quadriparti ti: tabulā aūt ₰m Albumazar ex .27ª differentia sexti tractat⁹ sui magni introductorij. Tabulā autē ₰m Japhar accepi ex libro Japhar de plu uijs in fine libri in parte que incipit: Aut occurrit. ¶ Sciendū ꝙ Ptole meus posuit totū arietē ꝓ exaltatione solis ꝛ sic de alijs. Alij autē plu res ponūt exaltationes planetarū in determinatis gradib⁹ illorū signo rū. ¶ Item dn̄i triplicitatū que suꝑius ponunť ad modum glose interli nearis ₰m opinionē Ptolemei sicut ꝛ illud qđ directe scribiť ₰m alios. Item termini egyptiorū a plurib⁹ approbanť ꝛ ꝓpter hoc tm̄ ponunť. ¶ Item magna est discordia in situationib⁹ ventorū. quere de hoc infe rius vbi facit mentionē de planetarū ventis ꝛ de qualitatibus habita tionū. ¶ Sciendū ₰m quendā de imaginib⁹ ꝙ quando aliqua triplici tas ꝛ eius dn̄i sunt fortes ꝛ incipit ventus ill⁹ triplicitatis flare ille ven tus est durabilis. Si autē inceperit illis existentib⁹ debilib⁹ nō durabit. Item qualitates ventorū sunt ₰m qualitates locorū a quibus veniunt ₰m ꝙ patebit inferius. ¶ Item sciendū ₰m Japhar ꝙ solis conuersio ꝑ signa temporis mutationes reducit. vnde quā partē de quattuor mun di partib⁹ obtineat sūmoꝑe notandū nō quoqꝫ lunaris a sole receptio ꝛ quis fuerit in eius oppositione notandus. Solis nāqꝫ in ariete discur sus orientalē ventū vsqꝫ in finē geminorū generat. Que hic tabulantur qn̄qꝫ in ꝓcessu facient ad ꝓpositū. Et oēs etiā cōcedūt ꝙ aries sit mascu linus taur⁹ vo feminin⁹ ꝛ sic de alijs ꝯsequēter. Seqᷓ tabula dignitatū.

Tabula digni·

	5	4	3		
	Domus	exaltatio	domini triplicitatis		
			primus	2°	3°
Aries	Mars	Solis	Sol	Jupiter	Saturn⁹
Taurus	Venus	Lune	Venus	Luna	Mars
gemini	Mercuri⁹		saturn⁹	Mercuri⁹	Jupiter
Cancer	Luna	Jouis	Venus	Mars	Luna
Leo	Sol		Sol	Jupiter	Saturn⁹
Virgo	Mercuri⁹	mercurij	Venus	Luna	Mars
Libra	Venus	Saturni	Saturn⁹	Mercuri⁹	Jupiter
Scorpio	Mars		Venus	Mars	Luna
Sagictarius	Jupiter		Sol	Jupiter	Saturn⁹
Capricorn⁹	Saturn⁹	Martis	Venus	Luna	Mars
Aquarius	Saturn⁹		Saturn⁹	Mercuri⁹	Jupiter
Pisces	Jupiter	Veneris	Venus	Mars	Luna
			in die	in nocte	pticeps.

Tabula graduū puteorū.

Aries	6	11	16	23	29	
Taurus	5	12	24	30		
Gemini	2	12	17	26	30	
Cancer	12	17	23	24	30	
Leo	6	13	15	22	23	28
Virgo	8	13	16	21	25	
Libra	1	11	20	30		
Scorpius	9	10	20	23	27	
Sagictarius	1	12	15	24	27	30
Capricorn⁹	2	7	11	22	24	28
Aquarius	1	12	17	24	29	
Pisces	4	7	24	27	28	

tatum planetarũ

	2										1		
	Domini terminorũ										Domini facierũ		
											prime	2[e]	tertie
♈	♃	1.6	♀	7.14	☿	15.21	♂	22.26	♄	27.30	♂	☉	♀
♉	♀	1.8	☿	9.15	♃	16.22	♄	23.24	♂	25.30	☿	☽	♄
♊	☿	1.7	♃	8.13	♀	14.20	♂	21.26	♄	27.30	♃	♂	☉
♋	♂	1.6.	♃	7.13	☿	14.20	♀	21.27	♄	28.30	♀	☿	☽
♌	♄	1.6	☿	7.13	♂	14.18	♀	19.24	♃	25.30	♄	♃	♂
♍	☿	1.7	♀	8.13	♃	14.18	♄	19.24	♂	25.30	☉	♀	☿
♎	♄	1.6	♀	7.12	☿	13.17	♃	14.23	♂	24.30	☽	♄	♃
♏	♂	1.6	♀	7.13	♃	14.21	☿	22.27	♄	28.30	♂	☉	♀
♐	♃	1.8	♀	9.14	☿	15.19	♄	20.25	♂	26.30	☿	☽	♄
♑	♀	1.6	☿	7.12	♃	13.19	♄	20.25	♂	26.30	♃	♂	☉
♒	♄	1.6	☿	7.12	♀	13.21	♂	22.26	♃	27.30	♀	☿	☽
♓	♀	1.8	♂	9.14	☿	15.20	♃	21.25	♄	26.30	♄	♃	♂

Tabula graduũ lucidorũ ⁊ tenebrosorũ vacuorũ ⁊ fumosorum.

♈	te. 1. 3	lu. 4. 8	te. 9.17	lu. 18.20	va.21.24	lu. 25.29	va. 30	
♉	te. 1. 3	lu. 4. 7	va. 8.12	lu. 13.15	va. 16.20	lu. 21.28	te. 29.30	
♊	lu. 1. 4	te. 5. 7	lu. 8.12	va. 13.16	lu. 17.22	te. 23.27	va. 28.30	
♋	lu. 1.12	te.13.14	va. 15.17	fu. 18.19	lu. 20. 28	va.29.30		
♌	te. 1.10	fu.11.20	va.21.30	(	fu.23	lu.24.26	va.27	te.28.30
♍	te. 1. 5	lu. 6. 8	va. 9.13	lu. 14.17	fu. 18	va. 19	lu.20.22	
♎	lu. 1. 5	te. 5.10	lu. 11.18	te. 19.21	lu. 22.27	va. 28.30		
♏	te. 1. 3	lu. 4. 8	va. 9.14	lu. 15.20	fu. 21.22	va. 23.27	te.28.30	
♐	lu. 1. 4	te. 5. 7	lu. 8.13	fu. 14. 17	lu. 18.24	te. 25.30		
♑	te. 1. 7	lu. 8.11	fu.12.15	lu. 16. 19	te. 20.22	va. 23.26	te.27.30	
♒	fu. 1. 4	lu. 5. 9	te. 10.13	lu. 14. 21	va. 22.25	lu. 26.30		
♓	te. 1. 6	lu. 7.12	te.13.18	lu. 19. 22	va. 23.25	lu. 26.28	te. 29.30	

Capitulũ sextũ de aspectibus planetarũ.

STelle dicunt̃ esse in gradibus in quib⁹ fiunt accordamẽta qñ sunt cõiuncti uel oppositi uel cũ de tertio uel quarto aut sextili dextro uel sinistro se aspiciũt aut in gradib⁹ equaliter elongati ab altero equinoctiorũ uel ab altero tropicorũ ꝛc̃. ¶ Stelle dicunt̃ esse ꝛc̃. Pars hui⁹ habet̃ a Ptolemeo ꝛ Haly in. 14º. capitulo prime partis quadripartiti. Et alia pars ex. 15º. capitulo eiusdẽ prime partis. Itẽ etiã Albumazar in tertia differentia sexti tractat⁹ ꝛ breuiter omẽs concedũt istos aspectus imo quasi tota astronomia est ex istis principalib⁹ magis ꝙ̃ de quibuscũq; alijs. ¶ Notandũ ẜm Ptolemeũ in quarto capitulo prime partis ꝙ ꝑ rectificationẽ figurarũ quá faciunt planete in respectu solis ꝛ lune cognosces virtutes omniũ planetarũ qꝛ tunc mutant aerẽ augendo uel minuẽdo a virtute luminariũ. ¶ Item sciendũ Ptolemeũ ꝛ haly in. 14º. capitulo prime partis quadripartiti. ꝙ si semicirculus diuidat̃ in tales partes ẜm quas caderent accordamenta musicalia in partibus cõsimilib⁹ diametri inuenient̃ qualitates circuli in quib⁹ aspect⁹ supradicti. Cã autẽ quare hec cõputatio fit tantũmodo in semicirculo est qꝛ ꝯsimiles aspectus uel ꝯsimiles distantie post oppositionẽ sicut p⁹ ꝯiunctionẽ nisi ꝙ fiñt in vna parte dextri ꝛ in alia parte sinistri etiã tota diameter correspondet cuilibet medietati circuli. ¶ Si igit̃ capiatur medietas diametri hic cadit accordamentũ ipsi⁹ dyapason que fit ẜm ꝓportionẽ duplam. Similiter si capiat̃ medietas semicirculi fit distantia. 90. graduũ ẜm quã fit aspectus quartus. Si v̓o capiant̃ due partes diametri hic cadet accordamentũ ipsius dyapenthe que est proportio sesq̲altera seu tria ad duo. Similit̃ si capiant̃ due tertie semicirculi fiet distantia. 120. graduũ ẜm quã fit aspectus trinus. Item si capiat̃ tertia diametri hic cadit accordamentũ dyapenthe cum dyapason. s. ꝓportio vni⁹ ad. 3. Similiter si capiatur tertia pars semicirculi fiet distantia. 60. graduũ ẜm quã fit sextilis aspectus. Cõiunctio autẽ ꝛ oppositio sũt ad similitudinẽ vnius soni. vnde qñ sũt cõiuncti duo planete uel oppositi ꝓijciunt radios suos ꝑ eandẽ lineã. s. ꝑ eandẽ dyametrũ mũdi. Et sicut inter cõsonãtias seu ꝓportiones musicales. He sunt principaliores: ita in istis distantijs aspectuũ principali⁹ reseruat̃ celestis armonia. ¶ Ulterius sciendũ ẜm Ptolemeũ ꝛ haly in eodẽ capitulo. 14º. prime partis. ꝙ trinus ꝛ sextilis aspectus sũt amicabiles ꝓpter conuenientiã signorũ Quartus autẽ ꝛ oppositus inimicabiles ꝓpter discõuenientiã. De gradibus etiam dicunt Ptolemeus ꝛ haly in capitulo. 15º. prime partis ꝙ

vna pars illorū graduū est alta ꝛ alia bassa ꝛ qñ equedistant troipicis tūc sunt arcus diurni equales. ꝛ hec de se nota sunt. ¶ Sciendū ꝫm Albumazar vbi supra ꝙ oppositio est fortior aspectuū: deinde q̄rtus: deinde trinus: vltimo sextilis. ¶ Dubitat̄ vtrū ꝫm gradus equales uel ꝫm gradus ascensionū in circulo recto uel obliquo debeāt sumi isti aspect⁹ Itē potest queri ꝫm quā distantiā incipit applicatio ad aspectum ꝛ ꝫm quā durat fortitudo aspectus. Uide in tertia differentia septimi tractatus Albumazaris ꝛc̄.

Capitulū septimū de centro aspectuū planetarū uel zenith uel athazir.

Tem stelle dicunt̄ esse i centro respectu alteri⁹ cū vna fuerit in cōiunctione uel oppositiōe eiusdē aut in altero predictorū aspectuū aut p. 12. grad⁹ ante coniunctionē uel p 12. gradus post cōiunctionē: aut p. 12. gradus ante oppositionē aut p. 12. grad⁹ post. Aut ꝫm distantiā. 45. graduū uel. 125. uel. 225. uel. 315. ¶ Itē stelle dicunt̄ esse ꝛc̄. Alkindus in. 4º. capitulo. Haomar in ca.º Quotiens itaq; Haly abenragel i 29º. ca.º octaue partis. ꝛ plures alij faciūt mentionē de huiusmodi cētris ¶ Sciendū ꝙ Leopaldus Haomar ꝛ Haly abenragel nō ponunt aspectū trinū esse de centris. Sciendū etiā ꝙ Alkindus quē credo sic habere correctū ponit ꝙ iste partes debent sumi ꝫm ascensiōes climatū. Sciendum etiā ꝙ potius dicunt̄ centra lune q̄ȝ alteri⁹ planete q2 cum luna tm̄ distat a sole fiūt ut in plurib⁹ iudicia ꝫm ista centra. Itē a quibusdā vocant̄ athazir: ab alijs zenith. s; nō est vis de nominib⁹.

Capitulū octauū. Quid agant planete.

Ol calefacit ꝛ aliquantulum desiccat. Luna humectat ꝛ parū calefacit. Saturnus infrigidat ꝛ modicū desiccat. Jupiter temperate calefacit ꝛ humectat ꝛ facit ventos generatiuos. Mars ꝓprie desiccat ꝛ cōburit. Uenus calefacit parū ꝛ humectat multū. Mercuri⁹ qñq; desiccat qñq; humectat ꝫm planetā cū quo uoluit̄. ¶ Sol calefacit ꝛc̄ Hoc principalit̄ a Ptolemeo. 4º. ca.º Et facit ventos. ꝑme ꝑtis quadripartiti. ꝛ quasi oēs hoc concedūt q̄uis aliū modū cognoscēdi virtutes planetarū uel aliā causā quare saturnus est frigidus. ꝛ sic de alijs ponant plures q̄ȝ Ptolemeus. ¶ Sciendū ꝫm Ptolemeū ibidē ꝙ luna modicū calefacit ꝓpter lumen receptū a sole ꝛ ꝓpter hoc facit putrescere. ¶ Dubitatur vtrum saturnus possit infrigidare ꝛ vtrū per radiū uel per motū uel quomodo. Item vtrū sit calidior sole.

Capitulũ nonũ Qualitates planetarũ quõ mutant̃

ITem in saturnus est frigidus semꝑ: tñ ꝫm magis ⁊ minus. ſ ʒ siccitas eius qñqꝫ mutat̃ in humiditatẽ. Mars ẽ semꝑ calidus ꝫm magis ⁊ minus. siccitas tamen eius nõ semꝑ manet in eo. verbi gratia Cũ fuerit planeta descendens in circulo augis ⁊ in signo humido ⁊ in termino humidi planete: ⁊ in quarta humida a sole. tunc est humidus ꝫm ꝙ plura uel pauciora humiditatis habuerit testimonia ⁊ ecõtra. ¶ In quantitatibꝰ vͦo actiuis confortat̃ cum fuerit ascendẽs in circulo augis uel cũ simılibꝰ ⁊ ecõuerso si descendens. uel cũ dissimilibꝰ. ¶ Jupiter ⁊ venus tẽperate calefaciũt ⁊ humectant. Ascendentes tñ confortat̃ tẽ-peramentũ caloris eorũ. Descendentes vͦo fortificat̃ temperamentũ hu-miditatis. i. incendit̃ humiditas. Similiter est de sole suo modo. Con-sidera etiã signa ⁊ terminos planetarũ etiam sicut primo. ¶ De mercu-rio specialiter est dicendũ qui ⁊ si sit parũ siccus ⁊ parum frigidus per se tamen si est ascendens tunc est parũ calidus ⁊ grauitate siccitate siccus Et si descendens est humidus cum modico frigoris: tamen plus q̃ alij mutat̃ ꝫm complexionẽ loci in quo est ⁊ planete cui cõiungit̃. ¶ Item saturnus est ⁊c̃. A. 7º. capitulo uel septima differentia quarti tractatꝰ ma-gni introductorij. Albumazar. Notandũ ꝙ non oportet considerare in qua quarta a sole sint venus ⁊ mercurius qꝛ nõ multũ elongant̃ ab eo. ¶ Sciendũ ꝫm Ptolemeũ. 12º. capitulo prime partis ꝙ virtutes quibꝰ operant̃ stelle mutant̃ ꝑ statum temporis ⁊ angulorũ. vnde cũ suo simi-li confortant̃ ⁊ cum suo dissimili debilitant̃. diuersis.

Capitulũ decimũ Qualitates planetarũ quõ mutant̃ i suis habitudibꝰ

ITem planete superiores ab ortu uel a cõiunctione solis vsqꝫ ad stationem primam sunt humidi. Deinde vsqꝫ ad oppositionez solis sunt calidi. Deinde vsqꝫ ad stationem secundam sicci. Deinde vsqꝫ ad combustionẽ uel cõiun-ctionem solis frigidi. ¶ Inferiores retrogradi ab ortu quousqꝫ dirigant̃ sunt calidi. Deinde ad cõiunctionẽ so-lis sunt humidi. Et abinde vsqꝫ ad retrogradationem sicci. Et abinde a retrogradatione vsqꝫ ad coniunctionẽ solis frigidi. Uel sic. Inferiores vͦo ab ortu quousqꝫ retrogradant̃ sunt humidi. Deinde ad coniunctio-nem solis calidi. Et abinde vsqꝫ ad retrogradationem sicci. Deinde vsqꝫ ad retrogradationẽ frigidi. ¶ Aliter adhuc de inferioribus sic: venus ⁊ mercurius postq̃ sepant̃ a sole ⁊ sunt directi donec sũt in medio sue di-rectionis humectant. Postea vsqꝫ ad stationem primam calefaciunt. Deinde vsqꝫ ad medium retrogradationis desiccãt. Deinde vsqꝫ ad cõ-

buſtionem infrigidant. Poſtq̃ꝫ etiã ſepantur a ſole retrogradi exiſten-
tes ⁊ apparent in mane donec eoꝛũ retrogradatio compleat̃ ⁊ fiant di-
recti. habẽt ſimiliter quattuoꝛ ſtatus ſimiles iſtis ⁊c̃. ¶ Luna vͦ in pri-
ma quarta menſis eſt humida principaliter. in ſecunda calida. in tertia
ſicca. in quarta frigida. ita ꝙ ſuo modo q̃ttuoꝛ quarte lunationis quat-
tuoꝛ quartis anni coꝛreſpondent. ¶ Item planete ſuꝑioꝛes ⁊c̃. Ab al-
bumazare quarta differẽtia ſeptimi tractatus ſui magni introductoꝛij.
Itẽ venus ⁊ mercuriꝯ ⁊c̃. Habet̃ ab haly in gloſa penultie ꝓpoſitiõis. 8ͥ
ca. prime ꝑtis. Luna vͦ i pͣ q̃rta ⁊c̃. hoc a Ptolemeo. 8ͦ. caͦ. prime partꝭ.

Capitulũ vndecimũ Qñ planete magis augent̃ in ſuis operationibꝯ

Item foꝛtioꝛ eſt caloꝛ planetarũ quando ſunt retrogradi. Item quãdo fuerit planeta a capite cancri ad caput libꝛe eſt in ſũmo caliditatis ſue ⁊ foꝛtioꝛ caliditas ſi cum hoc fuerit in longitudine ꝓpioꝛi epicycli. ¶ Itẽ caliditas illic eſt duobꝯ modis: aut a ſtatione prima ad oppoſitionẽ cuꝫ caliditate: aut ab oppoſitione ad ſtationẽ ſecundam cum caliditate vincente que eſt fine ſiccitatis. Sꝫ a ſtatione ſecũda vſqꝫ ad abſconſionẽ ſub radijs debilitatur caloꝛ eius: ⁊ cum fuerit ſub radijs nõ apparet in eo effectus caliditatis: quando exit de radijs vſqꝫ ad ſtationẽ primam incipit caloꝛ eius creſcere ita ꝙ dixerunt multi grecoꝛũ ꝙ tunc eſt ſignificatio humiditatis. ¶ Iteꝫ ex parte eccentrici iudica caloꝛẽ ſm̃ appꝛopinquationẽ a terra. Qñ igit̃ planeta fuerit in ſũmo epicycli ⁊ in ſũmo eccentrici ⁊ fuerit in prima q̃rta circuli illud eſt ſũmũ debilitatis caloꝛis initiũ: ꝙ nõ apparet effectꝯ caliditatis ſue in terra ſꝫ frigiditatis. Sꝫ qñ fuerit in ſecũda q̃rta circuli ⁊ i infimo epicycli ⁊ eccẽtrici erit ſũma vis ſue caliditatis quouſqꝫ accidat magna ſiccitas in terra. ¶ Itẽ nota ꝙ effectꝯ calidoꝛũ ſunt foꝛtioꝛes verſus zenith capitũ. ⁊ verſus meridiẽ debilioꝛes ſm̃ diſtantiã a zenith capitum Similiter ⁊ de frigidis ſꝫ effectus eoꝛũ aliquantulũ foꝛtioꝛes in ꝑte meridiei. ¶ Itẽ foꝛtioꝛ eſt caloꝛ ⁊c̃. Alkindus in primo caͦ. ¶ Itẽ nota ꝙ effectus foꝛtioꝛes ⁊c̃. Alkindus in quinto caͦ.

Capitulũ. 12ᵐ
De diuerſis oꝑatiõibꝯ in aere plaꝝ in diuerſis locꝭ i circulo diſcurrẽtiũ.

Item oẽs planete ponderoſi a ſtatione ſua ad oppoſitionẽ humectant ⁊ ab oppoſitiõe vſqꝫ ad ſtationẽ deſiccãt. Itẽ a ſtatiõe 2ͣ ad cõbuſtionẽ infrigidãt ⁊ a cõbuſtiõe vſqꝫ ad ſtationẽ caleſcunt. ¶ Itẽ foꝛtioꝛ caliditas ẽ in retrogradatiõe. Itẽ foꝛtioꝛ ſiccitas ⁊ hũiditas ẽ in declinatiõe ſeptẽtrionali. minoꝛ vͦ in meridionali ⁊ in facto hyemis ꝓ ſimilitudine tempoꝛis. ¶ Venus ⁊ mercurius oꝛientales ⁊ retrogradi humectãt. oꝛientales directi deſiccant. occidentales retrogradi infrigidant. occidentales directi deſiccant.

¶ Luna in prima quarta a sole calida ⁊ humida ⁊ si cū hoc fuerit ascē-
dens in circulo breui erit humida multū ⁊ fortius in prima ⁊ secūda 4^{a}
circuli ꝗ in tertia ⁊ q̃rta 4^{a}. In secunda q̃rta mensis est calida ⁊ sicca si
ascendens est sicca s℞m istā naturā. si descendens calida equalis In ter
tia q̃rta mensis est frigida ⁊ sicca. si ascendēs minuet̃ frigiditas si descē
dens minuet̃ natura sua. In q̃rta q̃rta a sole frigida ⁊ hūida. In ascen-
su frigiditas vincit. in descensu humiditas. Itē omnes planete ponde-
rosi ⁊c̃. hoc Alkindus.

Capitulū. 13^{m}. Quando planete sint maxme significationis pluuiarū.

Item scito ꝙ planete retrogradi significant sup pluuiam
⁊ eo magis inferiores qui sūt sub sole ⁊ eo magis siue in
feriores siue supiores in signis femineis. Et est testimo-
niū magis clarū si signū fuerit de signis frigidis siue ter-
reis siue aqueis. ¶ Itē scito ꝙ planete retrogradi ⁊c̃. hoc
Abraham de seculo.

Capitulū. 14. qñ planeta est iterū maioris significationis ꝑ pluuijs.

Item planeta cum est retrogradus a statione prima ad opposi
tionē notat plus pluuiā ꝗ ab oppositione ad stationē secundā
Item planeta cū est retrogradus ⁊c̃. hec hyspalensis.

Capitulū. 15. planeta in quolibet signo qualē aurā dat.

Item saturnus in ariete sub radijs facit pluuias ⁊ radiositates
⁊ nebulas pluuias. Uesptinus ventos frigidissimos. Matuti-
nus orientalis cōplexionē bonā ostendit. Stationariꝯ ⁊ fulgu
ra. Jupiter in ariete sub radijs facit pluuias. Uesptinus nebu-
las uel rores spargit. Matutinus orientalis serenū. Stationarius toni
trua facit. Mars in ariete sub radijs facit serenū. Uesptinus contrariū.
Matutinus turbationē temporū. Stationariꝯ fulgura ⁊ tonitrua. Ue-
nus in ariete sub radijs nihil erit venti. Uesptina ventū facit. Matuti-
na tonitrua ⁊ pluuias. Mercurius in ariete sub radijs tempestuosus ē.
Uesptinus parū bene cōplexionatus. Matutinus mundū aerē signifi-
cat. ¶ Saturnus in tauro sub radijs bonā complexionē facit. Uesptin⁹
siccitatē. Matutinus bonā complexionē. Stationarius vmbrosus tē-
pestuosus ⁊ tonitruos⁹ ē. Jupiter i tauro sub radijs mediocritatē aeris
significat. Uesptinus vmbras. Matutin⁹ abundantiā fructuū ⁊ pascue
Stationarius defectū fructuuz. Mars in tauro sub radijs tempus sine
vento facit. Uesptinus serenū. Matutinus ventos. Stationarius desic
cat aerē. Uenus in tauro sub radijs tonitrua significat. Uesptina sere-
num. Matutina bonam complexionē. Mercurius in tauro sub radijs

tempestuos⁹ ē ꝛ vmbrosus. Uesptinus bone cōplexionis. Matutinus roridus ꝛ madidus ꝛc. ¶ Saturn⁹ in geminis sub radijs siccus. Uespertinus aridus. Matutinus roridus bone cōplexionis. Sationarius infirmitates crescūt. Jupiter in geminis sub radijs bonā complexionem Uesptinus sanitatem. Matutinus sanitatē. Stationarius sanitatem.
¶ Mars in geminis sub radijs infirmitatē significat. Uesptinus calidissimus. Matutinus contrarietatez in hoibus. Stationarius calidus ꝛ siccus. Uenus in geminis sub radijs ad min⁹ desiccat. Uesptina ventosa. Matutina bonā complexionē. Mercurius in geminis sub radijs ventos excitat in mari ꝛ in terra. Uesptinus desiccat. Matutin⁹ bonaz complexionem. ¶ Saturnus in cancro sub radijs obscuros dies ꝛ validos ventos ꝛ ꝓcellas in mari. Uesptinus mare reddit apertū ad nauigandū. Matutinus bone complexiōis. Sationari⁹ diuturnas infirmitates. Jupiter in cancro sub radijs tranquillū mare significat ꝛ abundantiā piscium. Uesptinus bonam complexionē ꝛ sanitatem. si matutinus cū bona complexione. Stationarius facilitatē in rebus. Mars in cancro sub radijs combustionez. Uesptinus infirmitates. Matutinus lites inter homines. Uenus in cancro sub radijs tempus absq; vento. Uesptina bonam complexionē. Matutina serenū. Mercurius in cancro sub radiis mare eleuat. Uesptinus tranquillitatē. Matutinus bonam complexionē ꝛ sanitatē. ¶ Saturnus in leone sub radijs in corpore reumatismos ꝛ ex humiditate turbationē: in aere siccitatem facit. Uesptinus ariditatem. Matutinus bonā complexionē. Stationarius ariditatem ꝛ siccitatē. Jupiter in leone sub radijs annuales ventos inducit. Uesptinus bonaz complexionē. Matutinus robur in impatore ꝛ ꝓuenit ex fortitudine. Stationarius infirmitatū remissionem ꝛ minutionē Mars in leone sub radijs infirmitates impatoris. Uesptinus ardorem determinat. Matutinus destructiones. Stationarius infirmitates. Uenus in leone sub radijs ardorem facit. Uesptina iumentoruz infirmitates. Matutina bonam complexionē. Mercurius i leone sub radijs ab occidente ventū educit. Uesptinus suffocationē. Matutinus serenū. ¶ Saturnus in virgine sub radijs nocens est ꝛ infirmitates facit seu infert. Uesptinus difficultatem aeris. Matutinus siccitatē. Stationarius infirmitatez. Jupiter in virgine sub radijs abundantiā significat. Uesptinus bonam complexionē. Matutinus sanitatem. Stationarius bonum ꝛ gaudiū. Mars in virgine sub radijs nocumentū infirmitatum. Uesptinus suffocationis est. Matutinus vo lites. Stationarius siccitatem. Uenus in virgine sub radijs desiccat. Uesptina bonaz

conditionem dat. Matutina humiditatē. Mercurius in virgine sub
radijs procellas in mari validas significat. Uespertinus siccitatē. Ma
tutinus super humidos ꝛ bene complexionatos. ¶ Saturnus in libra
sub radijs occultas infirmitates infert. Uespertinus inequalitatē aeris
Matutinus frigidos ꝛ siccos ventos facit. Stationarius febrem quar
tanam inducit. Jupiter in libra sub radijs bonā complexionē aeris.
Uespertinus sanitatem. Matutinus infirmitates expellit. Stationa-
rius bonum tempus facit. Mars in libra sub radijs siccum ꝛ ariduꝫ
aerē facit. Uespertinus pluuiosus. Matutinus turbationes ꝛ tonitrua
Stationarius aridus ꝛ siccus est. Uenus in libra sub radijs est humi
da. Uespertina bene complexionata. Matutina fantastica est ꝛ humi-
ditates facit. Mercurius in libra sub radijs fortissimos ꝛ cōtrarios
ventos. Uespertinus bene complexionatus. Matutinus semper humi
dus ꝛ vtilis est. ¶ Saturnus in scorpione sub radijs frigidum aerem si
gnificat. Uespertinus congelationem. Matutinus septentrionaliuꝫ ꝛ
frigidorum ventorum est significator. Stationarius obscuros dies.
Jupiter in scorpione sub radijs frigidam pluuiaꝫ significat. Uesper-
tinus bonam complexionem. Matutinus bonum ꝛ augmentationem
pisciū significat. Stationarius tranquillitatem. Mars in scorpione
sub radijs tranquillitatem in mari. Uespertinus
Matutinus ventos. Stationariꝰ tonitrua ꝛ fulgura. Uenus in scor-
pione sub radijs sine pluuia est. Uespertina pluuiosa. Matutina mul-
te pluuie. Mercurius in scorpione sub radijs tempestuosus. Uesperti
nus sine pluuia. Matutinus pluuiosus. ¶ Saturnus in sagictario sub
radijs pluuiā ꝛ nebulositatem. Uespertinus frigiditatem ꝛ ariditatem.
Matutinus frigiditatem ꝛ congelationeꝫ. Stationarius infirmitates
hominū. Jupiter in sagictario sub radijs bonam complexionē. Ues-
pertinus pluuias multas. Matutinus serenū. Stationarius impfectio
nem ꝛ nocumentum. Mars in sagictario sub radijs sine humiditate
est. Uespertinus infirmitatem ꝛ pestilentiā. Matutinus multorū mili-
tum cōmotionem. Stationarius impfectionem ꝛ nocumentum. Ue
nus in sagictario sub radijs pluuiosa. Uespꝫtina ventosa ꝛ frigida. Ma
tutina bone complexionis. ¶ Mercnrius in sagictario sub radijs mul
tam pluuiā significat. Uespertinus sine humiditate. Matutinus bonā
complexionem significat. ¶ Saturnus in capricorno sub radijs signifi
cat ventos boreales cum aeris obscuritate. Uespertinus frigiditates.
Matutinus frigiditatem boream. Stationarius obscuros dies facit.

Jupiter in capricorno sub radijs humidũ aerem significat. Vesper-
tinus pluuiam. Matutinus tranquillitatẽ in mari ⁊ in fluminibꝰ signi
ficat. Stationarius aquarũ est signator. Mars in capricorno sub ra-
dijs nutrit. Vespertinus bonam complexionez. Matutinus hyemales
dies ꝑ loca facit. Stationarius tranquillitatez ⁊ ꝑfectionem. Venus
in capricorno sub radijs gelida est. Vespertina frigida. Matutina plu
uiosa. Mercurius in capricorno sub radijs semꝑ est pluuiosus. Ves-
pertinus ¶ Saturnus in aquario sub radijs hyemẽ fa-
cit duram. Vesꝑtinus timorẽ in mari ⁊ in fluminibus. Matutinus plu
uiam ⁊ hyemẽ. Stationarius frigus ⁊ glatiosus. Jupiter in aquario
sub radijs bonam complexionẽ. Vesꝑtinus multã pluuiã. Matutinus
multã infirmitatem repellit. Stationarius pluuiã ⁊ nutrimentũ affert.
Mars in aquario sub radijs ariditatem. Vesꝑtinus absentiã vento
rum. Matutinus incisionem eorũ. Stationarius nocumentũ ⁊ motio-
nem significat in mari. Venus in aquario sub radijs nebulosa. Ves-
pertina calida ⁊ ventosa. Matutina pluuiosa ⁊ caliginosa. Mercu-
rius in aquario sub radijs niuosus. Vesꝑtinus calidus aut gelidus tur
bulentꝰ. Matutinꝰ pluuiosus. ¶ Saturnus in piscibꝰ sub radijs vino-
sus. Vesꝑtinus pluuiosus. Matutinus bonã complexionem. Statio-
narius inequalitatem significat. Jupiter in piscibus sub radijs au-
gmentũ piscium. Vesꝑtinus bonam complexionem. Matutinus tran
quillitatẽ in mari ⁊ fluminibus. Stationarius bonã ⁊ temperatã plu-
uiam. ¶ Mars in piscibus sub radijs raritatem pisciũ. Vesꝑtinus ari-
ditatem. Matutinus fulgura ⁊ tonitrua. Stationarius inequalitates i
corporibus significat. Venus in piscibus sub radijs gelidũ tempus.
Vesꝑtina aquosa ⁊ ventosa. Matutina bonã complexionem ⁊ germi-
na ⁊ feces nutrit. Mercurius in piscibus sub radijs tempestuosus ⁊
pluuiosus. Vesꝑtinus bonam complexionẽ. Matutinus tranquillita
tem ⁊ bonam complexionẽ significat. ¶ Itẽ saturnus in ariete sub ra-
dijs ⁊c̃. hoc totum ponit̃ in quodam paruo tractatu quẽ composuit dñ
haly. ¶ Sciendũ ꝑm haly abenragel in quarto capitulo prime partis
In naturis planetarũ. Per solem fit decursus aquarũ: motus ventorũ
nascunt̃ nubes ⁊ veniunt pluuie. ¶ Luna ẽ vnus planetarũ significan-
tiũ pluuias. similiter venus ⁊ mercurius. Per iouẽ clarificatur aer cur-
runt venti ⁊ salutifere pluuie. s. temporibus debitis ꝑ equalitatẽ ⁊ tem-
periẽ. calor estatis ⁊ frigus hyemis remittunt̃. Per martẽ ⁊ eiꝰ accessũ ⁊
recessum in suo circulo crescit ⁊ decrescit calor estatis ⁊ hyemis frigidi-
tas omni anno. Et est mutabilis qꝛ vna vice humidꝰ ⁊ alia siccus. vnde

quando erigit̃ in circulo suo ⁊ sepat se ac retrahit se a fumositatibꝰ terre
⁊ humoribus. fortificatur eius caliditas ⁊ siccitas. quando vͦ descēdit
humectat̃ ⁊ minuit̃ calor eius. Et qñ est significator pluuie facit scintil-
lationes ⁊ tonitrua ⁊ radios ⁊ facit mirabilia i aere. debilitat̃ in signis
aqueis ⁊ fortificatur in signis igneis. De venere dicunt sapientes ꝙ qñ
retrogradat̃ a sole in capricorno aquario ul' in piscibꝰ existente: hyems
illius anni erit humida ⁊ pluuiosa. Et si retrograditur quando sol est ī
ariete uel tauro erunt pluuie ⁊ humiditates in vere illius anni ꝓpter re-
trogradationē veneris ⁊ accessum eius erga solem ⁊ introitum sub cor-
pore ⁊ radijs solis. ¶ Mercurius est vnus triū planetarū pluuias signi-
ficantiū. ꝑ eum ⁊ ꝑ mutationē suam de signo in signum ⁊ ꝑ statum eius
⁊ retrogradationem ⁊ directionē ipsius ⁊ ꝑ oppositiones ⁊ coniunctio-
nes suas scient̃ motus ventorū ⁊ eorum fortitudines in omnibus tem-
poribus illius anni: quoniam quando exit de vno signo ⁊ intrat aliud:
uel quando est stationariꝰ uel retrogradus significat ventos fortes hu-
miditates ⁊ pluuias ⁊ in aere accidentia de nubibꝰ ⁊ turbationes ⁊ his
similia. Similiter quando est in oppositione lune luna existente in ali-
quo signorum aqueorū significat qḋ prediximus. ¶ Itē ꝑ hyspalensem
in primo capitulo volens scire ⁊c̃. luna in pluuia habet posse. Et sol nūc
pluuiā nunc serenitatē significat. Nam cum est in loco inferiori circuli
pluuiā significat. In supiori vͦ serenitatē. sic est iudicium omniuꝫ pla-
netarū. Et luna accipit virtutem a planetis dans terre put natura eorū
existit ⁊ ut planete ꝑmutant̃ a dextro in sinistrū uel econuerso. Uel a ve-
locitate in tarditatē ⁊ econuerso: uel egredit̃ aliquē angulorū sic aeris
ꝑmutatio erit. nā si mobilis est mouetur econuerso motu ventorū. Si-
militer facit cōiunctio planets uel aspectue. sic etiaꝫ significat aspectus
astrorū fixorū. ¶ Item ſm Albumazar in primo capitulo secūde diffe-
rentie primi tractatus sui introductorij nisi fieret participatio planeta-
rū cū sole ⁊ luna vna estas alia calidior. Et similiter suo modo de hye-
me. ¶ Item ſm albumazar tertio tractatu sui magni introductorij plu-
ra bona habent̃ de accessibus ⁊ recessibus maris ſm motū lune. Sꝫ de
hoc quere ⁊c̃. ¶ Item de virtutibꝰ planetaꝝ multa bona dicit Albuma-
zar in sexta differentia quarti tractatus. Sꝫ modicū aut nihil est ibi fa-
ciens ad ꝓpositum quin virtualiter hic contineat̃. ¶ Itē sciendū Satur-
nus in ariete sub radijs ⁊c̃. non omnes cōbinationes que possunt poni
ponunt̃ semꝑ qꝛ forte hoc erit nimis nō possum plus.

Capitulũ. 16. De augmento virtutũ planetarũ.

ITem virtutes planetarũ augent̃ qñ distãt a sole uel a luna eo modo quo domus earũ distant a domibꝰ luminariũ. Tũc eni dicunt̃ ꝑticipare facie ad faciem. Item fortificant̃ si sint in suo haiz. Itẽ illi qui sunt in angulis uel succedentibꝰ sunt vincentes. qui vͦ in cadentibus sũt retrocedentes. ¶ Item planeta exaltat̃ sup̲ alterum qñ est dexter ab illo igit̃ ꝙ sit respectu alterius supra terraz. Item generaliter quotiens vnus planeta dat vim alteri ita ꝙ habuerit cũ signo uel planeta concordiã naturalẽ uel accidentalẽ tunc fortificat̃ ⁊ p̲ eius oppositum debilitat̃. ¶ Item multi sunt modi alij fortificandi ⁊ debilitandi planetas sꝫ predicti sũt principales. nec forte alij modi sũt multũ necessarij ad ꝓpositum ⁊c̃. ¶ Item virtutes planetarũ ⁊c̃. hoc a Ptolemeo ⁊ haly in. 23ͦ. caͦ. prime partis. Eo modo ⁊c̃. ſm haly sunt mercurius in 2ͦ. a sole ⁊ in. 12ͦ. a luna. venus in 3ͦ a sole ⁊. 11ͦ. a luna ⁊ sic de alijs. ⁊ lucrãtur vim ac si essent in domo sua. ¶ Item sciendũ ſm haly ibidẽ ꝙ haiz est ꝙ planeta masculinus sit in die supra terrã in signo masculino ⁊ de nocte sub terra. uel ꝙ planeta masculinus sit in signo masculino ⁊ femininus in signo feminino. Et diurnus de die sub terra ⁊ nocturuꝰ de nocte supra terrã. hoc est ſm cõmunitatẽ astrologorũ. Postea dicit ꝙ opinio Ptolemei est ꝙ haiz est qñ planeta est in loco sibi conuenienti ⁊ cũ quo habet cõcordantiã. Item ſm haly ibi ꝙ modi ferendi vim sũt duo ⁊ habent vnã radicem ad quam reducunt̃. s. ꝙ leuis semp̲ exhibet vim suam ponderoso excepto si leuis habeat tot dignitates in signo in quo existit ꝙ in virtute sup̲at ponderosum. Primus modus est etiã ⁊ quia haly vbi supra ⁊ Albumazar i. 7ͦ. tractatu sui magni introductorij. ⁊ hyspalensis in principio ⁊ Alchabiciꝰ ⁊ plures alij faciũt de hoc mentionẽ ⁊ fiet extractio specialis sup̲ hoc. ¶ Item sciendũ ꝙ nõ oportet cõsiderare omnes modos fortitudinũ planetarũ in ꝓposito: qꝛ aliqui sũt modi qui q̃ꝫuis facerẽt ad aliqua iudicia sicut de natiuitatibꝰ ⁊c̃. tñ modicũ aut nihil faciũt ad aliqua iudicia de mutationibꝰ aeris nec etiã auctores se iuuãt. iõ hoc sit de bene esse. ¶ Itẽ dubitat̃ quos ventos moueãt planete.

Caplm. 17. Stelle fixe sunt diuersarũ qualitatũ.

ITem stelle fixe sũt calide uel humide: frigide uł sicce ſm ꝙ sũt de natura alicuiꝰ planete. Ite stelle fixe prime magnitudinis sũt fortiores q̃ꝫ secũde: ⁊ sic cõsequent̃: ⁊ que circa zodiacũ q̃ꝫ que extra: ⁊ septentrionales q̃ꝫ meridionales: ⁊ ꝓpinquiores zenith capituz q̃ꝫ remotiores: ⁊ que

cõiungit cũ aliquo planeta in longitudine ⁊ latitudine q̃ʒ in longitudi-
ne tm̃. Et que in longitudine tm̃ q̃ʒ que nõ cõiungit. ¶ Itẽ stelle fixe de
bilitant̃ ⁊ fortificant̃ ẜm loca sua respectu ascendẽtis ⁊ ẜm figuras suas
r̃spectu solis lune ⁊ triũ supioꝝ. Uerũtñ iste stelle nõ eodẽ r̃spectu redeũt
Cũ sepant̃ a sole ⁊ sunt oriẽtales donec sol se ponat in q̃rta eorũ hume-
ctant ⁊ in q̃rta sinistra vsq̃ʒ ad oppositionẽ calescũt. Postea vsq̃ʒ ad aliã
quartã deficcãt ⁊ postea vsq̃ʒ ad cõiunctionẽ infrigidant. Per tabulã se
quentẽ patent nature stellarũ fixarũ principaliũ in longitudine tꝑe mo
derno ⁊ latitudine cũ figuris ⁊ imaginibꝰ in quibꝰ sunt uel de qua ma-
gnitudine fuerint. ¶ Itẽ stelle fixe sunt calide ⁊c̃. tabulã satis ponit vni
mũdus. Sʒ hoc extrahit̃ a Ptolemeo in nono caº. prime ꝑtis quadripti
ti. ¶ Itẽ stelle fixe magnitudinis prime ⁊c̃. hoc dicit haly in glosa in fi-
ne eiusdẽ noni capituli. ¶ Dubitat̃ qualiter virtutes stellarũ fixarũ co-
gnoscunt̃ vtrũ videlicet possint cognosci ꝑ colores uel ꝑ quid. quere de
hoc ⁊c̃. ¶ Nota ꝙ a tempore considerationis Ptolemei de locis augiũ
⁊ stellarũ fixarũ vsq̃ʒ ad tempꝰ considerationis Alfonsij de eisdẽ mota ẽ
octaua sphera ⁊ ꝑ consequens stelle fixe ⁊ auges. 17. gra. 8. minuta. Et a
ↄsideratione Alfonsij vsq̃ʒ ad finẽ anni xp̃i. 1368ⁱ. mota est ꝑ. 1. gra. 22.
minuta. 18. 2ª 43. 3ª. ⁊ sic a tempore cõsiderationis ipsiꝰ Ptolemei vsq̃ʒ
ad finez anni xp̃i predicti motus est zodiacus mobilis ⁊ imagines ipsiꝰ
ꝑ. 18. gra. 30. minuta. 18. 2ª. 43. 3ª. Et cum tempore cõsiderationis Pto
lemei stella antecedens que est in cornu arietis in q̃ incipit imago arie
tis fuerit distans a principio zodiaci fixi ꝑ. 6. gra. 40. minuta. Sequitur
ꝙ ꝑfecto anno xp̃i. 1368. distabat ab eodem principio arietis zodiaci
fixi. 25. gra. 10. minuta. 18. 2ª 43. 3ª. ¶ Et est intelligendũ ꝙ dispositiões
stellarũ fixaꝝ denotate in p̃cedentibus ad terminũ cõplementi radicis
mediarũ cõiunctionũ ordinent̃ ẜm dispositionẽ earũ stellarũ naturalẽ
⁊ ꝙ longitudines earũ incipiant̃ ex initio signi arietis ⁊ fiant ẜm succes
sionẽ signorũ in suo motu. Sʒ latitudines earũ sunt distantie illarum a
via solis. ¶ Dexter pes cancri. Nota ꝙ ista stella ⁊ zubayl nõ sũt visibi-
les prorsus licet sint prime magnitudinis: qꝛ latitudo cuiuslibet earũ ẽ
tanta versus meridiẽ ꝙ supꝑ horizontẽ prorsus nõ ascendunt.
¶ Tempus inter Alfonsiũ ⁊ radicẽ istarũ stellarũ. 86. anni solares com
pleti. Motus stellarũ in tꝑe p̃dicto. 44. minuta gradꝰ ⁊ ẜm hoc motus
eq̃lis earũ in vno anno fuit. 34. 2ª 49. 3ª. 25. 4ª. i. illo tꝑe erãt rectificate
stelle. 1319. 5. menſ. Item tempus Alfonsij incepit. 1251. anni xp̃i. ⁊. 5.
menſ. Itẽ a loco cuiuslibet stelle fixe tꝑe Alfonsij vsq̃ʒ ad annos xp̃i.
1424. 1. gradu. 59. minuta. 20. 2ª.

Tabula stellarū fixarū que sunt ppe viam solis verificate ad annū domini. 1312.

	Longi tudo			Lati tudo		pars mū	gnitudo	
	S	g̃	m̃	g̃	m̃		mā	
1	0	24	32	7	70	ſ	3	cornua arietis
	0	25	32	8	20	ſ	3	parū infrigidant ꝛ multū deficcant.
	Saturni ꝛ martis							
2	0	28	25	7	20	ſ	5	Jn ore arietis
	0	29	22	6	0	ſ	5	modicū infrigidant ꝛ humectant
	Mercurius ꝛ parū saturni							
3	1	2	52	5	15	m	4	Jn pede inferiori arietis deficcant
	1	5	52	1	50	m	5	
	1	7	32	1	20	m	5	
	Martis							
4	1	9	12	4	50	ſ	5	Jn cauda arietis humectant
	1	11	42	1	40	ſ	4	
	1	13	12	2	30	ſ	4	
	1	14	52	1	50	ſ	4	
	Ueneris							
5	1	27	32	9	30	m	5	Jn abscisione tauri figide ꝛ humide.
	1	21	32	8	0	m	3	
	Ueneris ꝛ parū saturni							
6	1	20	2	4	30	ſ	5	Pleyades
	1	20	23	4	40	ſ	5	tpate inter humiditatē ꝛ siccitatem ꝛ
	1	20	32	5	5	ſ	5	tendunt versus calorem.
	1	21	32	5	20	ſ	5	
	Lune ꝛ veneris							
7	2	0	32	5	10	m	1	aldebaran ca. ꝛ sicca
	Martis							
8	1	28	52	5	45	m	3	Jn capite tauri multū frigide ꝛ ten-
	1	28	42	5	50	m	3	dunt ad siccitatem.
	1	19	42	3	0	m	3	
	2	3	32	4	0	ſ	4	

	Longitudo			Latitudo		pars mũdi	Magnitudo	
	S	g̃	m̃	g̃	m̃			
	Saturni ⁊ parũ mercurij							
9	2	7	52	3	30	m	5	Jn ſũmitate cornuũ tauri
	2	8	32	5	0	ß	5	Calide ⁊ ſicce
	2	13	12	5	0	m	5	
	2	15	2	2	30	m	3	
	Martis							
10	2	24	22	1	30	m	4	Jn pedibus geminorũ: plus humectãt
	2	26	2	1	15	m	4	q̃3 deſiccant.
	2	28	2	3	30	m	4	
	2	29	52	7	30	m	3	
	3	3	32	10	30	m	4	
	Mercurij ⁊ veneris							
11	3	9	32	5	30	m	3	Jn coxis geminorũ
	Saturni							
12	3	11	12	9	40	ß	2	Jnflãmati herculis humect[illegible]
	Mercurij							
13	3	14	32	6	15	ß	2	
	Martis							
14	3	20	32	1	0	ß	5	Jn capitibus geminorũ
	2	25	2	7	30	m	4	humide magis q̃3 ſicce
	Mercurij ⁊ martis							
15	3	26	12	11	5	ß	4	Jn pede cancri
	3	4	22	5	30	ß	4	Jn brachijs cancri
	Mercurij ⁊ parũ martis							
16	3	28	12	0	40		4	Jn pectore cancri
	Martis ⁊ lune							
17	3	28	12	2	40	ß	4	duo aſini Hee faciũt calorem ⁊
	3	29	12	0	10	ß	4	ſiccitatem magnã
	Martis ⁊ ſolis							
18	4	12	2	9	30	ß	3	Jn capite leonis magne ſiccitatis

	Longi°			Lati°		ps	ni	tudo
	S	g̃	m̃	g̃	m̃	m'	mag	
	Saturni ꝛ martis						m	
19	4	19	2	11	0	ß	3	In collo leonis.
	4	18	32	4	30	ß	3	
	4	20	2	7	30	ß	3	
	Saturni ꝛ parū mercurij							
20	4	20	22			ß	1	Cor leonis
	Martis ꝛ Iouis.							
21	4	29	12	12	15	ß	4	In dorſo ꝛ cauda leonis.
	5	2	2	13	40	ß	2	
	5	2	12	11	30	ß	5	
	5	4	12	9	40	ß	3	
	5	12	23	12	5	ß	1	
	Satnrni ꝛ veneris							
22	5	8	12	5	50	ß	3	In coxis leonis
	5	8	22	3	0	m	5	
	5	9	32	0	50	ß	4	
	5	9	32	1	15	ß	4	
	Ueneris ꝛ mercurij.							
23	5	14	12	4	35	ß	5	In capite virginis.
	5	14	52	5	40	ß	5	In oculo.
	5	17	2	6	0	ß	3	In ala meridionali
	5	18	2	5	30	ß	5	
	Mercurij ꝛ parū martis.							
24	5	26	7	1	10	ß	3	In ala ſeptentrionali virginis
	6	1	2	2	50	ß	3	In dorſo virginis
	Mercurij ꝛ parū martis							
25	6	0	2	15	10	ß	3	
	Saturni ꝛ mercurij							
26	6	14	32	3	30	m	1	Spica
	Ueneris ꝛ parū mercurij							
27	6	24	32	7	30	ß	4	In ſūmitate pedū virginis
	6	25	12	2	40	ß	4	
	6	27	52	0	30	ß	4	
	7	0	32	9	50	ß	4	

	Longitudo			Latitudo		pars mũdi	magnitudo	
	S	g̃	m̃	g̃	m̃			
	Mercurij ⁊ martis							
28	7	5	52	7	30	ſ	2	In libra super lancem
	7	0	2	8	40	ſ	2	
	Jouis ⁊ martis							
29	7	9	12	1	15	ſ	4	In auribus scorpionis
	7	11	52	1	40	ſ	4	
	7	15	22	3	54	ſ	4	
	7	20	52	4	20	ſ	4	
	Saturni ⁊ mercurij							
30	7	23	32	1	40	m	3	In fronte scorpionis
	7	23	32	5	0	ſ	3	
	7	24	12	1	20	ſ	3	
	Saturni ⁊ parũ martis							
31	8	0	29	4	0	m	2	Cor scorpionis
	Martis ⁊ parũ Jouis							
32	8	5	52	15	0	m	4	In nodis caude scorpionis
	8	11	2	19	30	m	3	
	8	14	2	18	50	m	3	
	8	15	52	15	10	m	3	
	8	18	22	16	40	m	3	
	Ueneris ⁊ saturni							
33	8	14	52	13	30	m	4	In aculeo scorpion s
	8	15	22	13	20	m	3	
	Mercurij ⁊ martis							
34	8	19	2	13	15	m	4	Nebulosa
	Martis ⁊ lune							
35	8	22	22	6	30	m	3	In sagicta sagictarij
	8	0	52	3	50	m	4	
	Martis ⁊ lune							
36	8	24	32	2	7	ſ	3	In arcu sagictarij
	8	26	52	1	30	ſ	3	

	Longitudo			Latitudo		pars mũ.	magnitudo	
	S	g̃	m̃	g̃	m̃			
37	9	3	2	7	45	m	4	In nube In vultu sagictarij
	9	4	12	6	45	m	3	
	9	5	32	2	30	m	4	
	9	7	52	2	30	m	5	
	Martis ⁊ solis							
38	9	4	52	0	18	m	2	
	9	5	32	0	23	m	2	
	9	14	32	0	13	m	3	
39	9	16	21	5	50	m	5	In cauda equi sagictarij
	9	16	32	4	50	m	5	
	9	16	42	4	50	m	5	
	9	17	52	6	30	m	5	
	Ueneris ⁊ saturni							
40	9	25	12	2	20	ƀ	3	In cornibus capricorni
	9	25	12	5	0	ƀ	3	
	9	26	42	1	30	ƀ	6	
	Ueneris ⁊ modicũ martis							
41	9	29	33	8	40	m	4	In pedibus ⁊ ventre capricorni
	10	4	32	7	40	m	4	
	10	8	2	6	50	m	4	
	10	8	12	6	0	m	5	
	Martis ⁊ mercurij							
42	10	12	42	2	10	ƀ	3	In ore capricorni
	10	14	21	2	10	ƀ	3	16 15
	10	14	42	0	20	m	4	
	10	15	32	2	50	m	5	
	Martis ⁊ veneris							
43	10	2	32	8	40	ƀ	3	In finistra manu aquarij
	10	4	2	8	0	ƀ	4	
	10	14	22	8	15	ƀ	2	
	10	24	12	11	15	ƀ	4	

	Longitudo			Latitudo		pars mũdi	Magnitudo	
	S	g̃	m̃	g̃	m̃			
	Saturni ꝛ mercurij							
44	10	19	12	5	0	m	4	In coxis aquarij
	10	19	32	7	30	m	3	
	10	22	32	5	40	m	5	
	Mercurij ꝛ saturni							
45	11	5	32	1	0	m	4	In decursu aque exeuntis de am-
	11	6	52	7	30	m	4	phora
	11	7	52	0	30	m	4	
	11	8	12	1	4	m	4	
	Saturni ꝛ parũ Jouis							
46	11	9	32	9	15	ƀ	4	In vertice piscis meridiani.
	11	12	2	7	30	ƀ	4	
	11	13	52	9	30	ƀ	4	
	Mercurij ꝛ saturni							
47	11	13	52	6	20	ƀ	4	In ore piscis meridiani
	11	17	32	5	4	ƀ	6	
	Jouis ꝛ mercurij							
48	11	23	52	6	20	ƀ	4	Sup eius caudã in filo meridionali.
	Saturni ꝛ mercurij							
49	0	17	12	15	20	ƀ	4	In spina dorsi piscis meridiani
	0	20	2	17	0	ƀ	4	
	Jouis ꝛ veneris							
50	0	13	32	14	20	ƀ	4	In filo septentrionali
	0	14	12	12	0	ƀ	4	
	0	15	32	12	0	ƀ	4	
	Saturni ꝛ Jouis							
51	0	20	22	8	30	m	3	Lucida in ligatura piscis
	Martis ꝛ mercurii							

Capitulũ. 18. De qualitatib⁹ quartarũ anni.

Uattuor sũt tpa ver estas autumn⁹ ꝛ hyems. Uer ab ariete calidus ꝛ humidus. Estas a cancro calida ꝛ sicca. Autumnus a libra frigida ꝛ sicca. Hyems a capricorno frigida ꝛ hũida. ¶ Quattuor sunt tpa ꝛc̃. hoc a Ptolemeo. 10° capitulo prime partis quadripartiti. Et ab Albumazar i quinta differentia secũdi tractatus sui introductorij. Alkindus in primo ꝛ omnes in hoc concordant.

Capitulũ. 19. De qualitatib⁹ planetarũ diuersis in singulis q̃rtis anni.

QUando in vere retrogradant̃ planete in quarta vernali.

¶ Qñ in vere retrogradant̃ planete in quarta estiuali illud tempus est mitis cõplexionis cũ vento septentrionis ꝛ ita fortificat̃ humiditas ꝓpter solutionẽ glacierũ p solẽ ꝛ planetas retrogrados. Et si fuerint illic directi debilitatur signũ humiditat]. ¶ Qñ in vere retrogradant̃ in quarta autumnali est signũ humiditatis tpis ¶ Qñ in vere retrogradant̃ in quarta hyemali

¶ Qñ in estate retrogradant̃ in quarta vernali est sũmus calor in parte septentrionali ꝛ pars meridionalis infrigidat̃ ꝛ venti calidi comburẽt ꝛ consumẽt herbas in parte septẽtrionali: ꝛ erit adhuc calor fortior si cũ hoc sint in frigido eccentricorũ suoꝝ. Et si fuerint illic directi oriẽtales erit illa estas decora q: tunc debilitat̃ calor ꝛ infrigidat̃ ꝛ mitigat̃ aura sua cũ fuerit sol in angulo terre. Sꝫ si tunc essent occidentales esset illa significatio debilior: q: post occasum solis appropinquãt ad zenith capitum. ¶ Qñ in estate retrogradant̃ in quarta autũnali signũ est caliditatis in illo tpe ꝛ siccitatis nisi ingrossabunt̃ venti meridionales. ¶ Qñ in estate retrogradant̃ in quarta hyemali signũ est caliditatis illi⁹ hore ꝛ siccitatis sue. ¶ Qñ in autumno retrogradant̃ in quarta estiuali tunc soluent qđ sol congelauit in pte septẽtrionali ꝛ erit tempus varians cõplexionẽ ꝛ erunt venti septẽtrionales frigidi: ꝛ si fuerint directi tũc debilitat̃ calor planetarũ: ꝛ erit gelu ad sũmũ. ¶ Qñ in autumnali tpe retrogradant̃ in quarta autũnali multiplicabit̃ ventus septẽtrionalis vi caliditatis solis cũ planetis ꝛ molieт̃ aer in parte septẽtrionali ꝛ ibi multiplicabit̃ humiditas ꝛ soluũt venti meridionales qđ ibi congelatum est Et si fuerint occidentales erit sũmũ gelu in pte septẽtrionali ꝛ quiescent venti a meridie. ¶ Qñ in autumno retrogradant̃ in quarta hyemali

¶ Qñ in hyeme retrogradant̃ in quarta vernali

¶ Qñ in hyeme retrogradant̃ in quarta estiuali tũc est signũ humidita tis: qꝛ tũc dissoluit nisi multiplicatus fuerit ventus septẽtrionalis. Et qñ erunt directi debilitabit̃ significatio humiditatis in illo tpe: precipue si fuerint occidentales a sole. ¶ Qñ in hyeme retrogradant̃ in quarta au tumnali erit sũma humiditas in illo tpe: ꝛ erunt multi venti meridiona les ꝛ cũ hoc soluet sol gelu in septẽtrione. Si vo fuerint directi ꝛ occidẽ tales significabũt magnã diminutionẽ humiditatis in illo tpe. ¶ Qñ in hyeme retrogradant̃ in q̃rta hyemali signũ est humiditatis. Et si fuerint tũc directi signũ est siccitatis. ¶ Qñ in vere ꝛc. Alkindus in 2°ca° ¶ Itẽ nota ꝓ quartã talẽ uel talẽ intelligunt̃ tria signa que sol pagrat in eadẽ q̃rta.

Caplm. 20. De associatiõe solis cũ alijs planetis qd significãt.

Item si fuerit sol a capite capricorni vsq ad caput arietis ꝛ vnꝰ retrogradꝰ cũ eo: erit humiditas pauca. Si duo erit humiditas formosa. Si tres erit humiditas addens. Si q̃ttuor tũc humiditas silis diluuio forti. Et fortior in q̃r ta vernali uel in capite cancri. Si vo nõ fuerit quis retro gradus ꝛ nõ erit in naturis suis de pte tẽporũ suorũ signi ficans humiditatẽ: erit siccitas quousq retrogradet̃ aliqs eoꝝ ꝛ fortius in siccitate qñ erit hec significatio in quarta autumnali existentibꝰ istis signatoribꝰ directis: Quia si inueníremꝰ in illa q̃rta oẽs planetas retro grados aut tres aut duos aut vnũ ꝛ postea dirigant̃ in quarta hyemali erit siccitas. Et si fuerint nature sue sicce erit siccitas fortis ẜm naturam eoꝝ q retrogradant̃ in q̃rta autũnali. Et si retrogradi oẽs fuerint in ea ꝛ dirigant̃ in quarta hyemali signũ est siccitatis in oibꝰ mũdi climatibꝰ ¶ Itẽ si fuerit sol ꝛc. Alkindus in tertio capitulo.

Caplm. 21. De cõbustis planetis quid significent.

Item dũ cõburit̃ aliquis leuiũ in q̃rta antumnali ꝛ fuerit directꝰ signũ est frigiditatis ꝛ gelu. Et cum cõburit̃ in hye mali significat nubila ꝛ ventos meridionales. Qñ autẽ cõburit in vernali sigt nubila Qñ vo in estate sigt calidi tatẽ fulgura ꝛ tonitrua. Et qñ cõburũt põderosi sũt huiꝰ significatiõis nisi q sũt debiliores. ¶ Itẽ dũ cõburit̃ aliqs leuiũ ꝛc. hoc Alkindus in. 4°ca°

Caplm. 22. De nã ꝛ q̃ntitate diuersa quarta rũ dierũ ꝛ noctiũ ꝛ q̃ q̃rta celi sit dextra ꝛ q̃ sinistra vocat̃

Scias q dies ab ortu solis ad meridiẽ est nature veris. A meridie vo ad occasũ nature estatis. Ab occasu ad mediã noctẽ nature autũnalis. A media nocte ad ortuz nature hyemalis. ¶ Scias q dies ꝛc. Alkindꝰ in. 3°ca° ¶ Itẽ de hac materia dicit̃ in. 31ª differẽtia sexti tractatꝰ introdu-

ctorij Albumazaris. ibi eni habet de naturis tēporū anni ꝛ ptiū dierū ꝛ quartarū zodiaci ꝛ ventorū. ¶ Dubitat quare nō oēm cōbinationē posuit alkindus. ¶ Itē quō planete supiores possunt esse cū sole retrogradi. Ad qđ dicit Leopaldus ꝑ de supioribus nō pōt hoc fieri nisi ꝑ aspectus. ¶ Item sciendū ſm alb umazar in. 28° differentia sexti tractatus sui introductorij ꝑ in oi hora efficiūt in circulo q̄ttuor qrarte. sicut sūt q̄ttuor tpa anni. ꝛ. 12. dom⁹ sicut sūt. 12. signa. Quarta igit ab ascendēte ad mediū celi ꝛ ei⁹ opposita sūt dextre ꝛ masculine. Alie vo sinistre ꝛ feminine. Sūt etiā ibi q̄ttuor anguli q̄ttuor succedētes ꝛ q̄ttuor cadētes. Itē ſm q̄ttuor quarte luminū siles suo modo q̄ttuor āni triplicitatib⁹.

Caplm. 23. De locis pluuiarū in terra ꝛ de ꝑuincijs quibus signis subiecte sunt.

NAture temporū nō sūt in eadē vi in omni terra: imo augent uel diminunt ſm appropinquationez illi⁹ terre ab equinoctiali. ¶ Itē pars orientalis est sicca ꝛ occidentalis humida: meridionalis calida: septētrionalis frigida. Nature tēporū ꝛc̄. hoc habet in alkindo caplo. 5°. Item ps orientalis ꝛc̄. Ptolemeus in. 12°. ca°. prime ptis. ꝛ habent etiā qualitates ſm istas ptes. ¶ Itē Ptolemeus satis concordat cū ista ꝑpositiōe nature tēporū in. 2°. ca°. secūde ptis quadripartiti.

Caplm. 24. Per que loca terre fiunt pluuie.

ITem ciuitates in quibus fiunt pluuie sunt inter latitudinez. 9. graduū ꝛ. 60. graduū In alijs autē ꝑpt multitudinez caloris ꝛ frigoris nō fit nisi caloris siccitas ꝛ gelu. ¶ Item ciuitates ꝛc̄. Alkindus in. 5°. ca°.

Caplm. 25. Que loca terre cuilibet triplicitati subiecta sunt.

ITem Trigonus arietꝭ ptinet ad angulū terre habitabilis inter septētrionē ꝛ occidens. Et eius prim⁹ gubernator est iupiter ꝛ mars habet pticipationē cū eo. ¶ Trigonus tauri ptinet ad angulum qui est inter meridiē ꝛ oriens ꝛ eius prim⁹ gubernator est venus pticeps vo saturnus. ¶ Trigonus geminorū ptinet ad angulū terre int septētrionē ꝛ oriens ꝛ gubernator ei⁹ prim⁹ est saturn⁹ pticeps vo iupiter. ¶ Trigon⁹ cancri ptinet ad angulū qui est int meridiē ꝛ occidens ꝛ gubernator est mars. deinde pticipat cū eo venus. ¶ Itē Trigonus ꝛc̄. hoc a Ptolemeo in. 3°. ca°. secūde partis quadripartiti.

Caplm. 26. De ꝑuincijs quib⁹ signis sint subiecte.

ITem sūt ꝑuincie. 72. cū. 12. signis concordantes ſm Ptolemeū ita ꝑ versus sinistrā sint ꝑuincie remote a medio habitationis ꝛ versus dextrā ꝑuincie ꝓpinque.

Aries britania salatia vescamica.
Taurus cornua media persia
Gemini organia armenia mananeua
Cancer nomdia cargadema africa.
Leo italia gallia apuleia cecilia
Uirgo babylonia algeziraetor.
Libra naquitrina cazqueda azonca.
Scorpio matagonitas marontania cantolia.
Sagictarius torcia calciata hispania.
Capricornus India orbana iadiechia.
Aquarius zaromatica toxana acohod.
Pisces carmi a dogofonia catizomonicas & garatica.
♈ Iosum andonia terre iudeorũ.
♉ toclad cablaz riperus asie minor.
♊ coriãta in armonica insanus egyptus.
♋ zoma tusquia quinginqua.
♌ caprica zallia oratiza.
♍ aloe alaya trozen.
♎ cays ananzes caladotica.
♏ corma comatza cadoquia.
♐ terra de arabia ꝓplata.
♑ braga magodonia a͛babiris.
♒ arania adama & anthiopia mediana.
♓ lodia galliquia tamalia.
Item iste ꝓuintie. hoc a Ptolemeo.

¶ Sciendum ꝙ in quolibet 4º terre sicut ꝓuincie que ꝓprie concordant cũ altero signo triplicitatis gubernantis illud quartũ & cũ planetis gubernantibꝰ. sꝫ hoc diuisimus qꝛ ꝓuincias ſm ista noia nõ bene cognoscimus nec ibi ꝑ quadripartitũ Ptolemei cõplementũ habemus. Quia etiã ꝑ modũ supradictũ poterimus cognoscere cũ quibus stellis seu planetis habuerũt concordantiã sufficiant illa que de ꝓuincijs sc

¶ Item sciendũ ſm Ptolemeũ & haly in tertio caº secunde partis quadripartiti ꝙ si imaginet̃ linea equidistãs equinoctiali & distans ab eo 36. gradibꝰ: Item imaginet̃ linea transiens ꝑ polos mũdi intersecans lineã ꝑdictam & distans ab occidente. 56. gradibꝰ. punctus intersectionis dicit̃ medium terre habitabilis. Due autem linee predicte distinguunt angulos terre predictos. ¶ Secundũ igit̃ ꝙ aliqua ꝓuincia plus appropinquabit medio terre habitabilis ſm hoc plus participabit ut

gubernet a signo ⁊ planeta qui gubernat quartū sibi oppositū cū adiutorio mercurij. ¶ Item sciendū q̄ p effectus possumus cognoscere prouincias ⁊ villas cū signis ⁊ planetis concordantes sicut p complexiões ⁊ mores hominū ⁊ sic de alijs ut dicit Ptolemeus in fine secūdi capituli secūde ptis. ¶ Itē ex tertio capitulo secunde ptis sciendū q̄ stelle fixe concordant cū puincijs sm illū gradū in quib⁹ sunt. Item in eodē capitulo concordantes gradus cū matribus ciuitatū sunt loca in quib⁹ erāt sol ⁊ luna ⁊ loca angulorū ⁊ maxime ascendēs in principio sue edificationis. Et si hec sint ignota aspice ad mediū celi dñi illius ciuitatis qui eā edificare mandauit. Hec autē duo vltima parū aut nihil faciunt ad iudicia mutationis aeris s; forte plus facerent ad iudicia fortuniorū uł infortunioꝝ illius ciuitatis. ¶ Itē Albumazar ponit aliq̄ loca esse in tantū calida ⁊ alia intantū frigida q̄ ibi nullū cōponit aial in tertio tractatu sui introductorij in tertia differentia. Itē nota sm eūdem in q̄nta differentia tertij tractatus q̄ in terris duris ⁊ densaruz partiū ⁊ in locis montiū plus congregant venti q̄z in terris mollibus.

Capitulū vigesimūseptimū.

Item aries habet ⁊c̄. hoc in differentia quarta sexti tractat⁹ sui introductorij. ¶ Item nota si placet sup illa ppositione. nature temporū ⁊c̄. sniam in. 5° ca° Cum volueris scire quantitatē nature temporis apud quam quartā volueris in qua ciuitate vsq̄z ad illam partē. Scias effectus calidorū ⁊c̄. s. in eodem libello Alkindi quinto caplo. Item Albumazar in cōiunctionib⁹ magnis i vltima differentia quarti tractatus ⁊ hyspalensis in plurib⁹ locis. ⁊ Alchabitius ⁊ haly abenragel ⁊ plures alij fecerunt mentionem de istis terris s; forte alias poterunt poni cum p̄dictis q̄uis nō sit magna vis quere hoc.

Sequit secunda pars libri de iudicijs mutationū aeris p cōiunctiones magnas ⁊ eclypses ⁊ introitum solis in punctis equinoctialibus ⁊ alijs locis determinatis in zodiaco signorū.

Ca^m. 1. De ꝑnosticatiõe tẽperiei aeris ex ꝯiũctionib⁹ maximis planetaꝝ

COniũctio maxima est cõiũctio triũ superio-rũ. si igiť cõiungant̃ in exaltationib⁹ suis signant aptationẽ aeris. Sed in casibus suis signãt siccitatẽ ⁊ terre sterilitatẽ. In signo autẽ aquatico multitudinẽ pluuiarũ. In aereo multitudinem ventorũ. In terreo sup̃fluitatẽ frigoris. In igneo siccitatẽ: ⁊ hoc idem intellige de cõiunctione saturni ⁊ iouis ⁊ martis. ¶ Coniunctio maxima est cõiunctio triũ ⁊c. hoc messahalach in. 7°. 9°. 19°. ⁊. 11°. caplis.

Caplm secundũ.

CUm fuerit saturn⁹. s. i signis primarũ cõiunctionũ i quibus fiebãt ꝯiũctiones saturni ⁊ iouis ⁊ ascendẽtib⁹ earũ aut ꝑiecerit radios suos ad ea ex oppositiõe uľ q̃rto aspectu aut fuerit ĩpedit⁹ in signis terreis tenebras aeris ⁊ terremotũ faciet. Si in aereis niues ⁊ flatus ventoꝝ nocibiliũ ⁊ frigus. Si in aquaticis submersiões ⁊ diluuia ⁊ ꝑm quãtitatẽ fortitudinũ i loco erit euent⁹. ¶ Cũ fuerit saturn⁹ ⁊c. hoc i floribus Albumazaris sexti tractat⁹ terremot⁹.

Capitulũ tertiũ.

ITẽ ꝯiũctio saturni ⁊ martis i ariete cuz testimonio iouis ⁊ lũe sig̃t siccitatẽ ⁊ aliq̃d signale i aere. Itẽ ꝯiũctio eoꝝ i tauro cũ testionio luminariũ iouis ⁊ veneris augmentũ aquarũ ⁊ flatũ ventoꝝ. Itẽ ꝯiũctio eoꝝ i cancro cũ testimonio luminariũ ⁊ iouis sig̃t in oibus horizontib⁹ siccitatẽ. Itẽ ꝯiũctio eoꝝ i leone sig̃t timorẽ ꝑpter apparẽtiã signaliũ. Itẽ ꝯiũctio eoꝝ i virgine cũ testionio mercurij sig̃t tempestatẽ i seminib⁹. Itẽ ꝯiũctio eoꝝ i libra cũ testionio iouis sig̃t rubedinẽ i aere i ãno illo. Itẽ ꝯiũctio eoꝝ i scorpiõe si cũ eis fuerit iupiť ⁊ luna sig̃t multas pluuias in pluuialib⁹ locis ⁊ cõmotionẽ mariũ. Itẽ ꝯiũctio eoꝝ i capricorno cũ testionio solis ⁊ mercurij sig̃t multitudinẽ ventoꝝ ⁊ fulguꝝ Itẽ ꝯiũctio eoꝝ in aq̃rio cũ testionio lune sig̃t paucitatẽ aquaꝝ pluuiarũ ⁊ multitudinẽ nubiũ. Itẽ ꝯiũctio eoꝝ i piscib⁹ ⁊ sol fuerit infortunat⁹ ex ꝯiũctiõe eoꝝ sig̃t paucitatẽ roris. ¶ Itẽ ꝯiũctio saturni ⁊c. hoc in cõiũctionib⁹ magnis Albumazar) dria. 8ª 2ª tractat⁹. ¶ Intelligendũ q̃ñ

dicit. Cū fuerit saturn⁹ in signis primarū ꝯiūctionū ꝛ ascendētib⁹ eaꝝ ꝛc̄
ꝑ signa primaꝝ ꝯiūctionū intelligo in qb⁹ fiebāt ꝯiūctiōes saturni ꝛ io-
uis ꝛ sigt q̄ erāt in ascendētib⁹ eaꝝ ꝯiūctionū. Sꝫ quō habet ascēdēs ta-
liū cōiūctionū dicit ꝙ ascendēs alicui⁹ magne ꝯiūctiōis ē ascendēs āni
in q̄ fuit ꝯiūctio illa: q̄re de hoc ꝛc̄. ¶ Itē sciendū ſm haly in fine. 2e ptis
q̄dripti ꝛ ē ſm hermetē ut dicit ꝙ qn̄ ꝯiūgunt due infortune i signo ter
reo ꝛ fuerint ipediti luna existēte secū sigt ꝙ erit terremot⁹ magn⁹ ꝛ rui-
na ciuitatū ꝛ parietū. Et si aqueū erit dānū ꝛ forte nocumentū in aquis
¶ Itē ibidē dicit ꝙ caput draconis calidū. cauda aūt frigida. Si satur-
nus se ꝯiūxerit cū cauda dracōis hora significatiōis sigt ꝛ famē ꝛ forte
frigus. ¶ Itē nota ſm albumazar in dria. 2a pmi tractat⁹ de cōiūctiōib⁹
magnis ꝙ cōiūctio q̄ significauit diluuiū fuit añ illud diluuiū. 287. āni
Haomar dicit. 279. āni. dn̄s orbis tūc satn⁹ cū signo cācri ꝛ fuit diluuiū
die veneris ꝛ fuerit āni ade. 2226. vn⁹ mēsis. 23. dies ꝛ. 4. hore. ¶ Itē ex
textū sic iueni scriptū imediata ꝯiūctio saturni ꝛ iouis i ariete fuit añ di
luuiū p. 81. ānos. ꝛ. 202. dies ꝛ in. 6° gradu ꝛ. 5° minuto arietis. ꝛ hoc si-
gnificauit diluuiū ꝛ sūt dies numero. 29767. ¶ Itē nota vn⁹ orbis cōti
net. 360. ānos cuilibet gradui celi vn⁹ ann⁹. ¶ Itē numer⁹ dierū a pmo
die diluuij vsqꝫ ad primū diē xp̄i annoꝝ q fuit i die sabbati. 1132959.
¶ Itē nota ſm Aristotelē in libro de ꝓprietatib⁹ elementoꝝ ꝙ diluuiū
quod fuit in terra non fuit nisi propter coniunctionem stellarum er-
raticarū in piscib⁹ ꝛ vent⁹ q interfecit gentes in [illegible]ddramoch fuit ꝓpter cō
iūctionē eoꝝ i geminis. ¶ Itē q̄uis diluuiū pticulare potuisset signifi-
cari p ꝯiunctionē planetarū tn̄ diluuiū vl'e nō. sicut forte etiā bonitas ꝛ
excellētia dn̄i nr̄i ih̄u xp̄i seu beate vginis potuerit p stellas repūtari: ut
in Ouidio de vetula aliq̄liter tangit tn̄ ꝙ dĩnitas cū humanitate cōiū-
geret hoc supnālit factū ē. etiā vl'itas diluuij potuit miraculose eo inci-
dere cū tpe significatiōis nālis diluuij pticularis. ¶ Itē sciendū ꝙ dilu
uiū primū fuit in tpe Noe toto orbe terraꝝ cōtecto. 2m diluuiū tpib⁹ ia-
cob patriarche in achaia. tertiū a tpe moysi in thessala cū in mōte pna-
so fugierūt hoīes.

Capl'm. 4. De tēperie aeris p eclypsim.

Cum fuerit eclypsis solis in signis igneis sigt siccitatem ꝛ terre
sterilitatē. Et in aq̄ticis multitudinē pluuiaꝝ ꝛ decrementum
ab eis nisi aspexerint fortune. Cū fuerit eclypsis lune in signis
frigidis sigt grauitatē frigoris ꝛ in aq̄ticis nimietatē pluuiaꝝ
si adiuuat tēpus. i. si fuerit hyems: si fuerit estas sigt tēperamentū aeris
ꝛ sic de alijs. Cū fuerit eclypsis solis i signis igneis ꝛc̄. messahala ch l. 7°
ca°. ¶ Cū fuerit eclypsis lune in signis frigidis. hoc messalha ch l. 5° ca°

Caplm. 5. De significatione eclypsis in qua ꝑte terre ⁊ qñ eueniet.

Item in ꝓuincia uel ciuitate cũ signo eclypsis concordan te maxime si fuerit ibi visibilis eclypsis erunt accidentia potissime que ꝑ eclypsim significant̃. ¶ Itẽ accidens du rat sm numerũ horaꝝ equaliũ duratiõis eclypsis ꝑ ãnos videlicet si fuerit solis. menses aũt si fuerit lune. ¶ Item principiũ accidentis erit sm qδ distat eclypsis ab ascen dente. vbi gratia: si sit versus orientẽ erit in q̃ttuor primis mensibꝰ ⁊ erit maior fortitudo in termino primo totius durationis accidẽtis: ⁊ si ver sus mediũ celi pricipium erit in alijs quattuor mensibꝰ ⁊ maior fortitu do erit in termino medio: ⁊ si fuerit versus occidentem principiũ erit in quattuor vltimis mensibꝰ ⁊ erit fortitudo in termino postremo. Itẽ au gmenta uel decrementa accidentium veniũt in locis habentibꝰ in alijs accidentibꝰ rationẽ: uel in locis habentibꝰ cũ eis ꝑticipationẽ in figura. Veniũt etiã augmenta accidentiũ uel decremẽta sm status essentiales ⁊ accidentales planetarũ significatorũ ⁊ sm ꝑticipationẽ eorũ in figu ra cũ signis accidentia oꝑantibꝰ. Unde si significatores fuerint oriẽta les stantes veniet ꝑ eos augmentum. ⁊ si occidentales ⁊ sub radijs aut ascendentes prima nocte retrogradi veniet per eos decrementum acci dentiũ. ¶ Significatores autẽ eclypsiũ appellant̃ illi qui habuerunt di gnitates essentiales ⁊ accidentales in loco eclypsis ⁊ angulo qui ẽ ante eclypsim: sicut sunt applicatiões ⁊ ꝑtinentie terre ⁊ sm ꝑticipationem fi gure: aut q̄ fuerint dñi exaltationũ trigonorũ aut terminorũ ⁊ hoc siue sit vnus ul' plures. Si tñ fuerint plures dñs loci eclypsis est p̄ponendus: si vo plures ibi habuerint equales dignitates p̄ponemus eũ qui magis fuerit ibi circa angulũ aut in suo haiz. Postea signatores in stellis fixis lucẽtibus sũt etiã considerandi ⁊ illi qui sũt in signo eclypsis uel cũ an gulo qui fuerit ante eclypsim. Ultimo vo considerandꝰ est planeta q ho ra eclypsis fuerit cum ascendente uel cũ medio celi qualiscunq; sit eorũ qui sequunt̃ locũ eclypsis. ¶ Figure autẽ bestiaruʒ siluestriũ a parte se ptentrionali qñ habuerint fortẽ significationẽ in eclypsibus significãt ꝓprie terremotũ ruinã castrorũ ⁊ motuũ aeris sine suspitiõe. a parte vo meridiei significãt cursũ ventorũ ⁊ multitudinẽ pluuiarũ suo tꝑe. ¶ Itẽ in ꝓuincia uel ciuitate ⁊c̃. hoc habet̃ ex dictis Ptolemei ⁊ haly. 5° ca° se cũde ꝑtis. Itẽ accidẽs ⁊c̃. hoc habet̃ in ca° eiusdẽ ꝑtis. Itẽ principiũ ⁊c̃. hoc in ca° Itẽ augmenta ⁊c̃. hoc a Ptolemeo in. 6° ca° eiusdẽ ꝑtis. Si gnificatores ⁊c̃. hoc totũ vsq; ibi. Si igit̃ saturnꝰ. extrahit̃ ex dictis Pto lemei in septimo caplo secũde ꝑtis quadripartiti.

Capitulū sextm̄. significatione significatoꝝ eclypsiū

Tem si signatores tp̄e eclypsis fuerint in signis solstitiali bus uel equinoctialib⁹ significatio sua generaliter erit in statib⁹ aeris in ꝓprijs temporib⁹ illi signoꝝ sicut .i ariete si in vere: in cancro v̄o si i estate ⁊ sic de alijs.

Capl'm septimū De significatiōe almutez eclypsis: ⁊ de dignitatibus essentialibus ⁊ accidentalib⁹ que sint.

SI igit̃ saturn⁹ fuerit solus gubernator signat dānū ꝑpter frigus niues magnas grandines ⁊ nubes spissas potissi me cū significatio eius fuerit in statu aeris. Si iupiter si gnificat temperiē aeris cū multitudīe ventorū. Si mars sig̃t calorē ⁊ siccitatē ⁊ vētos calidos ⁊ corruptos ⁊ mor tales tempestates radios ⁊ radios qui dicit̃ caristo cū paucitate pluuia rū. Si venus significat temperamentū aeris cū ventis humidis nutriē tibus. Si mercurius significat ventos turbinosos ⁊ festinos qui de leui mutant̃ tonitrua coruscationes terremotus ⁊ relāpagos: ⁊ qñ abscōdi tur sig̃t minutionez in aquis: ⁊ qñ apparet auget. vnde qñ intrat sub ra dijs facit siccitatē ⁊ exit de sub radijs ⁊ ascēdit opat̃ humiditatē. ¶ No tandū etiā ꝙ loca in quib⁹ mercurius facit siccitatē sunt qñ est in digni tatib⁹ planetarū siccorū aut cū eos aspicit aut qñ intrat sub radijs so lis ⁊ ecōtra autē est de humiditatib⁹. ¶ Si igit̃ saturn⁹ ⁊c̄. hoc habet̃ ex dictis Ptolemei in. 8° ca° secūde partis quadripartiti.

¶ Sciendū ꝙ multa alia sūt iudicia ꝑ eclypses que hic nō ponunt̃ quia nō multū faciūt ad ꝓpositum. sȝ de hoc specialē tractatū facere intendi mus ꝑ dei gratiā. ¶ Nota ꝺm haly in sexto ca° eiusdē ꝑtis ꝙ ab horis tē poralib⁹ sciemus qñ erit accidens: ⁊ ab horis equalib⁹ quāto tp̄e dura bit: ⁊ ab ascendēte principij eclypsis sciemus principiū accidentis: ⁊ ab ascendēte medij qñ erit maior fortitudo: ⁊ ab ascendēte finis cōplemē tū. Et ab ascendēte diūctionis sciem⁹ planetā dn̄antē. ¶ Itē sciendū ꝙ ꝑ horas tp̄ales cognoscim⁹ qñ erit accidēs: pȝ ꝙ significatio eclypsis so lis nō pōt elongari vltra. 12. ānos. lune v̄o vltra. 12. mēses. ¶ Itē scien dū ꝙ si cū eclypsi solis fuerit aliq̄ cōiūctio magna uel ꝑua duplicabunt̃ anni duratiōis ꝺm temp⁹ reddit⁹ illi⁹ cōiunctiōis uel oppositiōis uel al teri⁹ applicatiōis: ⁊ sic accidētia durāt denaria uel centenaria ul' mille naria annoꝝ. Si v̄o hoc fuerit cū eclypsi lune duplicabunt̃ in menses. Vbi gratia. Si cū eclypsi solis fuerit cōiunctio saturni ⁊ iouis in ꝑ̄ncipio arietis ⁊ durauerit eclypsis ꝑ duas horas durabit accidens fere. 12000. ānorū ⁊ si lune tot menses. Verū est tn̄ ꝙ in tanto tp̄e mutant̃ accidētia

p similitudinē uel dissimilitudinem significationū eclypsiū ⁊ coniūctionū cōmediarū ⁊c. ¶ Itē sciendū q̄ fortitudo maior fuerit in principio medio uel fine durationis ascendētis ſm elongationē ab ascendēte ē regula generalis eclypsib⁹ cōiunctionib⁹ ⁊ oppositionib⁹ ⁊ oib⁹ applicationibus. ¶ Itē nota sup illa pticula. signatores ⁊c. ſm haly. 7º. caº. 2ᵉ ptis q̄ dignitates essentiales planetarū sūt sicut dom⁹ exaltatio triplicitas terminus ⁊ facies. Accidētales aūt sūt applicatio sepatio oriētalitas occidentalitas masculinitas uel feīnitas. Aptio aūt cū sole ⁊ luna pticipatio in figura uel q̄ sit cū eclypsi sup vno circulo uel sup duobus circulis eq̄distantib⁹ uel q̄ habeat sitū talē qualē h̄z eclypsis ⁊ hoc ē esse cum in vno circulo ex circulis q̄ sūt eq̄distātes horizonti. Vbi grā: q̄ si altitudo eclypsis versus orientē sit. 7. graduū q̄ etiā ille planeta versus occidens habeat altitudinē. 7. graduū ⁊ hac manerie q̄ habeat dignitates in angulo q̄ ascendit aū eclypsim essentiales uel accidētales talis ē dn̄s eclypsis. ¶ Itē sciendū ſm haly q̄ angul⁹ añ eclypsim dicit̄ ille q̄ h̄z transire p locū p modū equinoctij. ¶ Itē sciendū ſm haly ibidem q̄ si plures signatores fuerint equales in dignitatib⁹ p̄ponendus est ille qui fuerit in angulo fortiori ⁊ generalit̄ ille qui fuerit in suo haiz. ¶ Itē ſm haly ibidem Ptolemeus noiauit signatores sic sole ⁊ luna q̄r op⁹ eo℞ reducit̄ ad nām p̄dn̄antis. ¶ Itē sciendū ſm haly ibidē q̄ stelle lucētes de q̄b⁹ facit mētionē Ptoleme⁹ in. 5. p̄mis magnitudinib⁹. ¶ Itē sciēdū ſm haly ibidē q̄ angul⁹ añ eclypsim sup ptē occidētalis ab eclypsi ⁊ angulus q̄ sequit̄ eclypsim se ponet in loco eclypsis in motu firmamenti p quē facit diē ⁊ noctē. ¶ Itē ſm haly ad figuras anguli anterioris ⁊ est q̄ postea sequit̄ aspicere nō oportet. ¶ Sciendū q̄ ex dictis haly ⁊ Ptolemei habet̄ q̄ angul⁹ occidentis p̄fert̄ medio celi ⁊ mediū celi ascendēti q̄r si eclypsis sit supra terrā ascendēs nō pōt esse occidentalis ab eclypsi ⁊c. q̄re de hoc. ¶ Itē p colores in eclypsib⁹ apparētes pōt fieri iudiciū: s̄z de hac materia in fine hui⁹ poterim⁹ facere mentionē. ¶ Item in centiloquio Ptolemei ⁊ in hyspalensi fit mentio de eclypsib⁹ ⁊ alibi vide si vis placet mihi.

Ca. 8. De significatiōe marij hora reuolutiōis.

Si in hora reuolutionis anni mars fuerit in domib⁹ suis siḡt multitudinē pluuiarū. Si i domib⁹ autē saturni paucitatē earū. In alijs autē mediocritatē earū. Si in hora reuolutiōis ⁊c. hoc habet̄ ab albumazare in florib⁹ suis in caplo Scia autē pluuiarū ⁊ in coniūctionib⁹ magnis capitulo. Et ab hyspalensi capitulo primo.

Capitulū. 9. De sig̃tione saturni ⁊ reliquorū planetarū in singulis signis hora reuolutionis

Item si saturn⁹ hora reuolutiōis fuerit in ariete ⁊ ei⁹ latitudo fuerit septentrionalis sigt̄ corruptionē ⁊ densitatē aeris. Si fuerit meridionalis grauitatē frigoris ⁊ gelu in suis tpib⁹. Saturn⁹ in tauro septētrionalis signat tēperamentū: ⁊ pluuie erunt vtiles. meridionales vo corruptionē aeris. Saturnus in geminis septētrionalis sigt̄ ventorū flatū vehementiū ⁊ terremotus. meridionalis paucitatē pluuiarū qꝛ si cū hoc occidētalis fuerit sigt̄ siccitatē aeris ⁊ desiccationē fontiū. Saturnus in cācro: septētrionalis sigt̄ paucitatē aquarū in fluminib⁹ atqꝫ pluuiarū. meridionalis mediocritatē. orientalis frigus tpe suo. occidētalis pluuias ⁊ ventos. Saturn⁹ in leone: septētrionalis multitudinem sigt̄ pluuiaꝝ. Saturn⁹ in virgine: septētrionalis sigt̄ suauitatē ventorū. meridionalis paucitatē pluuiaꝝ ⁊ cōsumptionē aquarū fontiū. Saturnus in libra septētrionalis sigt̄ siccitatē aeris ⁊ calorē ei⁹ paucitatē pluuiarū ⁊ cōsumptionē aquarū. meridionalis vo suauitatez ventoꝝ. Saturnus in scorpiōe: septētrionalis sigt̄ multitudinē pluuiaꝝ ⁊ abundantiā aquaꝝ fluminū. Saturn⁹ in sagictario: septētrionalis sigt̄ multitudinē aquaꝝ fontiū ⁊ frig⁹ hyemis. Saturn⁹ in capricorno: septētrionalis sigt̄ tēperamentū aeris. meridionalis tenebras aeris tpe hyemis nubes atqꝫ frig⁹. occidētalis calorē. Saturn⁹ in aquario: septētrionalis signat multitudinē pluuiaꝝ grandinē frigus ⁊ gelu. meridionalis paucitatez aquaꝝ fontiū ⁊ fluminū. Saturn⁹ in piscib⁹: septētrionalis sigt̄ multitudinē flatus ventoꝝ septētrionaliū ⁊ grauitatē frigoris hyemis. ¶ Jupiter in ariete: septētrionalis bonā cōplexionē aeris ⁊ paucitatē pluuiaꝝ meridionalis corruptionē ventoꝝ ⁊ grauitatē eoꝝ. Jupiter in tauro septētrionalis signat imobilitatē aeris ⁊ calorē. meridionalis abundantiā pluuiaꝝ ⁊ aquaꝝ fontiū. Jupiter i geminis: septētrionalis bonitatē ventoꝝ mediocritatē pluuiaꝝ. meridionalis multitudinē tonitruoꝝ ⁊ fulminū. Jupiter i cancro: septētrionalis bonitatē aeris ⁊ abundantiā pluuiaꝝ tonitruoꝝ ⁊ fulminū. meridionalis pulchritudinē aeris. Jupiter i leone: septētrionalis grauitatē tonitruoꝝ ⁊ fulminū. meridionalis siccitatē aeris ⁊ paucitatē pluuiaꝝ. Jupt̄ in virgine: septētrionalis sigat paucitatē tonitruoꝝ ⁊ fulgurū ⁊ ml't'itudinē pluuiaꝝ. Si meridionalis pulchritudinē aeris. Jupit̄ i libra: septētrional' sigt̄ multitudinē vētoꝝ occidētaliū. meridionalis paucitatē pluuie. Jupit̄ i scorpiōe: septētrionalis bonitatē vētoꝝ. meridionalis multitudinē tonitruoꝝ. Jupit̄ i sagictario: septētrional' bonitatē aeris. meridional' paucitatē pluuiaꝝ. Jupit̄ i capri. septētrional' multitudinē tonitruoꝝ ⁊ pluuiaꝝ ⁊ fulgurū

Jupiter in aqrario septẽtrionalis tenebras aeris ⁊ multitudinẽ plu-
uiarũ.meridionalis multitudinẽ tonitruorũ ⁊ fulgurũ. Jupiter in pisci
bus septẽtrionalis significat multitudinẽ aquarũ fluminũ ⁊ fontiũ.me
ridionalis multitudinẽ pluuiarũ ⁊ paucitatẽ tonitruorũ ⁊ fulminũ.
¶ Mars in ariete septẽtrionalis signat calorẽ aeris ⁊ paucitatẽ pluuia
rũ.meridionalis grauitatẽ tonitruorũ ⁊ fulminũ. Mars in tauro septẽ
trionalis multitudinẽ pluuiarũ ⁊ bonitatẽ herbarũ.meridionalis mul
titudinẽ tonitruorũ septẽtrionaliũ. Mars in geminis septentrionalis
multitudinẽ pluuiarũ. meridionalis paucitatẽ aquarũ fontiũ ⁊ flumi-
nũ. Mars in cancro septentrionalis paucitatẽ aquarũ fontiũ ⁊ multi-
tudinẽ frigiditatis in tpe suo.meridionalis flatũ ventorũ. Mars i leone
septẽtrionalis paucitatẽ aquarũ:directus flatũ ventorũ occidentaliũ.
Mars i virgine
Mars i libra septẽtrionalis multitudinẽ tonitruorũ ⁊ fulminũ. Mars
in scorpione septẽtrionalis paucitatẽ aquarũ. meridionalis multitudi
nem aquarũ fontiũ. Mars in sagictario septẽtrionalis bonitatẽ ⁊ pul-
chritudinẽ. Mars in capricorno septẽtrionalis multã niuẽ cũ frigore
nimio.meridionalis calorẽ. Mars in aquario septẽtrionalis multitu-
dinẽ frigoris ⁊ niuis. meridionalis grauitatẽ caloris specialiter retro-
gradus. Mars in piscib⁹ septẽtrionalis significat bonitatẽ cõplexionis
aeris.meridionalis   Itẽ si saturn⁹ hora reuo-
lutionis ⁊c̃.hoc extrahit ab Albumazare in florib⁹ suis caplo tracta
tus in ptibus latitudinis ⁊c̃. ⁊ in duob⁹ sequentib⁹ caplis. dicit etiã in
fine illorũ capitulorũ q de inferiorib⁹ nõ facit mẽtionẽ q suos effect⁹
nõ est ita exptus sicut de trib⁹ supiorib⁹.   Capitulũ decimũ.

ITẽ in reuolutiõe anni si plures planete fuerint cõiũcti i signis
aq̃ticis sig̃t multitudinẽ pluuiarũ. In igneis supfluitatẽ calori
siccitatẽ ⁊ terre sterilitatẽ. In aereis multitudinem ventorũ. In
terreis gelu atq niues. Siliter in q̃rtis ãnis cũ fuerit i signis fri
gidis sig̃t grauitatez frigoris. ¶ Itẽ cũ mars fuerit dñs q̃rte estiualis ⁊
fuerit in aliq̃ domorũ mercurij sig̃t multitudinez pestilentiarũ. Et scito
q grauitas siccitatis ⁊ terre sterilitas ⁊ penurie ãnone nõ fit nisi ex con
iũctione planetarũ i signis igneis ⁊c̃. Itẽ in reuolutiõe ãni ⁊c̃.hoc mes-
sahalach in.4º.caº. ¶ Itẽ in reuolutiõe ãni si saturn⁹ fuerit i signo terreo
⁊ nõ fuerit planeta beniuol⁹ aspiciẽs ipsũ ⁊ fuerit luna i aspectu q̃rto uł
opposito cũ ipso tũc sig̃bit sup terremotũ magnuz in q̃libet loco in cui⁹
signo fuerit saturn⁹ aut in aliq̃ angulorũ signi terre. Itẽ in reuolutione
⁊c̃.hoc Abraham secũdo capitulo. ¶ Item in reuolutiõe anni si mars
fuerit in signis calidis addet caliditatem: saturnus autẽ minuet: sz qñ

saturnus est in terreo addet frigiditatē. mars vo minuet. Mars autem
i aereo addet caliditati sue. saturn⁹ vo minuet ex ea. Saturn⁹ in aqueo
addet frigiditatē. mars minuet eā. Itē in reuolutione rc. hoc Alkindus
8° caplo. ¶ Item in reuolutione inspice dnm anni r lunā r partē fortu
ne r dnm partis r tardagotū r quis habuerit dominiū sup omnes. Si
saturnus venus r luna r mercurius: erit pluuia anni multa maxime si
fuerit in signis pluuiosis in aquario aut i fine capricorni r arietis r tau
ri r principio leonis. Amplius illis scorpio piscis r aquari⁹ rc. Item in
reuolutiōe rc. hoc Alkindus. 8° caplo. ¶ Amplius sub anni cōuersione
mars in scorpione venerē respiciens imbrib⁹ emanat. venus autem in
scorpione existens a marte respecta ꝓpter maria que scorpio habet plu
uiarū facit iudicium. Si vo martis aspectu careat ex relicto ducato nō
erit multarū imbriū vbertas. Itē venus r luna r mercuri⁹ sub anni cō
uersione in locis pluuiarū earū aufert redūdātiā. ¶ Sūt pluuiarū loca
vtraqꝫ domus saturni. earūqꝫ opposita leo videlicet r cancer. de quorū
numero pisces itidē erūt ꝓpter riuos quos habent r flumina. r sagicta
rius ꝓpter maria que in eius extrema sūt uel existunt. r scorpio ꝓpt sua
loca r littora. Luna itaqꝫ applicans veneri in eisdē locis imbres ꝑten
dit futuros. Sūt autem paucorū imbriū signa taurus r gemini. verūtñ
tauri principiū r arietis finis ꝓpter nubes quas i pluuias iudicant. non
minus quoqꝫ virgo r libra modicas habent pluuias. capricornus autē
plus habet frigoris r siccitatis q̄ꝫ pluuie: nec in ipso fient imbres. r nisi
luna de ipso stellam in loco aquarū respiciat. Uenus r mercurius sub
lumine martisqꝫ aspectu. Mars ipsi lune lumen ab eis resecat r ꝓhibet
nisi inquit cōuēt⁹ uel oppositio sint in ipso sic nec pluuias affert. ¶ Am
plius rc. hoc in illo libro qui incipit. Cū multa rc. ¶ Item sub anni cō
uersione r quartarū eius scias ascendēs r vtrū luna sit in signo frigido
uel calido uel humido uel sicco rc. planete applicantes rem coartantur
maius qdē iudiciū pluuiaꝝ si dño circuli qui post lunarē collocāt r de
scendenti applicās imbres apportat multimodas. ea etiā marti appli
cante si aūt ab eadē recedēs veneri applicet pluuias efficit r rores. Ea
dem q̄qꝫ a ioue recedēs cū mercurio facta applicatione: uel dū saturnū
relinquit soli applicans nō aliud dabit iudiciū. Potior quoqꝫ que diri
mus de oppositiōe r in signis que aquas significāt facta applicatione:
Cuiusmodi sūt aquari⁹ leo r scorpio in gradib⁹. s. eorūdē. Itidē etiā in
geminis r sagictario cōuentu itaqꝫ aut respecta forti deprehēso r luna
in domo ꝓpria saturno applicans aut in piscib⁹ veneri aut in aquario
cū venere r mercurio imbres vtilissimos r multiplices īducit. ¶ Item

sub anni cõuersione ꝛc̃. in hoc libello qui incipit Cũ multa ꝛc̃. ¶ Item in ingressu solis in scorpionẽ si fuerit venus orientalis: in ãni principio multos: in fine vo paucos denunciat imbres. occidentalis vo econtra. Soli etiã i eodẽ signo coniũcta: anni ꝛ mensis illiꝰ in quo cõueniũt principia imbribꝰ emanant. Qđ si de venere aliter accidat dum sol arietis exordia ingredit̃. oriente cõstituto ceterisq; cardinibꝰ firmatis que oriẽtalis termini dominiũ vendicauerit stella: hec beneficia pluuiarũ ꝑ totum annũ administrat. Ueneris itaq; ꝛ mercurij ꝛ lune aut ptis alteriꝰ cum eadẽ applicatio uel cõuentus dum tres he stelle in signis morent̃ aquaticis. aut luna alteri applicat dũ nulli duarũ applicet imbres multiplicat. Mercuriꝰ etiã a marte corruptus aut sub adustione consistens ꝛ luna eidẽ applicans: primo paucas: medio multas nõ tñ sine fulgure ꝛ tonitruis ꝛ aeris corruptiõe adducit pluuias. ¶ Rursum eo anno pluuie rarescũt quotiens luna cum marte fuerit: aut eidẽ venus applicet: ꝛ aut forte sit a dusta: luna iterũ cum sole aut marte: aut si saturno mercurius applicet ꝛ luna eorũ alteri in anni principio pluuie redũdant: in fine vo minuunt̃ nubiũ densitate facta ꝛ etiã aere corrupto. nam ioue in signo aquatico existente dũ venus ꝛ luna eidẽ applicent: eo anno multos: sꝫ martis cum eo applicatio pauci. Amplius orientalis dñs qui ꝛ ipse toto anno imbriũ gaudet dñatu ꝛ cardine fortunatis applicans totum annũ reddit pluuiosum. Ipse nanq; a marte corruptus idẽ cum eo signũ obtinens dũ tñ luna marti applicet: nubibꝰ multis ꝛ paucis manabit imbribꝰ. Signũ iterũ in quo cõueniũt si est aereũ: ꝛ luna sit eideꝫ applicata rores multiplicat ꝛ nebulas. Qđ si idem mercurius imbribꝰ fruat̃ dominio ꝛ ipse corruptus: graues ꝛ multos eodẽ ãno nũciat imbres. Sicq; corruptio ex ventis ꝛ nubibꝰ generat̃. Si autẽ hic fuerit iupiter q̃uis corruptus ꝛ si pauce sunt nulla tñ aeris erit corruptio. Uenus autẽ hanc dignitateꝫ vendicans ꝛ marte infelice uel adusto absq; imbriũ stilla nebulas exauget ꝛ rores. Mars item eadeꝫ potius dignitate paucas pluuias pauciores rores inducit. Saturnus itideꝫ ꝛ si paucis humectet imbribꝰ nebulas frequenter miscebit: in signo tñ discurrẽs aquatico moduꝫ pluuijs adhibebit. ꝛ adhuc ꝑscripti dñi beniuolentia nubibꝰ accident nõ vlla quoq; industria venerẽ mercuriũ ꝛ lunã eorũq; ꝑscriptos effectus necesse est. Alterna nãq; eorũ applicatio rores multiplicat aut detrahit luminari applicatione cũ fortunatis ꝛ infortunatis deprehensa. Imbriũ quidã ꝓhibitio a marte sole ꝛ saturno ꝓcedit. Saturnus tamen in aquaticis pl uuias inducit. ¶ Item in ingressu solis. hoc Daomar.

¶ Sole itaq̃ primũ libre ꝛ capricorni punctum ingrediente oriens fir meẽ nõ minus quoq̃ stellarũ loca ꝑscrutari necesse: quib⁹ diligenti obseruatiõe ꝑquisitis si que sit veneris ꝛ mercurij ꝛ lune applicatio sꝫ etiã martis locus ꝛ cui applicet mente ꝑuigili notandũ est. nubiũ eni obductio: ꝛ roris beneficiũ: pluuiarũq̃ modus iuxta omnẽ stellarũ applicationẽ: sicut de principio anni dictuꝫ est: poterit deprehendi. Sole itaq̃ primũ ꝛc̃. hoc haomar ꝛc̃. Capitulũ vndecimũ.

Item si saturn⁹ prefuerit significatori ãni absq̃ respectu martis uel alteri⁹: erit superfluitas frigoris in hyeme i vniuersis regionib⁹ frigidis septẽtrionalib⁹. ꝛ regiões vltra modũ calide tẽperabunt: ꝛ fortificabit in frigiditate ꝛ siccitate cũ fuerit ascendens in circulo sue augis. ¶ Mars cũ prefuerit significatori ãni tꝑabit frig⁹ hyemis in regionibus septẽtrionalib⁹. ꝛ opabit partẽ huiusmõi cũ in hyeme iuent⁹ fuerit in signis septẽtrionalib⁹ ꝛ in estate in meridionalibus erit superfluus calor interimens aialia. ¶ Itẽ si saturn⁹ ꝛc̃. hoc in dr̃ia q̃rti tractat⁹ Albumazaris. ¶ Itẽ cũ intrat sol librã. si venus sit sub luce solis ꝛ cũ hoc sit occidentalis: pluuia erit multa in exordio: i fine autẽ pauca. Si autẽ orientalis ꝛ visibilis erit pluuia econuerso. Si vo fuerit actualitas sua post illã horã ꝑ mensẽ ꝛ dimidiũ: significat multã pluuiã in medio ãni: ꝛ quanto erit plus vn⁹ sub radijs plus mutabit aer ad pluuiã. ¶ Itẽ cũ intrat sol librã ꝛc̃. hoc Alkindus. 8⁹ ca͂ hoc idem hyspalensis.

¶ Item sub ingressu solis in libraꝫ venus ante solẽ min⁹. 30. gradibus discurrens ꝛ directa hyemis principia pluuijs humectat. Si vo nec ab inuicẽ distiterint circa finẽ ad ipsuꝫ ꝓmittit. Si vo maior q̃̄. 30. graduũ fuerit distantia hyemis principiũ frigore sꝫ paucis redundat imbribus donec interiectũ spaciũ ad minorẽ redeat quantitatẽ quotiẽs autẽ suo cursu minor vno signo attendẽda erit distãtia ann⁹ ille multiplices habebit pluuias maiorẽ quoq̃ imbriũ abundantiã solis ꝛ veneris in eodẽ signo generat ꝓgressus. ¶ Itẽ sub ingressu solis ꝛc̃. hoc in libello Cũ multa ꝛc̃.

¶ Item anni pluuiosi status ab ingressu solis in librã vsq̃ ad. 20. scorpionis gradũ nõ min⁹ a luminari applicatione cũ ceteris stellis potissimũ dependet. Stella igit̃ cui luna applicat orietalis existens. finẽ anni uel mensis aut etiam ebdomade monstrat pluuiosũ. occidentalis nãq̃ predictorũ initia imbriũ beneficio decorat. Hec tamẽ applicatio ꝓprie cum venere facta ꝛ mercurio que dicta sunt minuunt. Alia nãq̃ orientalis ꝛ altera occidentalis dum luna eisdem applicatur cões ꝑ totum annum necnõ maximas denotat pluuias. Imbrium nanq̃ multitudo

dum venus ꝛ mercurius scorpiũ capricornũ aquariuȝ ꝛ pisces ingredi
festinãt ꝑcipue manat. Sȝ etiã eorũ cũ luna de locis humidis nõ sine
respectu applicatio: cũ ita se habeant pluuias generales iutiles osten-
dũt Luna q̊ꝗ alteri applicãte dũ alterã luna respiciat q̃diu respect⁹ in-
erit donec ab altera sepet̃ nõ aberit imbriũ multitudo. Luna itidẽ cum
saturno applicans molles ꝛ suaues pluuias sȝ etiã quietas ostẽdit ꝛ ne
bulas obscuras ꝛ nigras. Si vo marti imbres ꝛ tonitrua ꝛ coruscatio-
nes apportat plerũꝗ petras ꝛ grandinẽ ꝛ nubes croceas ꝛ ruborẽ de-
sup ꝛ candorẽ habentes. Mercuri⁹ qdẽ hui⁹mõi assumpto ducatu plu-
uias ventoꝝ rabiẽ eoꝝꝗ asperrimos nũciat discursus: nubes etiã incõ
tinuas ꝛ dispersas croceas quoꝗ ꝛ fumi colorẽ habentes inducit. Sol
autẽ si huiusmodi ducatuȝ assumat: guttas grandines ꝛ nubes croceas
portendit. Uenus aũt eodẽ assumpto pluuias molles ꝛ cõtinuos rores
multos imbrib⁹ similes ꝑfecto generat. Jupiter serenũ ꝛ ventos habet
ꝓpitios. Nõ aliter q̊ꝗ ceterarũ stellaꝝ adinuicẽ facta cõmunitas siue
mixtio cõem ut supradictũ est exhibet efficatiã. Sȝ illarũ etiaȝ ducatos
alternos: que nubiũ colores ꝛ aeris variationes. His ꝑmit⁹ cõpensatis
ꝑ totũ annũ cũ difficultate remota spectare licebit. ❡ Jtẽ Anni pluuiosi
ꝛc̃. hoc Japhar ꝛc̃. ❡ Jtem notandũ ꝙ qñ sol ad primũ gradũ scorpio
nis ꝓuenerit si mercuriũ ꝛ venereȝ orientales esse contigerit pluuias in
principio anni futuras nulli sit hesitatio: potius quideȝ si luna crescens
lumine in austrũ descendat venerẽ ꝛ mercuriũ respiciens aut saltẽ dum
ab altero sepat̃ alteri applicet ꝛ vndiꝗ recepta: sic eni sub anni pricipio
pluuias indubitanter adducit. Utriusꝗ rursũ occidentalitas ꝛ lune cũ
vtroꝗ uel saltẽ alteruter applicatio ꝛ ipsa occidẽtalis videlicet sub men
sis principio ad septimũ uel ad octauũ diem ascendat ꝛ post solẽ vadat
ad occasum: ꝛ ipsa etiã descendens cursu velox ꝛ luce crescens imbres i
fine ãni ꝑtendit futuros. Si vo lunã ꝛ huiusmodi stellas a dñis domo-
rũ suarũ uel regnorũ recip cõtingat ex multiplici imbriũ nec inutili re
dundantia fruct⁹ ꝛ victualiũ seruat̃ vbertas. Jtẽ notandũ ꝙ qñ sol ꝛc̃.
hoc in libello Cũ multa. ❡ Jtem cũ sol intrauerit. 20. gradũ scorpionis
apta ascendens angulos ꝛ planetas illa hora: postea aspice iouẽ vene-
rem ꝛ mercuriũ: ꝛ si omnes tres inueneris occidẽtales aut retrogrados
iudica ꝙ illo anno erũt multe pluuie ꝛ humiditates. Et si oẽs inuene-
ris orientales ꝛ directos ꝛ multi cursus significat ꝙ illo anno erũt pau-
ce pluuie ꝛ humiditates. Postmodũ aspice martẽ ꝛ si eũ inueneris i ali
quo angulorũ maxime in medio celi in aliquo signorum aereorũ ꝛ ha
buerit aliquã cõmixtionẽ cũ mercurio signat tonitrua coruscationes ꝛ

pluuias dãnabiles ⁊ fortes que veniũt vna hora ⁊ poſtea recedunt ⁊ ſi-
gna ⁊ locuſtas ⁊ damnũ in aere. Et ſi mars fuerit in aliquo ſignorũ ter-
reoꝝ i angulo terre ⁊ fortune fuerint appodiate ⁊ habuerit cõmixtionẽ
cũ mercurio ſignat terremot⁹ ⁊ apparitionẽ igniũ in aere ⁊ res expaue-
ſcendas ⁊ damnũ in mineris ⁊ ſulphuratis terris. Et ſi mars fuerit i an-
gulo terre in ſignis igneis ſignat combuſtionẽ aeris in terra ⁊ damnãt
omnes ꝓprietates terre ⁊ minere ⁊ damnant̃ ⁊ comburunt̃ meſſes. Et ſi
fuerit mars in angulo terre in ſigno aqueo i aquis diminutionẽ ſignat
⁊ damnum in eo toto qđ eſt in illis de aialibus ⁊ alijs rebus. Et ſi fortu-
ne habeant cõmixtionẽ cum eo minuũt ⁊ ꝓhibent damnũ tonitruorũ ⁊
coruſcationũ in illo anno. Et ſi fortune cum illo nullã cõmixtionez ha-
buerint tonitrua ⁊ coruſcationes faciũt damna in illo anno ⁊ erunt ra-
dij multi. ¶ Et ſi vice martis in hoc fuerit ſaturn⁹ ⁊ fuerit in medio celi i
aliquo ſignorũ aereorũ ⁊ habuerit cõmixtionẽ cuz mercurio ⁊ fortune
ab eo remote fuerint ſignat damnũ in aere ⁊ multas pluuias damnabi
les ⁊ durabiles que nõ abſcindent̃. Et ſi ſaturnus fuerit in angulo ſicut
ꝑdixim⁹ ⁊ in ſignis terreis ⁊ habuerit cõmixtionẽ cum mercurio ⁊ fortu
ne ab eo remote fuerint: accident terremotus ⁊ apparebũt ſuꝑ terram
aque magne ⁊ ſimilia. Et ſi fuerit in ſignis aqueis ⁊ in angulo terre ⁊
fortune ab eo remote fuerint ⁊ habuerit commixtionem cum mercu-
rio minuent̃ aque in puteis ⁊ damnantur omnes res que morant̃ in
aqua de aialibus ⁊ alijs rebus. Et ſi fuerit in ſignis terreis ⁊ ſub terra ⁊
fortune remote ab eo fuerint ⁊ habuerint cõmixtionẽ cũ mercurio ſigt̃
damnũ in terra ⁊ ꝓprietatib⁹ ſuis ⁊ minerijs: ⁊ ſi mercuri⁹ nõ habuerit
cõmixtionẽ cum eo erunt ſignationes ꝑdicte tñ minores ⁊ leuiores. Et
habuerit cõmixtionẽ fortunarũ miſce ſignatores anni ⁊ temperabit̃: ⁊
etiã minuent̃ damna que diximus. ¶ Itẽ cum ſol intrauerit 20. ⁊c̃. hoc
haly in. 20°. ca° octaue ꝑtis. Idem in libro h[illegible]omaris: ⁊ in. 6°. ⁊. 8°. capitu-
lis Alkindi. ¶ Item in introitu ſolis in. 20. graduz ſcorpionis rectifica
aſcendẽs ⁊ locũ lune ⁊ alias ſtellas ⁊ vide vtrũ luna veneri applicet uel
mercurio: veneris igit̃ mercurij orientales pluuias ſub anni principio:
occidentales ſub fine largit̃. luna eni lumine addens ⁊ cõpoto imbres
multiplicat vtrũq; vo decreſcens remiſſius. ¶ Itez in introitu ſolis ⁊c̃.
hoc in libello Cum multa ⁊c̃. ¶ Item cũ ſol ingredit̃ ſignum tropicum.
venus in ſigno aquatico ⁊ luna extra aquaticũ diſcurrente reſpecta eo
tempore modicas inſinuat imbres ſ; de aquatico reſpiciens eoꝝ por-
tendit redũdantiã. Item cũ ſol ingredit̃ ⁊c̃. hoc haomar ⁊c̃.
¶ Sole itidem in. 18. graduz ſcorpionis oberrante venus in aquaticis

vsq; ad submersionem pluuias generat. In signo humido mediocres.
In sicco modicas. ¶ Sole itidē ꝛc̃. hoc haomar ꝛc̃.

Capitulū. 12. De parte pluuiarū.

AMplius sub anni ꝯuersione ꝛ quartarū eiꝰ in princi pio
mensiū luminariū que cōiunctio duoꝝ luminariū. Pars
pluuie semꝑ est notandū: ea nāq; de die a luna adven erē
In nocte vō ecōuerso ē assūpta ꝛ a sole sumpto exordio
sub numeri terminatiōe ꝑfectio occurrit In loco igiť plu
uiarū reꝑta annuȝ iudicat pluuiosum. luna quoq; dū ad
martē ꝑueniet imbres die ipsa addiderūt ꝛ devenere nō aliud erit iudi
ciū. ¶ Amplius sub anni cōuersione ꝛc̃. hoc in libello Cū multa ꝛc̃.
¶ Venus itidem retrograda ꝛ sol in ariete uel tauro ver iudicat pluuio
sum. Item ipsa retrograda existens dum sol in capricorno uel aquario
cōmorať hyems illa erit paucorū imbriū. Hec oīa sub anni cōuersione
notanda occurrunt. Item ipsa retrograda dū sol capricornū aquariuȝ
uel pisces ꝑambulat oriētalis in vere facta imbres modicos iudicat sȝ
hyemis principiū multis humectat pluuijs. Naȝ si in hyeme orientalis
existat eius initia rores. Ultima vō pluribꝰ redūdabit imbribꝰ nisi stel-
la quelibet soli discurrat affinior. ¶ Venus itidē ꝛc̃. hoc in libello Cuȝ
multa ꝛc̃. ¶ Item estiuo tꝑe cum sol ingrediť terminū martis fit ī esta-
te estus. in hyeme vō paꝝcitas pluuiarū. ¶ Item estiuo tꝑe. hoc in flori
bus hermetis. ¶ Item sole in signis septētrionalibꝰ cū marte facit calo
rem maximū. In hyeme cū saturno frigus magnū. ¶ Itē sole in signis
ꝛc̃. hoc in libro Almansoris. ¶ Ad euidentiā ꝑdictoꝝ sciendū est quare
habeať dn̄s anni q̄re hoc. ¶ Itē queriť vtrū possumꝰ habere ascendens
ꝛ alios angulos hora introitꝰ solis in arietē uel aliud signū. q̄re hoc.
¶ Itē dubitať vtrū annꝰ ille incipiat ab introitu solis in librā qn̄ fit ob-
seruatio introitus solis in eodē signo. Et diciť ꝙ in principio anni erūt
multe uel pauce pluuie. ¶ Item dubitať vtrū primus gradus scorpio-
nis ꝛ vigesimus gradus eiusdeȝ magis debeant quoq; obseruari q̄ȝ alij
gradus zodiaci. ¶ Item quando saturnus fuerit in directo arietis aut
in eius triplicitate in principijs reuolutionū ꝛ ipse fuerit almuteȝ. dire-
cti cursus in angulo signat multas pluuias ꝛ paucum frigus. sed cū fue-
rit non in angulis ꝛ asp̱exerit ascendens ꝛ receperit dispositionem lune
ꝛ martē signat vehementiā frigoris bestias perimentis. Similiter autē
cū fuerit cadens ab angulis nec asp̱exerit ascendens ꝛ fuerit directus.
Si vō fuerit in geminis uel eius triplicitate ꝛ fuerit dn̄s anni in angulo
directus signat fortitudinē flatuū ventorū septētrionis ꝛ vehementiam

frigoris τ paucitatē pluuiarū. Et si fuerit retrogradus signat terremot⁹ specialiter si sit in angulo quarto. ꝙ si nō fuerit dn̄s anni τ fuerit in angulo q̄rto respiciens dispositionē dn̄i ascendentis multi hoīes morient̄ causa illorū terremotuū. Et si nō fuerit in angulo τ ascendēs τ directus signat multiplices flatus euri τ zephiri τ magnā frigiditatē hyemis cuꝫ terremotib⁹. Et si fuerit retrogradus signat infirmitates aduenientes hominib⁹ ex ventis τ humiditate etiā motuū terre. Et si fuerit directus nō aspiciens ascendēs signat flatū ventorū τ leuitatē eoꝝ τ vehementiam frigoris in terra signi in quo fuerit. Et si fuerit retrogradus signat flatuꝫ ventorū incessanter τ fortitudinē eorū. ¶ Et si mars fuerit in hac triplicitate dn̄s anni nō aspexerit ascendens. τ si directus signat destructionē vegetaliū causa valitudinis ventorū. ¶ Si vō saturn⁹ fuerit in cancro τ eius triplicitate dn̄s anni in angulo directus τ mars cadens ab eo siḡt vehementiā frigoris. Et si nō fuerit in angulo τ aspexerit ascendēs τ directus signat multas pluuias τ frigus. Et si fuerit retrogradus τ aspexerit se cum marte τ fuerit fortune ab eo cadentes augmentabūt frigus τ aquas. Item quando saturnus. hoc Albumazar.

Capitulū. 13. De ascendente signo in reuolutiōe anni q̄d significet.

Tem cū fuerit ascendens alicuius temporū reuolubiliū aries aut ꝑuenerit ad eū anni. ab aliquo predictorū locorū signat ꝙ in ciuitatibus in quib⁹ fuerit almuteꝫ flabūt venti orientales τ occidētales cū temperantia aeris q̄rte septentrionalis aut q̄rte extreme τ erit autumn⁹ ei sil'is in qualitate τ vehementia frigoris in hyeme τ augmentuꝫ fluminū τ siccitatis τ fames in armenia. ¶ Cum fuerit taurus ascendēs τc̄. sicut dicit̄ de ariete signat ibi flatū venti orientalis τ occidentalis cū vehementia frigoris quarte vernalis: τ bonā complexionē aeris quarte autūnalis τ erit quarta hyemalis calida: τ multiplicabūtur niues in medietate eius τ corroborabitur frigus τ fient pluuie pauce τ tonitrua τ fulgura cum casu grandinis cum extensionib⁹ mariū τc̄.

¶ Cum gemini fuerit ascendens τc̄. erunt venti calidi in quarta estiuali τ retentio aeris in quarta autumnali τ multe pluuie in hyemali. Itē signat multa tonitrua coruscatiōes τ ventos orietales precipue in parte meridionali. ¶ Cum fuerit cancer ascendens τc̄. cū frigiditate quarte vernalis τ mediocritate aeris quarte estiualis: τ multos flatus ventorū occidentaliū τ aqueductus frigus vehemens in quarta hyemali τ temperamentū quarte autnmnalis.

¶ Cum fuerit leo ascendēs τc̄. signat aerem tenebrosū horā post horā

cum mediocritate aeris q̃rte vernalis ⁊ declinabit ad frigus ⁊ erit vehe
mens calor in quarta estiuali ⁊ flabit ventus occidentalis in fine ei⁹ in-
cessanter ⁊ erunt multe pluuie ⁊ forte frigus in quarta hyemali ⁊ pauci
venti in fine eius. ¶ Cum fuerit virgo ascendens ⁊c̈. signat q̄ erit aer te
nebrosus in hora post horam in quarta vernali plurium pluuiarũ ⁊ in-
cessanť flatus ventorũ septentrionaliũ ⁊ vehementiũ ⁊ ꝓsperabitur aer
quarte estiualis ⁊ erit quarta autũnalis mediocris ⁊ principiuꝫ quarte
hyemalis mediocre ⁊ finis eius vehementis frigoris. Et flabunt cũ eo
venti septentrionales cũ augmento pluuiarũ. ¶ Cum fuerit libra ascen
dens ⁊c̈. obscurabiť aer in hora post horã ⁊ multiplicabiť flatus vento
rũ calidorũ vehemēť in quarta estiuali ⁊ equalitas erit quarte autum-
nalis ⁊ mediocritas quarte hyemalis. ¶ Cum fuerit scorpio ascendēs
⁊c̈. accident in aere tenebre in hora post horã ⁊ pluuie multiplicabunť
⁊ erit quarta vernalis calida ⁊ nubes erunt pauce in ea ⁊ pluuie ⁊ ven-
tus ⁊ frigus ⁊ erunt estas ⁊ autumnus: ⁊ corroborabiť frigus hyemis ⁊
flabũt in medietate eius venti occidentales ⁊ multiplicabunť in ea plu
uie ⁊ aqueductus magni. ¶ Cũ fuerit sagictarius ascendens ⁊c̈. erit q̃r-
ta vernalis multarũ pluuiarũ ⁊ ventorũ. autũnalis quarta temperato-
rũ ventorũ ⁊ quarta hyemalis frigida ⁊ humida. ¶ Cum fuerit capri-
cornus ascendens ⁊c̈. signat multas pluuias in quarta vernali ⁊ bonus
aer in quarta estiuali ⁊ flatus ventorũ orientaliuꝫ in eo cum caliditate
quarte autumnalis. ⁊ mediocris frigore in principio quarte hyemalis
⁊ constrictionē eius in fine eius. ¶ Cum fuerit aquarius ascendens ⁊c̈.
erit quarta vernalis mediocris in frigore cũ vehementia caloris in q̃r-
ta estiuali cum declinatione autũnalis ad caloreꝫ ⁊ multiplicabunť in
eo coruscatiões ⁊ tonitrua ⁊ pluuie ⁊ corroborabiť frig⁹ in quarta hye-
mali cum multis niuibus ⁊ flatu ventorũ orientaliũ. ¶ Cum fuerit pi-
scis ascendens ⁊c̈. signat multũ flatum ventorũ occidentaliũ ⁊ esse plu-
uiarũ in quarta vernali ⁊ vehementia caloris in quarta estiuali ⁊ me-
diocritatē aeris in quarta autũnali. ⁊ frigoris multitudinem in quarta
hyemali. ¶ Scias etiam q̄ si pars ascendētis fuerit in prima tertia ali-
cuius signi etiã in secunda uel in tertia uel fuerit directio in ea aliquod
almuteꝫ aut venerit ꝑfectio ad ipsam aut in ꝑte septentrionali uel meri
dionali iudicandũ est ꝭm naturaꝫ partiũ signorũ in prima tabula hui⁹
inuentorũ. vnde in hoc sequiť Albumazar Ptolemeũ. ¶ Itē cum fue-
rit ascendens ⁊c̈. hoc Albumazar in quarto tractatu de cõiunctionibus
magnis ⁊ hoc in. 12. differentijs extrahiť.

Capitulū decimūquintū.

Cum fuerit saturno significatio albibuze ⁊ sup ascendens alicuiꝰ inceptionis aut fuerit ei alcetabacia aut algebucia apud equidistantiā cursuū septeutrionis ⁊ meridiei. Si significatio eiꝰ fit sup elementū aereū signat vehemētiam frigoris ⁊ magnam congelationē: nubila vapores flumina tonitrua coruscatiões ⁊ decursum niuiū. In aq̄tico vehementiā frigoris in mari ⁊ augmentū supfluū eius. Significatio v̄o eius sm modū cōmixtionis ad signū arietis apud equidistantiā eius signat impetuositatē ventorū ⁊ fortasse accidet vehemens calor. ꝙ septētrionalis fuerit signat vehementiā caloris: meridionalis v̄o vehementiā frigoris ⁊ niuiū ⁊ multā roris. Sed retrogradus touitrua ⁊ coruscationes. Si fuerit equidistans signo tauri niues pluuias incessant ⁊ vehemens frigus septētrionalis temperamentuz aeris: meridionalis pauca temperantia. orientalis pluuias. sub radijs vehementiā frigoris in oriente ⁊ occidente pluuias ⁊ ventos. ¶ Si fuerit equidistans signo geminorū signat incessantē flatū ventorū validorū ⁊ multitudinē pluuiarū: septētrionalis terremotꝰ ⁊ ventos validos: meridionalis siccitatē ⁊ vehementiā caloris: occidentalis paucitatē pluuiaꝝ cū grossitie aeris sub radijs vehementiā frigoris valitudinē ventorū ⁊ multas aquas.

¶ Si fuerit equidistās signo cancri signat multū gelu pluuias ⁊ aquas meridionalis multas pluuias ⁊ oriētalis silr̄. ¶ Si fuerit equidistās signo leonis signat incessantē flatū ventoꝝ calidorū paucitatē pluuiaꝝ ⁊ vehementē siccitatē. meridionalis multitudinē pluuiarū. oriētalis augmentū fluminū ⁊ inundationē eoꝝ. retrogradus corruptionez aeris ⁊ ventos validos. sub radijs paucitatē pluuiaꝝ ⁊ validitatē ventorū.

¶ Cū fuerit equidistans signo virginis signat corruptionē aeris cū mediocritate pluuiaꝝ. septētrionalis bonitatē cōplexionis aeris ⁊ similr̄ meridionalis. orientalis multitudinē pluuiarū tonitruorū coruscationū ⁊ augmentū aquarū in fluminibꝰ. occidentalis paucitatē pluuiarū: ⁊ sub radijs paucitatē pluuiarū ⁊ si cū eo ibidē fuerit mercuriꝰ turbabit̄ aer cū valitudine. ¶ Cū fuerit equidistās signo libre signat incessantem flatū ventorū. septētrionalis hoc idē cū fortitudine eoꝝ. occidētalis siccitatē cuz vehementia frigoris: ꝙ si aspexerit iupiter aut luna potissime cū fuerit sub radijs turbabit̄ aer ꝓpter ventos ⁊ calorē. ¶ Et si fuerit eq̄distans signo scorpionis signat fortitudinez hyemis cū multitudine niuiū. septētrionalis vehementiā caloris. meridionalis multitudinē pluuiarū. retrogradꝰ siccitatē aeris ⁊ si fuerit iupiter ⁊ luna ꝓpinqui signat

corruscationes vehementiã frigoris & casũ niuiũ & inundantiã aquarũ. ¶ Si fuerit eqdistans signo sagictarij bonã cõplexionẽ aeris. septẽtrionalis flatũ ventorũ. orientalis bonã aeris cõplexionẽ. ¶ Si fuerit equidistans signo capricorni multitudinẽ pluuiarũ & terremotũ. septẽtrionalis multã niuẽ multitudinẽ gelu & humiditatũ. meridionalis hoc idem. sub radijs grandines & vehementiã pluuiarũ & valitudinẽ ventorũ. ¶ Si fuerit eqdistans signo aquarij: multitudinẽ pluuiarũ: incessantẽ motum ventorũ & terremotũ in illo ãno. meridionalis supfluitatẽ pluuiarũ & nubiũ multitudinẽ. retrograd⁹ niues cum vehemẽtia frigoris. ¶ Si fuerit eqdistans signo pisciũ vehementiã caloris & frigoris in suis tpib⁹. meridionalis multitudinẽ pluuiarũ & augmentũ fluminũ. septẽtrionalis multitudinẽ flat⁹ ventorũ. orientalis paucitatẽ pluuiarũ. sub radijs multitudinẽ aquarũ cũ frigore: qꝫ si mars cũ eo fuerit signat paucitatẽ pluuiarũ Cũ fuerit saturno significatio albibuꝫe &c̃. hoc Albumazar in cõiũctionibus magnis in prima differentia tractat⁹ qnti &c̃.

Sequit̃ tertia pars de iudicijs vl̃ibus mutationũ aeris p cõiunctiones & oppositiones luminariũ. Capitulũ primũ.

Um fuerit Venus in oriente uel i alio cardine hora cõiũctionis uel oppositiõis luminariũ certũ & forte iudicium pluuiarũ dur̃ etiã sub cõuentu & oppositiõe solem respiciẽs imbrẽ affirmat multiplicẽ. Uenus etiã sub radijs sub q̃libet respectu ptis cardinis multiplicat imbres grauissimos. nã quotiẽs luna eidẽ applicat pluuiã facit. & de sole in hunc modũ firmissimũ in aliq̃ ptis cardinũ ipsi⁹ siue ei⁹ oriẽte. dom⁹ quoqꝫ orientis in signo aquatico sub ducis cõuentu uel eidem applicãs. ¶ Cũ fuerit venus &c̃. hoc in libello q incipit Cũ multa &c̃.

Capitulũ secundũ.

Tem rectifica angulos hora cõiunctiõis uel oppositiõis luminariũ imediate pcedentis introitũ solis in eqnoctialib⁹ & solstitialib⁹ in illo climate in q̃ scire volueris: sicut fit in natiuitatib⁹. postea accipe gubernatores locorũ cõiunctionũ uel oppositionũ & angulorũ q hec loca sequũt. sicut fit in facto eclypsim. postea cõsidera rem generalez

ꝓuenientē a ꝓprietatibꝰ q̈rtaꝝ ⁊ á nā planetarū gubernantiū inſpiciēdo
cuiꝰ q̄litatis ſint. ſciēs augmentū ⁊ diminutionē accidentiū ꝓprioꝝ illiꝰ
q̈rti. Eodē mō fac in factis menſiū: inſpiciēdo tñ ad ꝯiūctiōes ſequētes
ſi q̈rtū illud fuerit ꝯiūctionale uł ad oppoſitionē ſi fuerit oppoſitionale
ꝯſiderādo ad angulos ⁊ planetas gubernātes ambo loca q̄ diximus.
¶ Poſtea ꝯſidera appitionē ſtellaꝝ fixaꝝ q̄ ſūt circa appitionē plane-
tarū aut elongationē vniꝰ. ſ. ab alio ⁊ i ſuis ꝓprietatibꝰ ⁊ in ſtatibꝰ: ⁊ q̊s
ventos mouēt hee ſtelle ⁊ ꝑtes ſignoꝝ in qbꝰ ſūt. ſilr̄ ꝯſidera a ꝑte cuius
venti ē latitudo lune ſi remouebit̄ a zodiaco ſignoꝝ: ita ꝙ ꝑ hec oīa poſ
ſumus ſcire qs magis vincit de ſuis ventis i ſtatu mēſis. ¶ Jtē rectifica
angulos ⁊c̄. hec ſnīa Ptolemei in. 9º caº 2ⁱ tractatꝰ 2ᶜ ꝑtis 2ⁱ q̄driꝑtiti. Di
cit haly ibidē exponēdo Ptolemeū. Sciamꝰ ꝑ̄mo accidens vl̄e. ſ. qd erit
qñ erit. poſtea inſpiciemꝰ in q̄ q̈rta āni: accipiēdo oꝑationē ab accidēte
ad res ꝓprias illiꝰ q̈rti. Poſtea rectificabimꝰ aſcendēs ⁊ angulos alios
ꝯiūctiōis ꝑ̄cedētis introitū ſolis i illud q̈rtū: ⁊ planetas ⁊ ſtellas fixas. ⁊
audiamꝰ qd totū ſignificet. Vbi grā Ponamꝰ ꝙ accidēs ꝓueniēs ex ſigni
ficatiōe vl̄i ⁊ gubernatore illiꝰ ſit frigiditas: ſi hoc fuerit i eſtate dicemꝰ
eſtas erit modici caloris: ⁊ ſic de alijs ſuo mō. ita ꝙ fortitudinē accidēti
⁊ q̄le erit ſciemꝰ a nā gubernatoris ſm ꝙ cōcordauerit cū q̄litate illiꝰ q̈r
ti. Eodē mō faciemꝰ in cōiūctionibꝰ q̄ caput menſiū dicunt̄: ſi q̈rtū fuerit
cōiūctionale: uel oppoſitiōibꝰ ſi q̈rtū fuerit oppoſitionale: ita ꝙ Ptole-
meus certū principiū tꝑis tenet: eſt a ꝯiūctiōe uel oppoſitiōe q̄ eſt circa
illū introitū ſolis in aliq̄ q̈rtoꝝ ꝑ̄dictorū: qꝛ virtꝰ gubernatoris remanet
⁊ durat donec durauerit illud q̈rtū. ¶ Ambo loca ⁊c̄. ſꝫ haly vna ē ꝯiū-
ctio uel oppoſitio q̄ eſt circa punctū illiꝰ q̈rti qđ ſol ingredit̄. Alia eſt cō
iunctio uel oppoſitio principij menſis in illo q̈rto. Jnſpiciemꝰ eni quis
dn̄abit̄ in vna ⁊ in alia: ⁊ vincit ille qui fuerit magis cōcors cū ꝓprietati
bus illius quarti: ⁊ cum vl̄i ſm ꝙ videbimus de poſſe illius virtutis uel
debilitatē. Nō eni ſemꝑ accidens vl̄e illius quarti vincit accidēs ꝑticu-
lare ſꝫ multotiēs eſt ecōtra. Sole aūt exiſtēte i leone accidit qn̄qꝫ maior
frigiditas q̄ꝫ eo exiſtēte i aquario. Cōſidera igit̄ gubernatores: nā ſi fue-
rint plures aut fortiores quantū ad ſuos ſtatꝰ eſſentiales: ⁊ accidētales
fuerint ꝯſil̄es: tūc nō dubites iudicare. ¶ Jtē ſm haly qñ ſciemꝰ de eo q
dn̄at̄ in q̈rto ⁊ de eo q dn̄at̄ in menſe qd accidit in illo q̈rto ⁊ i illo mēſe
illiꝰ q̈rti a ꝑtibꝰ ambabꝰ. Et de appitione ſtellaꝝ fixarū q̄ apparebūt cir-
ca: ⁊ de applicatiōe planetaꝝ vniꝰ cū alio: ⁊ elōgatiōe ſua ⁊ declinatiōe
ſuaꝝ latitudinū: ⁊ ꝓprietate ſignoꝝ ⁊ ſuarū partiū in quibus ſunt: ⁊ hec
omnia cōmiſcebunt̄ ad inuicē ⁊ ſciemus virtutē vincentē: iudicabimus

ſm hoc rem contingentē quolibet tpe ꝛ quolibet quarto ꝛ q̊libet menſe hic eni eſt loc⁹ q bene itelligenti ipſū ſufficit in hac arte. ¶ Immediate p̄cedentis ꝛc̄. Hec eſt opinio Ptolemei ꝛ pluriū alioꝝ. Uidi tn̄ quedā iudicia facta de ſtatu anni ꝛ menſiū a quibuſdā ſolēnib⁹ doctorib⁹ qui iudicabant ſtatū quarti ꝑ cōiunctionē uel oppoſitionē poſt introitū ſo‑lis in illud quartū videlicet qn̄ cōiunctio uel oppoſitio in die introitus uel in ſequēti die ꝛ hoc nō videt̄ mihi incōueniens ad pn̄s. ¶ In natiui‑tatibus ꝛc̄. Ptolemeus vult ꝙ rectificent̄ anguli ꝛ cetere dom⁹ preciſe ꝛ ſituent̄ in domib⁹ debitis planete ut videant̄ eoꝝ ſtatus eſſentiales ꝛ accidentales ſicut fit in iudicijs natiuitatū ꝛc̄. Et anguloꝝ qui hec loca ſequunt̄ ꝛc̄. Hoc exponit̄ dupliciter. Uno modo ꝙ ſufficit aſpicē ad hūc angulū qui ſequit̄ locū cōiunctiōis uel oppoſitiōis in ſitu ꝛ iſto mō nō facerem⁹ ſicut fit in eclypſib⁹ qꝛ prius accipiebam⁹ illum qui eſt an̄ ecly‑pſim ꝛ poſtea illū qui ſequit̄ ut patuit in tractatu p̄cedenti. Alio modo exponit̄ ꝙ illi anguli ſequunt̄ loca cōiunctionū uel oppoſitionū in vir‑tute ꝛ iſto modo deberes illū angulū accipere primo quē iudicares eſſe fortiorem. ꝛ ſic poſſemus etiam accipere angulū qui eſt ante cōiunctio‑nem uel oppoſitionē in ſitu ſicut fit i eclypſibus. ꝛ credo ꝙ hec eſt inten‑tio Ptolemei. Sed ad hoc aliquis poſſet dicere ꝙ bene itellexerit Pto‑lemeus de angulo qui ſequitur in virtute ſed mirabile eſſet ꝙ occidens ꝓferret̄ qn̄qꝫ medio celi ꝛ medium celi aſcendenti. nec etiā eſt ſimile qꝛ in eclypſibus iudicat̄ de his que apparent ſuꝑ terraꝫ. Sed cōiunctiōes ꝛ oppoſitiones de quibus trahit̄ hec doctrina qn̄qꝫ ſunt ſub terra: qn̄qꝫ vo ſupra terram: ideo rationabiliter aſcendens qꝛ eſſe fortius in virture q̄ꝫ alij anguli eſſet ſemꝑ ille angulus qui ſequit̄ i virtute locū cōiunctio‑nis uel oppoſitiōis ꝛ huic ſententie videt̄ adherere in expoſitiōe ſecūde ꝓpoſitiōis ſecūdi capl'i ut videbit̄ infra. ¶ Ad cōiunctionē ſequentē ꝛc̄. Hic patet ꝙ virtus vni⁹ cōiunctionis poteſt durare ad aliam cōiunctio‑nem ſi iudicia menſiū fiant ꝑ cōiunctionē ꝛ virtus oppoſitionis ſi fiant ꝑ oppoſitionē. Apparitionē ꝛc̄. Hoc intellige qn̄ incipiunt occultari ſub radijs uel qn̄ incipiunt exire de ſubradijs ꝛ melius apparebit inferius Elongationē ꝛc̄. ſm aliquē aſpectum ꝛ hoc eſt valde neceſſariū. ¶ Et de ꝓprietatib⁹ ꝛc̄. Hoc vtrū ſint calidi uel frigidi ꝛc̄. orientalis uel occiden‑talis directus uel retrograd⁹ ꝛ ſic de alijs. Quos ventos mouēt hee ſtel‑le ꝛ partes ſignoꝝ. hoc habet̄ ꝑ introductoriū p̄cedens zodiaco ꝛc̄. hic accipit zodiacum ꝓ eclyptica. Hec autē omnia magis patebūt inferius dn̄o concedente.

Capitulū tertiū Quō anni reuolutio ostendit auram.

ITē scias ascendēs ꝯiūctionis uel oppositiōis ⁊ locū eius-
dem q̄ fuerit i introitu solis in arietē ⁊ loca alioꝛū plane-
tarū. Unde si saturnū iueneris in aliq̊ anguloꝝ ab ascen
dente aut in aliq̊ anguloꝝ a dn̄o ascendētis firmū in eo-
dem loco in aliqua dignitatū suarū ⁊ maxime in angulo
medij celi signat diuersitatē in aere ⁊ dānū ⁊ tenebras in
tp̄e caloꝛis minuit caloꝛē: ⁊ in tp̄e frigoꝛis facit magnū frigus ⁊ si remo
tus fuerit ab angulis erunt tp̄a stabilia ⁊ equalia sicut esse debēt. tn̄ qn̄
saturnus fuerit in angulo a dn̄o ascendētis minoꝛ ⁊ debilioꝛ erit signi-
ficatio sua qᷓ qn̄ fuerit in angulo ab ascendēte. Et si mars fuerit in eodē
statu sicut diximus de saturno ⁊ maxime in medio celi augebit caloꝛ i
medio caloꝛis ⁊ minuet frigus in tp̄e frigoꝛis ⁊ ver ⁊ autumn⁹ declina-
bunt ad caloꝛē. Et si eodem modo quē dixim⁹ iupiter ⁊ venus aut luna
fuerint aptāt ⁊ temperāt aerē ⁊ faciunt nasci ⁊ crescere illud qꝺ seminat
⁊ plantat. Et aspice similiter mercuriū qꝛ si eū inueneris in medio celi
ab ascendēte cōiunctionis ⁊ fuerit in aliquo signoꝛū aereoꝝ ⁊ aliq̄ foꝛ-
tuna fuerit in aliquo anguloꝛū mercurij signat diuersitatē in aere ⁊ ven
tos multos ⁊ dānabiles ⁊ hoc modo iudicabis qn̄ inueneris aliquam
foꝛtunarū in angulo a mercurio aut mercuriū in angulo a foꝛtuna qꝛ i
hoc tantū valet quantū cū foꝛtuna fuerit in signo coniunctionis. Unde
qn̄cūq; inueneris planetā in angulis ab ascendēte cōiunctiōis aut i suc
cedentib⁹ pone eū ꝑ signatoꝛe. postea inspice cuiusmodi cōmixtiōis sit
sc; cū saturno ⁊ marte ⁊ si iueneris eū mixtū ꝺ q̄rto cū marte uel cōiun-
ctione uel oppositiōe ⁊ mars fuerit in aliq̊ signoꝛ igneoꝝ crescit caloꝛ
in tp̄e caloꝛis ⁊ minuet frigus in tp̄e frigoꝛis. Et si aspectus fuerit de 3°
uel sextili ⁊ mars in signis igneis signat id qꝺ dixim⁹ s; nō tantū. Et si si-
gnatoꝛ habuerit cōmixtionē cū saturno de q̄rto uel cōiūctiōe uel oppo
sitione ⁊ saturn⁹ fuerit in signis frigidis ⁊ siccis aut frigidis ⁊ humidis
crescit frigus tp̄e frigoꝛis. ⁊ minuit caloꝛ tp̄e caloꝛis. Et si aspect⁹ fuerit
de tertio uel sextili ⁊ saturn⁹ in signis ante dictis signat id qꝺ diximus s;
nō tantū. Et si saturn⁹ nō fuerit in signis frigidis ⁊ humidis s; fuerit i si-
gnis calidis ⁊ humidis que sūt gemini ⁊ ei⁹ triplicitas ⁊ habuerit cōmi-
xtionē cū signatoꝛe ꝺ q̄rto uel cōiūctiōe uel oppositiōe signat qꝛ aer erit
temperat⁹ de bona complexiōe ⁊ si hec mixtio fuerit de trino uel sextili
eo existēte in signis supꝛadictis est maioꝛ ⁊ maioꝛis tēperiei ⁊ cōplexio
nis melioꝛis. Siliter si mars habuerit cōmixtionē cum signatoꝛe ⁊ fue-
rit in signis siccis ⁊ frigidis aut frigidis ⁊ humidis ⁊ cōmixtio fuerit de

q̄rto cõiunctione uel oppositiõe tẽperat aerẽ ⁊ facit illũ bone cõplexio-
nis. Et si aspect⁹ fuerit de trino uel de sextili eo existẽte in signis ꝑdictis
tẽperantia erit maior ⁊ crescent oẽs res q̄ nascunt̄ ⁊ generant̄. ¶ Et ad-
iuua te in hoc a ꝑte aeris ventorũ ꝑticipẽ cũ significatore. Et si saturnũ aut
martẽ inueneris cum luna uel eius dño: iudicabis ab eis sicut ante dixi
mus ꝑ existentiã eoꝝ in angulis ⁊ aspectib⁹ significatoris. Hanc eni partez
accipies a gradu mercurij: si nõ fuerit in domo sua accipe suos met gra-
dus ⁊ minuta sua: addẽdo eis gradus signi ascendentis ⁊ ꝓijciendo ab
ascendẽte: ⁊ vbi applicuerit ibi est pars. Et idẽ facies in introitu in q̄rtis
que sũt aries cancer libra capricorn⁹. Sĩliter fac in introitibus solis in
quolibet. 12. signoꝝ principio. ¶ Itẽ scias ⁊c̃. hoc dicit haly abenragel
26°. ca° octaui libri. Idẽ haomar ⁊ Alkindus. 8°. ca°. q̄uis ꝑ alia verba.
Sciendũ est ꝙ esse in septima domo ascendẽtis ⁊c̃. quere hoc.

Capitulũ quartũ De pluuijs anni.

Item aspice prius q̄ sol intrat principiũ arietis cõiũctio-
nem luminariũ uel oppositionẽ eorũ que fuerit ante: ⁊ si
fuerit signũ ascendẽs de signis pluuie signat hoc suꝑ plu
uiã q̄ descẽdet in illa cõiunctiõe uel oppositiõe: ⁊ eo ma-
gis si locus oppositiõis uel coniũctionis fuerit i vno angu
loꝝ ascendẽtis in illo tꝑe sc̄m latitudinẽ regionis ad quã
luminaria equaueris: ꝙ si locus oppositiõis uel cõiũctiõis fuerit i vna
domorũ cadentiũ: iudica ꝙ nõ descendet pluuia in toto illo mense: nec
in maiori ꝑte illi⁹ anni. Si autẽ signũ ascendens fuerit de signis aqueis
⁊ dñs ipsius signi aspiciat lunã hec significatio completa suꝑ descensio
nẽ pluuie. Et si fuerit almutez in ascendente tunc erit magis. Si v̄o fue
rit almutez cũ luminarib⁹ tunc erit pluuia vsq̄ ad abundantiã. ¶ Qđ si
scire volueris diem in quo descendet pluuia tũc debes considerare diẽ
in quo luna ꝑueniet ad gradũ ascendentis: tunc eni descendet pluuia.
Et ego Abraham dico ꝙ verũ est si fuerit signũ ascendens vnus angu-
lorum signi illius terre uel si aspiciat ipsum quocũq̄ aspectu. nam si nõ
esset nõ consisterent qđ nubes ⁊ nõ descenderet pluuia ⁊c̃. ¶ Itẽ aspice
prius q̄ sol ⁊c̃. hoc in libello abrahe in. 2°. ca°. qui incipit Sciendũ ⁊c̃. q̄d
intelligat ꝑ signum terre sc̄m Iohannẽ de saxonia intellexit signũ quod
fuerat ascendens hora reuolutionis. Aliter etiã põt dici ꝙ signum ali-
cuius terre dicit̄ illud cũ quo maiorẽ habuerit concordantiã. ⁊ hoc ha-
bebat̄ prius a Ptolemeo ⁊ ab alijs in fine primi hui⁹. Item sciendũ ꝙ
inter signa aquatica iste enumerat aquariũ ⁊ leonẽ ⁊c̃. sed hoc est prius
dictum.

Capitulum quintū.

ITem inquire locū ⁊ horā cōiunctionis uel oppositiōis p̄ceden-
tis introitū solis in arietem ⁊ librā: preter hoc cōperiūt indi ho-
ram inroitus solis in. 20. gradum scorpionis. affirmant autem
ab illo tp̄e aquam in puteis augmentari. cōperies etiā quantū
distant singuli planete a capite arietis in hora cōiunctiōis uel oppo-
sitionis: ⁊ in qua mansione sint singuli planete semꝑ cōputando. 13. gra
dus ⁊ tertiā vniꝰp vnaquaqꝫ mansiōe a capite arietis inchoādo. Inqui
res tertio ad quē planetā luna aspectu habeat recedēs a minuto gradꝰ
in quo fuerit oppositio uel ꝯiūctio. ꝙ si aspexerit saturnū ⁊ vterqꝫ fuerit
in māsione humida ⁊ si nō sit ipeditꝰ saturnꝰ ab aspectu iouis. erūt nu-
bes nigre ⁊ pluuia lenta ⁊ durabilis. Et planete iseriores aspexerint sa-
turnū. s. venus ⁊ mercuriꝰ erit pluuia maior ⁊ durabilior: ⁊ hec est ꝯside
ratio ad cōperiendū pluuias āni. Siliter ꝯsiderabis ꝯiūctiōes opposi-
tiones ⁊ q̈drata in singulis mensibꝰ ad cōperiendū pluuias mēsiū ⁊ ad
ineniendū diē in q̊ pluuie incipiāt: ingre distantiā in q̊ fuit ꝯiunctio uel
oppositio uel q̈drata ad gradꝰ planete pluuialis. ⁊ si luna fuerit i signo
mobili: da cuilibet distātie graduū horā vnā: ⁊ in firmo cuilibet gradui
diē: ⁊ si in cōi in prima medietate singulis gradibꝰ dies singulos ⁊ i alia
cuilibet gradui horā vnā: ⁊ vbi terminabit̃ distributio: in die eodē ⁊ ho
ra erit pluuiarū initiū. ¶ Subtilissimi igit̃ indorū cōsiderāt tarditatē ⁊
velocitatē pluuie fm velocitatem ⁊ tarditatē cursus lune ⁊ fm augmē-
tum luminis sui ⁊ noticie: dicentes augmentū ⁊ velocitatē pluuie seq.
Si planete cui vim dat silis sit lune i accidentibꝰ p̄dictis interiacentibꝰ
lunā ⁊ planetaꝫ: totidē horas supputabis in velocitate ⁊ tarditate ⁊ in
minutione totidē dies ut veniat pluuia. ꝙ si cū p̄dictis mars aspexerit
saturnū maior fit tardatio donec luna ad locū saturni ꝑueniat uel op-
positionē uel quadratū. Et si saturnus fuerit in mansiōe sicca ⁊ luna ei
vim dat ⁊ neuter inferiorꝫ ipsum aspiciat ertt nubila absqꝫ pluuia. Et
si luna dat vim Ioui vtroqꝫ existente in humido ⁊ alter inferiorum io-
uem aspiciat ros erit ⁊ nebula tantū: ꝙ si ioue ⁊ luna sic positis ⁊ neu-
ter inferiorꝫ iouem aspiciat ⁊ ipse applicat ad saturnū uel aspiciat sa-
turnū pluuia erit. Et si luna ⁊ mars fuerint in mansionibꝰ humidis ⁊ al
teruter inferioꝝ martē aspiciat: sequēt̃ nubila terribilia tonitrua lam-
padū ⁊ grādo: ⁊ nō pluet nisi mars aspexerit iouē uel saturnū. ¶ Hic no
tandū ꝙ mars quolibet aspectu significatione imbriꝫ exauget lunā ⁊
stellā cū applicuerit: in generādis pluuijs oīno iuuat. Illa eni eidē ꝑp̄e
⁊ principalit̃ applicāte inest dilatio. Si vo alit̃ accidat nec signat ⁊ idē

corrūpit nubes quas Martialis ꝓducit natura croceū deſuꝑ ruborem nō ſine candore habentes. ¶ Itē lunaris cū ſole applicatio in manſiōe humida ⁊ ſol in locis vbi nec dignitatem nec poteſtatē habeat ſaturno ⁊ marti applicet̄ pluuiarū lapſus aſperrimos aquarū quoqꝫ inundationes portēdit: nubes etiā croceas ⁊ que cito diſſoluūt̄ generat ⁊ poſtmodū ſerenū aerē efficit. Si vo fuerit in ſicca ſine applicatiōe malorū nullam pluuiā ferme fore oſtendit. ¶ Notandū inſuꝑ ꝙ lune cū maliuolis applicatio in ipſa ebdomada pluuiā largit̄ beniuole illiꝰ quoqꝫ aſpectu infortunate rores ⁊ efficatiā diſſoluūt ⁊ ꝓhibent ⁊ horā future ſignationis ꝑuertunt cuiꝰ quoqꝫ hore certos ⁊ inuariabiles euentꝰ luna eidē maliuole cōiuncta ⁊ hoc iueſtita ꝑfectio reducit. Ampliꝰ luna eidē applicans ⁊ in eodē cōnexu ⁊ ſignis ⁊ humidis manſionibꝰ imbres denūciat futuros: nec hoc poterit fruſtrari ſi ſtelle ſuꝑiores infortunaꝫ ꝓprie reſpiciant mercurio acceſſantes ſiue nō. Si vo nec his ſuꝑioribꝰ applicet qꝛ ipſa tunc ſic fortunata imbriū ceſſat ſignatio. Venus tunc demū ſtelle ſuꝑiori dū eodeꝫ modo fuerit applicans imbres maximos ⁊ aſſiduos confert nec in venere dū ea ſic ſe habeant aliqua erit fallacia in forma exiſtente: nec lunaris certa eſt ꝑmiſſio dū in eodem nodo nec ſigno humido nec manſione humida cōmoret̄. Nā ſi luna eidē applicet ⁊ iſta ⁊ ſic ſe habeant nubes ⁊ rores ⁊ nebulas abſqꝫ imbribus inducit: quotiēs aūt ut p̄diximus ſic ſe habuerit luna poſt cōiunctionē ſaturno ⁊ marti accedat nimiā pluuiā inducit ingruentiā. Luna autē ioui ⁊ ſoli applicante dū tn̄ ſit inter vtrūqꝫ aliquis reſpectꝰ dico uel applicationis configuratio nec imbres. luna nāqꝫ tunc demū in loco optimo ſub aliquibꝰ ſextilibꝰ centroꝝ locis huic ſignificationi dicatis qꝛ fortunata efficit̄ caſſar ⁊ perimit ducatū dū iā fortunatis aliqua cōfiguratio rn̄derit. Hee igit̄ vniuerſe occaſiones aīo ſunt notande: nubes etiā que tunc generant̄ candide rores multos ⁊ inconſtantes celos p̄figurāt imbres ⁊ continuos. Veneris quoqꝫ adiectum teſtimoniū pluuiarū redūdantiam ꝑfecto inducit quotiens etiā mercurius aut cuꝫ ſtellis ſuꝑioribus aut alteri earū applicet̄ ꝓ pluuiarū redūdantia ⁊ aſſiduitate ſubmerſiones ⁊ etiā ruinas admouet timendas: q̄uis tn̄ nec mercurialis applicatio cum ſuperioribus ⁊ pluuie erunt. rurſus mercurius poſtq̄ veneri acceſſerit maliuolis applicans ſubmerſio ⁊ ruina imbriūqꝫ aſſiduatio timenda eſt. ¶ Mercurius itidem venerem de ſigno aquatico ⁊ manſione humida aſpiciens aut in eodē loco uel nexu locatus ⁊ pluuie termini excedunt. ꝙ ſi aſſit reſpectus dum aliter q̄ ſupra dictum eſt ſe habeant pluuiarū demonſtratur mediocritas.

¶ Mercurius rursum ꝛ ſi rores ut ſupradictũ eſt habeat iudicare ſi be-
niuolas in ſuis terminis aut dignitatibus reſpiciat eiuſdẽ generis effe-
ctus ꝛ earũ nature admixtus efficit mendacẽ eiuſdẽ ducatũ ꝑuer-
tit ꝛ educit effect⁹ alios cuiuſmodi eſt multiplex ventorũ rabies vndiqꝫ
aerẽ depellens erit ventorũ quantitas ſm ſtelle potentiã cuius genus ꝛ
ipſe aſſumit nec ſtelle ꝑagentes ſi eis lunaꝫ applicet mendacio polluũt
ſꝫ veritate gaudebunt ꝛ ꝓmiſſa oĩno exoluent niſi inquã eorũ ſtatus ꝛ
habitus ioui ꝛ ſoli ut ſupradictũ eſt aliquo configuratiõis genere ꝓprie
referant. Sic enĩ luna oĩno ꝓmiſſa tranſmutat earũqꝫ poſtq̃ꝫ luna eidẽ
acceſſerit cum ſaturno uel marte. Applicatio nunq̃ꝫ mendax efficit. vero
debiti ꝛ aſſidui ducatus augmentũ inducit ꝛ nebulas. ſi vero quidã plu-
uias ꝓdictas variare ꝓſumant nõ tamen nubes denſiſſimas ꝛ aeris hu
morem valebunt ꝑuertere verũ nebulas generabunt ꝛ vapores in aere
ſubleuabunt diuturnos ꝛc̃. ¶ Amplius luna in humida manſione ſoli-
uaga etiã ab omnib⁹ ſtellis cadens ꝛ ab eiſdem ſolitaria in centro aliquo
quo exiſtens ꝛ in ſui natura actione ſingularis nubes inducit ꝛ rores
multiplices aerem humectat imbre confert multimodas nebule ex qui
bus replet horizon ventos concitat diuerſos ex quibus tonitrua coru-
ſcationes ꝛ fulgura ꝓcreant. Si vero deinceps ſtelle applicet que ꝓdicte
ſtelle genus obtineat ſi inquã fortunata fuerit ꝓdicta diſſoluit: maliuo
la nanqꝫ exiſtens duplã quã cetere ſtelle ꝓpriam exhibent efficatiam.
Unde notandũ ꝙ ſoliuaga diſcurrit in ꝓdicta ſolutione fortiſſima iue
nit. Ex ꝓdicto quidem manifeſtum eſt qñ luna cum beniuolis aut eorũ
hoſpitio aut etiam cũ ſtellis que fortunatis applicant nullaten⁹ imbres
denunciat. cum maliuolis nanqꝫ econtrario diſcurrens pluuias gene-
rat vniuerſas. nanqꝫ lune cum ſingulis ſtellis ducatus: ut in aleſtma. i.
cõuentu exponens in his que neceſſaria videbant ad huiuſ cognitionẽ
habendã que ſupra ſcripta ſunt ordine congruo adinueni quõ in oppo
ſitione ꝛ tetragono agi debeat deinceps exponatur. ¶ Item inquire lo
cum ad horam cõiunctionis ꝛc̃. hoc totum habetur ex libro Iaphar.
Sciendum ꝙ vſqꝫ ad illã partẽ: Notandũ preterea. hoc ſumpſi in quo-
dam capitulo de pluuijs a Iaphar extracto: quia per clariora exprimit
verba. Reſiduũ etiam poterit poni in breuioribus verbis ꝛ clarioribus
ſi videat expedire ꝛc̃. Capitulũ ſextum de temperie aeris ꝑ annũ.

ITem volens ſcire naturã in ſingulis annis: cõſidera cõiunctio-
nem ſolis ꝛ lune uel oppoſitionẽ que eſt anteq̃ꝫ ſol intrat arietẽ
ꝛ conſidera ĩ quo ſigno ſit ſaturn⁹ ꝛ ſi ſit in ſigno igneo erit an-
nus calidus. In frigido talis ꝛ ſic de alijs. ꝛ miſceas cũ natura

ſigni cũ natura termini in quo eſt ſaturn⁹. Natura aũt cuiuſlibet termi-
ni eſt ut ſui dñi. miſceaſq; naturas planetarũ qui ſibi aſſociant̃ uel eum
aſpiciũt. ſic iudicabit̃ de ioue cuꝫ aſſociabit̃ luna ſoli uel opponit̃ anq̃
ſol intrat ſignorũ mobiliũ que caput circuli ſunt. ſic eſt iudiciuꝫ veneris
ꝛ mercurij in vnoquoq; menſe in tpe cõiunctionis uel oppoſitionis ſo-
lis ꝛ lune in vnaquaq; portarũ ꝛc̃. Quomodo autẽ fiat apertio portarũ
dicet̃ inferius dño concedente. Si mars cõſiderat iuncture ſolis ꝛ lune
dominiũ erũt lampades tonitrua ꝛ fulmina auge uel deme a nã martis
naturã ſigni uel termini in quo eſt. ꝙ ſi ſaturn⁹ aſpicit in loco martis ꝛ ẽ
in domo terre ſignat domorũ deſtructionẽ. Si in domo aque monſtrat
frigus nebulas ꝛ tenebras. ꝙ ſi planeta retrograd⁹ ibi fuerit ſignat plu-
uiam magnã. ¶ Itẽ volens ſcire ꝛc̃. hoc in prima pte quadriptiti. Hyſ-
palenſis ca.° volens ꝛc̃. Idem fere haomar in ca.° Ad pfectã ꝛc̃. Aliq̃
tñ dicit que ab hyſpalenſi nõ dicunt̃. quere hoc. Capitulũ ſeptimũ.

Tem radix i pluuijs ut aſpicias aſcẽdẽs ↄiũctiõis uel op
poſitionis q̃ fuerit ante introitũ ſolis in quodlibet ſignũ
ꝛ aſpice dñm aſcendentis ꝛ dñm loci cõiunctiõis uel op
poſitiõis ꝛ qñ iſti dñi fuerint in locis humidis ꝛ pluuio-
ſis ſignificat pluuiã ꝛ econtra. ꝛ qñ applicuerit ad plane
tas humidos ꝛ pluuioſos pluuiã ſignificat ꝛ econtra. Et
ſignator fuerit occidentalis aut retrogradus aut tardi motus ſil'iter ſi-
gnat pluuias. ꝛ qñ etiã fuerit cõbuſtuſ ſignat pluuias vbi mars ſepatim
qui qñ fuerit cõbuſtus minuet pluuias. Et ſcias ꝙ qñ fuerit aſcendens
ſignator in ſua latitudine uel in circulo angis ſue ſignat pluuias ꝛ econ
tra. Et ſcias qñ erũt pluuie ꝓpter ſignatorẽ in ſcorpione erunt pluuie in
dãno. ꝛ ſi fuerit ꝓpter ſaturnũ erũt ſubmerſiões. Et ꝓpter martẽ radios
ꝛ cõbuſtiones aeris ſignat. ¶ Itẽ radix in pluuijs ꝛc̃. hoc in octaua pte
libri haly abenragel ca.° 27.° verſus finẽ. Capitulũ octauũ.

Tem iudiciũ particulare de aeris mutatione in cõiunctione ſo
lis ꝛ lune: conſidera aſcendens ꝛ eius naturã: ꝛ de qua manſio-
ne lune ſit: ꝛ naturã domini ſigni in quo ipſe eſt ꝛ naturã plane
tarũ que ſunt in aſcendente uel cum dño eius uel i eius aſpectu
ꝛ qui ſũt cõiuncti lune uel pſpiciant: ꝛ in qua domo uel manſione ſit lu
na ꝛ que teſtimonia ꝑualuerint: talis erit lunatio ſi dom⁹ vſq; ad tẽpus
oppoſitiõis: ꝙ ſi fuerint eq̃lia teſtimonia erit indifferens ꝙ ſi futura ſit
pluuia circũpluet cõiuncta alicui planete pluuioſo uel aſpexerit uel in-
trauerit ſignũ pluuioſuꝫ ꝙ ſi nõ eſt pluuia ventura imutare poteſt aerẽ
coniũctio uel aſpectus planetarũ cum luna. Alteratur etiam aer ſi quis

planetarũ transeat a dextro in sinistrum uel econuerso: aut de velocita-
te in tarditatem uel ab auge ad oppositũ augis: aut a directione ad re-
trogradationẽ uel de oriente fiat occidentalis: uel hec oĩa ecõuerso: aut
intret aliquod signũ uel ingrediatur. nam his cõtingentib9 frequenter aer
clarus turbid9 efficit̃ ⁊ econtra: ⁊ sicut iudicam9 de cõiunctiõe ad opposi
tionẽ ꝑ ascẽdens ⁊ eius dñm. sic etiã iudicam9 ꝑ horã oppositionis vsq3
ad cõiunctionẽ. Et siliter in oppositiõe consideram9 gradũ supra terraz
existentẽ ꝙ si luna ẽ lumine alicuius pluuialis planete ꝑ cõiũctionẽ uel
aspectũ in hora cõiunctionis uel oppositiõis tot dieb9 finitis post horã
cõiunctionis uel oppositionis solis ⁊ lune incipiet pluere. ¶ Preterea
maximũ testimoniũ est si pars pluuie que sumit̃ a sole in saturnũ ut po-
stea patebit licet cõfirmauerit: aut ꝙ sit venus in scorpione capricorno
uel aquario lumine ꝓportionalis: aut ꝙ sint tres planete in aquario iũ-
cti. ¶ Itẽ duo testimonia humiditatis in estate minus valent q̃3 vnũ in
hyeme. Similiter in hyeme duo testimonia serenitatis minus valent q̃3
vnũ in estate. ¶ Item in vna terra pluit qñq3 ⁊ in alia nõ: ⁊ hoc põt esse
ꝓpter diuersitatẽ ascendentis ⁊ planetarũ ⁊ signatoꝝ terris determina-
tis ꝑdñantiũ. ¶ Itẽ iudiciũ ꝑticulare de aeris mutatiõe ⁊c̃. hoc inueni
in quadã extrauagante hyspalensis. Itẽ fere in fine prime ꝑtis addit tñ
quedã de signo illius terre. quere hoc ⁊c̃.

Capitulũ nonũ De apertione portarũ.

Item aptio portarũ dicit̃ cũ planeta inferior iũgit̃ supiori ⁊ fue
rint dom9 illorũ opposite sicut solis ⁊ lune cũ saturno uel eorũ
aspectus ad saturnũ: iouis eodẽ modo cũ mercurio. veneris cũ
marte. s3 ven9 signat humiditatẽ. mercuri9 ventos. saturn9 nubi-
la ⁊ frigus. mars ventos a dextro. iupiter temperieq3 ventos a sinistro
qđ in cancro magis signat. sic mars in capricorno. ¶ Mercuri9 itaq3 si
aspexerit dños aptionis portarũ uel fuerit cũ eis cõiunct9 in cõiunctiõe
solis ⁊ lune uel oppositiõe erit vent9 ⁊ pluuia: ꝙ si aptio portaruz fuerit
cũ marte sicut dictũ est de mercurio: erũt lampades tonitrua ⁊ fulmina
hic auge uel minue sicut prius. ¶ Scire autẽ debes ꝙ pluuia qñq3 ẽ in
ipsa oppositiõe uel cõiunctiõe solis ⁊ lune ⁊ si tunc fuerit aptio portarũ
qñq3 dilatat̃ cui9 rei causã ignorare nõ debes. Si itaq3 in apertiõe por-
tarũ cũ luna cõiungit̃ soli uel ei opponit̃ fuerit ipsa luna in angulo. 10.
⁊ fuerit in signo mobili: tũc in ipsa oppositiõe uel ↄiũctione erit pluuia
si autẽ fuerit in angulis alijs uel i lapsis uel post angulos tardabit plu-
uia ẜm ꝙ fuerit i mobili uel in fixo uel in cõi signo: ⁊ tũc expecta pluuiã
magnã cũ ꝑuenerit lũa ad oppositũ signi ascẽdẽtis i ↄiũctiõe ul' oppõe
⁊ durabit pluuia ẜm ꝙ luna ꝑueniet ad aspectũ planetarũ uel ad signa

pluuiã significantia. ¶ Item apertio portarũ dicit̃ cuꝫ ⁊c̃. hoc extrahit̃ a libro hyspalensis ⁊ a pluribus alijs. Addit ꝙ luna fuerit in signo alicuius ciuitatis quere hoc ⁊c̃.

Capitulũ decimũ de die ⁊ hora pluuie.

Item in quacũq; cõiunctione uel oppositiõe solis ⁊ lune cõiungat̃ luna aut dederit vim suã saturno. scito ꝙ ĩ illo mense descendet pluuia: poteris quoq; scire diem in qua descendet. cõputabis enĩ gradus equales que fuerint inter locũ cõiunctionis ⁊ locus aspectus ꝑcise completi seu ꝑfecti ⁊ qñ ꝑficiet̃ numerus illoruꝫ duorũ ſm quẽ dabis cuilibet gradui vnũ diem tunc pluuia. ⁊ magis testimoniũ clarũ si cõtingat ꝙ si luna illa die siue vna suarũ clauiũ que sint claues patet inferi⁹.
¶ Item semꝑ cõsiderare debes si fuerit planeta retrogradus in prima domo. hoc enĩ signat supra pluuiã. fortitudo nanq; planete qui ẽ in domo prima cõputat̃ ut fortitudo dñi domus. dñs quidẽ septime domus iouis ẽ mercurius qui ambo signãt suꝑ ventos: ⁊ tu debes inspicere in quolibet mense si dñs signi ascendentis est iupiter uel mercurius ⁊ aspiciat vn⁹ alterũ hoc significaret ventos multos qui se renouarẽt in mundo. ⁊ cũ hoc toto si essent in aliquo angulorũ ascendentis tũc significarent semꝑ supra pluuiã cum fulgure ⁊ coruscatiõe ⁊ magis si esset inter eos aspectus quartus aut inimicitie ꝙ si alter eorũ foret ĩ signo terreo tũc signaret suꝑ grandinẽ tempestuosũ ⁊c̃. Item in quacũq; cõiunctiõe ⁊c̃ hoc Abraham de seculo ⁊c̃.

Capitulũ vndecimũ.

Item ſm antiquos peritissimos astrologos quotiens luna a venere recedens marti applicet aut ecõuerso significationẽ pluuiarũ ꝑfecte reducit. A mercurio nanq; recedẽs ioui applicãs idem signat aut econuerso. Aut a saturno recedẽs soli applicans uel econtra idẽ signat ⁊ nõ aliud prestat iudiciũ. Sunt hec autẽ singula ꝓstellarum quasi manatoria que aptiones portarũ satis cõgrue nuncupant̃. Harũ itaq; stellarũ oppositio declinate. 3°. uel. 4°. ⁊ ad partẽ australẽ ⁊ altiorẽ facta deprehensam ꝓprijs emanat pluuijs. Si inquã inter. 19. gradum scorpiõis a. 19°. tauri cõmorent̃ gradus. Item ex ꝑte australi tũc demũ circa occurrit significatio quotiẽs a. 19°. tauri ad. 19. scorpiõis gradiũt̃. Et iterũ istarũ portarũ virtus optimiq; significatio ut qua die uel hora nubibus uel pluuijs aer incipit variari ꝑ singulas vrbes aut etiã vicos sub imbriũ guttarũ stillicidio oriens ⁊ locus lune sꝫ etiã cui luna applicet suꝑioribus videlicet aut inferioribus sũma diligentia ꝑquirat̃. non minus quoq; an ea lune applicatio de exagono fiat siue tetragono aut

oppositione ꝛ cõuentu aut etiam sit recepta. Adhuc etiã cui luna appli cet quinto gradu constiterit: Cita etiã sit uel tarda uel media in austrũ descendens aut in septẽtrione conscendat: quibus omnibꝰ certo ordine deprehensis luna stella qua die primo pluere incipit applicatio certum de imbribus p singulas ferias dabit iudiciũ: quousqꝫ videlicet ea stella ad aliud signũ transit: ea tñ aliud signum ingressa de pluuiaruꝫ iudicio tali uel tali die nullatenus p̄sumendũ erit donec qꝫ qñ luna eidem rursus applicet pfecto discernas. Si vo applicatio imbres demõstret alios iuxta ipsum modũ ꝛ numerũ de multitudine ꝛ paucitate referendũ erit etiã illius signi naturã humidũ videlicet fuerit aut siccũ aut mediũ. Jtidem quoqꝫ signũ stelle cum qua sit lunaris applicatio: nam etiã ea die qua imbres expectas lune cursum celeritas ul' tarditas eiusqꝫ in austrũ descensus aut in septẽtrione sublimatio notanda videt̃. Et de stella cui hec applicat in hunc modũ: nã ex stelle huius statu nõ minima imbriũ erit agnitio lune rursum atqꝫ stelle latitudo pariter notanda. vtraqꝫ eni australis ꝛ visioni existens affinior: ꝛ latitudo similiter eadeꝫ die largit̃ ingruentiaꝫ latitudine quidẽ diuersa si nec assit receptio nubes p̄tendit steriles aut parũ ponit fecundas. Ad hunc quoqꝫ modũ in qualibet regione uel vrbe aut termino si de lune applicatiõe uel receptione aut cõtra de eisdẽ necne in p̄dictis locis siti de natura etiã signorũ stelle cui ap plicat ea que diximus repiri contigerit nec aliqđ detur iudicium nisi inquantum stelle alteri velociori applicat aut in eius cõuentu sit: qꝛ igit̃ ꝛ hic ducatũ pmeruit iuxta eius potentie vires ꝛ debilitatẽ de iudicio erit referendũ ꝛc̃. Jtem ꝑm antiquos ꝛ peritissimos astrologos ꝛc̃. hoc etiã habet̃ in libello qui incipit Cum multa ꝛc̃. Capitulũ. 12.

Item considera ascendens cõiunctionis mensis arabum si ibi fuerit fortuna: fiducia erit de pluuia si infortuna nõ erit. Similiter de alijs angulis ascendentis ꝛ aspice qñ luna erit in opposito gradu ascendẽtis cõiunctionis ꝛ aspexerit eam aliquis planetarũ significantiũ pluuiã erit pluuia. Jtem considera ascendens ꝛc̃. hoc Alkindus in sexto capitulo. Capitulum. 13.

Item in principio mensis considerat̃ luna si fuerit in aliqua mansionũ pluuiosarũ applicatqꝫ ipsã planeta retrogradus ꝛ eo si fuerit ipsa in signo feminino: ꝛ hoc magis si fuerit aliquo signoꝝ aqueoꝝ tũc signat ipsa sup pluuiã ꝛ hoc est considerandũ potissime in principio mensis añ introitũ solis in arietẽ. Postea in quolibet aliarũ q̃r tarũ

anni q̃ꝛ tunc qualitates tempoꝛũ mutant̃. ¶ Item qñ ab eodem minu-
to vnuȝ luminare recedet ab alio: vide in qua mansione ⁊ singule stelle
fuerint dando cuilibet mansioni. 13. gradus ⁊ tertiã vnius incipiendo
a pꝛimo minuto arietis: ⁊ considera vtrũ sit in humida sicca uel media
scias etiã aspectus complexiones ⁊ applicationes planetarũ illa hoꝛa.
Similiter fac in ⁊ duab⁹ quadraturis vnde qñ luna erit in signo
humido ⁊ planeta aspiciat eã aut cõiunget̃ ei signat generationem plu-
uie p̃cipue si aspexerit aliqua infoꝛtuna. Si enĩ aspiciat infoꝛtuna aut
applicet̃ ei iens ad eam qñ luna ꝑueniet ad eam leuis quieta. Si autẽ
martẽ pluuiam signat cũ fulgure ⁊ tonitruo ⁊ grandine. cum mercurio
pluuiã cum vento foꝛti inter sese distillanteȝ. Et si fuerint luminaria in
eadem mansione signat multã pluuiã cum magnis guttis. ¶ Itẽ in pn̈-
cipio ⁊c̃. hoc Abꝛaham de seculo ⁊c̃. Item qñ ab eodẽ minuto ⁊c̃. hoc
Alkindus octauo capl'o. Capitulũ. 14.

Gradus iterũ cõuentus uel oppositionis ꝑ singulos men-
ses: cui etiam luna applicet donec ad solis redeat cõuen-
tum: aut saltem ab oppositione seꝑatur nullatenus obli-
uionis tollat incõmodũ. Nã cũ mercurio aut veneri ap-
plicet sub eodẽ cõuentu uel oppositione pluuias effũdit.
Si v̈o de signo. 10. de exagono videlicet aut trigono aut
oppositione luna videris applicantẽ stella cui cõuentũ uel oppositiõis
relictis ea applicet iuxta citũ cursum uel tarditatẽ descensum uel ascen-
sum nec minus quoq̧ ꝺm illius loci naturã ⁊ ꝺm lune ⁊ illius stelle lati-
tudinẽ ut suꝑius dictum est iudicij semita teneat̃. Si enĩ in eadeȝ parte
aut cardine discurrat ⁊ stella cũ qua lunaris fit applicatio sub terra mo-
retur de antedictis facit iudiciũ. Si eni stella oꝛiens nõ respiciat quãdo
quelibet figura euȝ respexerit imbꝛiũ sequit̃ renouatio. Ad hunc quoq̧
modũ lune in oꝛiente aut stellarũ ipsaꝝ negato respectu dum tñ ea plu-
uias designet absq̧ nubiũ obscuratione subiti imbꝛiũ aderũt discursus
De mansione quidẽ lune indoꝛũ animaduerte sententiã: i humida vi-
delicet aut sicca ut indoꝛũ fides est: luna i humida mansiõe stelle in hu-
mida mansione applicans pluuias ostendit: potissimũ quidẽ si in eodẽ
nodo constiterit in humida q̃ si in diuersis ⁊ humectantibus discurrãt
⁊ si nõ generales: pluuie tamen erũt: ea eni si locata stelle i mediocri lo-
cate ⁊ in vno nodo applicans paucis affluit imbꝛib⁹ quoꝛuȝ sunt initia
sũt fine ipsa foꝛtioꝛa erunt. luna eni in mediocri existente dum tñ eideȝ
stelle in humido ⁊ nodo vno existenti fiat applicatio ⁊ si exoꝛdio min⁹
in fine tñ multipliciter aderit redũdantia. poꝛꝛo si eũdem minime obti-
neant nodum imbꝛiũ mediocritas plerũq̧ etiã imbꝛes occurrent sȝ ste-

riles. ¶ Gradus iterũ cõuẽntus &c. hoc in libello q incipit Cũ multa &c.

Capitulum. 15.

Tem p singulos menses in cõiunctione uel oppositione solis & lune oriens est firmandũ stellarũ quoq lunarem necnõ cũ ceteris applicationib⁹ accentus pscrutari neces se est. Ea igit̃ veneri uel mercurio applicante & hinc plu uiosius erit ad maiorẽ. Deinceps ad hui⁹ rei euidentiã no tandũ qñ luna cardines ingrediẽs veneri & mercurio ap plicat ipsa ducit die pluuias nisi forte in principio illius cũ marte facta fuerit applicatio. q si aliqñ accidisse ppendas fulgura exauget atq to nitrua tñ paucos denunciat imbres nisi rursum in oppositiõe cõstiterit q si luna a sole recedens fortunatis applicet in prima mensis parte plu uias effundit nõ modicas: Nõ aliter quoq circa oppositionẽ oriẽte fir mato luna fortunatis applicans: cũ ab oppositiõe recesserit alterã men sis partẽ copiosis replebit imbrib⁹. In cõuentu uel oppositione cũ ve nere & saturno signũ aquaticũ obtinenti applicatio & hec duo loca im bribus multis redũdabũt nisi forte in signo igneo cõmoret̃. martis rur sum cu saturno applicatio nubes imbres & ventos multiplicat nubes detrahit & aera corrumpit: mercuri⁹ iterũ hora cõuentus & oppositiõis veneri applicans pluuiarũ inundatione gaudebit. Item p singulos &c hoc in libro haomar ca⁹ Capitulũ. 16.

De pnosticatione ventorũ p stellas fixas & planetarũ aspectus.

Tem ventorũ cognitio & pluuiarũ experiẽtia sicut imbriũ ex cõuentu uel oppositione & duob⁹ tetragonis oĩno de pendet quare est: stellas quoq ventos designant mercu riũ videlicet martẽ & solẽ attendere res hortat̃. Cũ enim mars vẽtos exaugeat saturn⁹ phibet & maxime retrogra dus & in signo terreo discurrens: nõ minus quoq aquati ca & sicca contradicunt. mercurius enĩ stella est ventorũ & pariter aerea signa. Ut igit̃ veniẽtes puideas ventos mercuriũ attendere oportebit. luna enĩ postq̃ a cõuentu recedit eidẽ applicãs & cũ eo & sub eodẽ cõne xu in cõtraria mansione discurrẽs ventorũ nũciat discursus. rursũ mer curio cũ saturno applicante aut eodẽ cũ ipso in eodẽ nodo & mansione discurrẽs nec ille retrograd⁹ obscuros efficit & aerẽ variat etiã sepe i aere ventorũ timẽda nascit̃ rabies. ¶ Unde notandũ q saturn⁹ retro gradus etiã si mercuri⁹ eidem applicet ventis penit⁹ cõtradicit. mercu rio marti applicante aut in eius cõuentu aut eodem nodo & mansione que ventos iudicat venti calidi procedunt & in aere feruor generatur:

nubes quoqꝫ horizonta possident plerūqꝫ ignes ab ethere dilabunt̄ uel in eodem apparent uel ventorū calor alterat̄ marte potissimū retrogrado. Marte quoqꝫ in signo cōmorante ꝛ minor inest ventorū significatio: verū pluuias multas ex modico ventorū largit̄. nā idem mercurius ioui applicans aut veneri aut in mansione ventos significante ꝛ in eodem nodo cōstiterit ventos reducit. Jupiter autē maiorē in ventis assumit efficaciā: eius eni est omniū ventorū ꝓpitiatio ꝛ leuitas. mercurius itidē soli configurat⁹ aut eūdē nodū ꝛ mansionē que ventos signat obtinens ventos ferientes generat ꝛ pessimos. Subtilissime autē acquisitionis est mercurij ꝛ lune cū ceteris stellis cōmunitas siue admixtio ꝙ si fiat nihil deposito efficit. Jtē ventorū cognitio ꝛ pluuiarū ꝛc̄. hoc reperit̄ in libello Japharis vltimo caplo. Ad euidentiā predictorū ꝛc̄.

Sequit̄ quarta pars libri de iudicijs ꝑticularibus que non solum fiunt ꝑ coniūctiones uel oppositiones luminariū: sꝫ etiā ꝑ alias figuras particulares. Capitulū primū.

Um luna fuerit i centro a sole et fuerit apertio portarū ꝛ fuerit applicatio uel aspectus uel luminū trāslatio seu receptio uł collectio luminū inter dn̄m ascendentis cōiunctionis uel oppositionis: uel inter ascendens cōiunctionis uel oppositiōis solis ꝛ lune p̄cedētis ꝛ dn̄m suū septime iudica ꝙ in illo mense erunt pluuie tempore pluuiarum aut ventus ꝛ sic de alijs qd̄ autē affirmat significationē lune est ꝙ fuerit venus uel mercurius occidentales uel retrogradi uel tardi motus: uel ꝙ sit vnus planeta aut duo ex altioribus retrogradi uel tardi qꝛ tunc erit pluuia sine aliquo dubio. ¶ Jtem cū fuerit apertio portarū luna existente in aliquo centrorū p̄dictorū sequent̄ venti uel pluuie calor uel frigus ꝯm naturā dn̄oꝝ apertionis portarū ꝛ ꝯm naturā tp̄is. Jtem si tunc īueneris lunā in signo humido applicante planete humido licet ibi nō sit apertio portarū tn̄ poteris habere fiduciā de pluuia. ¶ Cū luna fuerit ꝛc̄. hoc extrahit̄ ex. 29⁰. ca⁰. octaue ꝑtis libri haly abenragel ꝛ ex dictis haomar in ca⁰. Quotienscūqꝫ itaqꝫ ꝛc̄. qd sit esse in centro require

supra in septimo prime ptis. Item cuz apertio rc. hoc in. 28° ca° octaue ptis Haly abenragel. r in haomar caplo Tepestiua itaq3 imbriu rc. de hac materia etia habes in caplo Ad pfecta. in eode libro specialiter ab ab illa pte No minus qnoq3. 12. equantis rc. vsq3 ad illa parte Ascéden te anni rc.

Capitulu secundu.

Item qn fuerit qrta signans de humiditate a retrogradatione planetaru r temporu suor inspicia coiunctione luminariu igit nisi fuerit applicatio cu retrogrado in coiunctione sua signu est serenitatis r in oppositioe sua similit In qrta aute hyemali si luna fuerit in coiunctione a centro a sole r a planetis retrogradis e suma rei r significatio eor fortior qn erut r retrogradi r applicati cu sole. Si igit cotingit q inter sole r luna r omnes planetas retrogrados sint iste ptes cu ascesionib9 climatu erit pluuia in sumo fm q affirmat vis qrte r natura temporis r planetaru significantiu r lune: r si descendens fuerit de vno uel de duobus minuit significatio fm proportione sue virtutis: r si no fuerit significatio ab altero istoru centroruz no erit quicq3 nisi venus humid9 humida aura in vere frigida: in hyeme fortior istaru significationu est q luna sit in longitudine ppinquiori minues in lumine suo. Ite si luna iugat planete retrogrado aut si in cetro ab eo r a sole r sic addens lumine signu est pluuie fm q affirmat tepus planetis. Sz qn erit coniuncta sicut dictu est r sit minuens lumine minuet id. Ite si planete sint retrogradi in secunda qrta circuli in hyeme vere aut autuno erit significatio fortior. Sz si tunc retrogradant in tertia qrta signu est magis diminutu: q2 ventus meridionalis multiplicabit illic. Sz qn erit retrogradatio in pte septetrionali erit pluuia cu ventis septetrionalibus. Qn vo fuerit directi in estate r luna in lumine suo minues r cotumabit erit signum grandinis fulguris r radior. Si fuerint etia directi in pte septetrionali aut retrogradi in pte meridionali erit signu fulgur r grandinis. ¶ Ite qn erit in prima qrta signi erit signu humiditatis a retrogradatioe planetaru r luna addens lumie inspiciem9 in ea sicut in qrta hyemali r centris lune positis. Et qn fuerint retrogradi cu sole in vna quarta erut fortiora in quarta secuda circuli aut i capite cancri aut in meridie qn multiplicabit ventus meridionalis humidus. Qn erit sol in secuda qrta circuli r fuerit in signo humiditatis inspice cetra que posui r planetas retrogrados r addetes in lumine suo fortificabunt. verutn si fuerit cu sole in vna quarta erit caliditas fortis valde coburens. Et si fuerint retrogradi in pma qrta silit. sz si fuerint i inclinatioe meridionali erit aura

mitis ⁊ qñ applicabit̃ luna cum illis planetis retrogradis in centris no
minatis mouebit̃ ⁊ aera ad qualitates nubis grandinis ⁊ fulguris ⁊ cũ
fuerint illic directi debilitat̃ significatio. Qñ erit sol in q̈rta 3ª circuli ⁊
erũt planete retrogradi in illa pte illud est signũ humiditatis ⁊ hore plu
uie qñ manserit luna in centris dictis a sole: ⁊ cũ stat significatio ꝙ sint
planete retrogradi pars eoꝝ pti terre ⁊ applicet̃ ps eoꝝ pti terre 3º. 7º. uel
q̈rto aut in p̄dictis centris: ⁊ erũt planete retrogradi in septẽtrionali pte
erit siguificatio fortior qñ cõiunget̃ eis luna ⁊ erit sol in centris dictis ⁊
ibi erũt planete addentes lumine: tũc si fuerint planete directi in pte me
ridionali ⁊ retrogradant̃ in pte septẽtrionali ⁊ applicabit̃ cũ eo planeta
⁊ luna est minuẽs lumine suo signũ erit pluuie ⁊ niuis tũc q̃ directi age
bant tũc ptes septẽtrionales ⁊ cũ fuerit luna in cẽtro a planetis retrogra
dis si soluerint donec luna fuerit in centris tũc distillabit cõgelatio: sꝫ si
fuerit luna addẽs lumine suo soluet tũc illud. Itẽ qñ fuerit q̈rta ⁊c̃. hoc
extrahit̃ ab alkindo in. 4º. caº. ⁊ tres ꝓpositiões sequẽtes. Capitulũ. 3.

Tem si vis scire vim ⁊ debilitatẽ multitudinẽ ⁊ paucitatẽ
pluuiarũ cõsidera naturã tpis ⁊ vim suã ac debilitatẽ ẜm
ꝙ dixi de gradibus nature tempis ⁊ ciuitatis. sed si fuerit
nã tpis tui in sũmo frigida ⁊ humida tũc significatio for-
tior planetarũ ostendet significationẽ fortiorẽ pluuiarũ:
⁊ si natura tpis tui fuerit frigida ⁊ humida in equalitate
tũc mediocrice ⁊ ẜꝫ ꝓportionẽ viriũ significatiõis aque sig̃bit. Et cũ hoc
si vis aspice naturã martis ⁊ veneris: ⁊ si fuerint frigidi humidi aut cali
di ⁊ inter eos sit applicatio ex opposito aut ex obliquo p̄dictoꝝ ⁊ latitu
do eorũ ⁊ erũt cõtinui cum sole aut vnº eorũ. Deinde considera applica
tionẽ lune cũ sole ⁊ centrorũ p̄noiatorũ ⁊ concordantiã. Si fuerit natu
ra lune similis nature eorũ illud est signũ aque. Sꝫ si vis sua est debilis
⁊ cõcordauerit illis duobus hec figura: ⁊ nõ erũt retrogradi: ⁊ erit illud
tẽpus estiuale aut vernale erit adhuc aqua multũ fortis ⁊ cũ hoc toni-
truũ fulgur ventº ⁊ grando multa: ⁊ erit multitudo aut paucitas ẜm ꝓpĩ
q̈tatẽ vapoꝝ terre ⁊ erit frigiditas venti ⁊ caliditas ẜm ꝙ cõcordauerit
latitudo lune ⁊ mansio sua a sole ⁊ ps ⁊ natura tpis. Si v̉o significatio
p̄dicta fuerit i hyeme aut autũno nec fuerint retrogradi erit aqua debi-
lis distillãs durante tpe siccitatis. Si v̉o fuerint retrogradi in tpe veris
⁊ estatis ⁊ cũ fuerit in inclinatione meridionali in vere erit in sũmo qͦd
dictũ est ⁊ in estate minus ꝑ multitudine caliditatis in aere aut ꝑ modo
appropinq̈tiõis terre sue aut q̃ erũt in fũdo eccentricoꝝ suoꝝ. Sꝫ si fue
rint retrogradi in hyeme in declinatione septẽtrionali erit minus qͦd di

co:si in declinatione meridionali erit plus si calidiores sint retrogradi ⁊ in fundo eccētricorū suorū⁊ fuerit tūc applicatio cuū sole ab opposito ⁊ duorū planetarū siliter si hec sint in vere erit finis rei. In hyeme v° ⁊ autūno minuet̄ parū. Si v° in cōiunctione planetarū fuerit ⁊ duo planete cōtinui vnus alij ab vno cētrorū⁊ natura lune silis illi ⁊ erit in vere ⁊ hyeme illud ē signū pluuiarū ⁊ fuerit in estate ⁊ vere illud ē signū tonitruoꝝ multorū cuꝫ aqua. Si igit̄ fuerint duo planete cōiuncti in centro aut cōcordauerit illis luna in natura illud est signū pluuie sicut dico: sꝫ centro ⁊ hore qn̄ figurat̄ illud tempus si luna fuerit adiuuans nā̄ sua si fuerit alius planeta a venere ⁊ marte in silitudine nature illorū augmē tabit̄ res ita ꝙ fiet quasi diluuiuꝫ. Si v° fuerint oēs planete figurantes ꝑs eorū partē in centris p̄dictis ⁊ sint retrogradi in hyeme ⁊ autūno ⁊ i inclinatiōe meridionali erit de roribꝰ ⁊ pluuijs ꝙ interficiet populos ⁊ ciuitates ⁊ clima p̄ter pauca. Sꝫ si fuerint in vere ⁊ estate retrogradi ⁊ i inclinatione meridionali erit siliter nisi ꝙ nō cōicabit res cum oibus ⁊ erūt cū hoc fulgura ⁊ tonitrua ⁊ grando fortis. Cū autē fuerint retrogradi in quarta estiuali ⁊ tempus estiuale nō erit significatio suꝑ aquā erit siccitas sūma in climatibꝰ septentrionalibꝰ ⁊ calor fortis q interficit populos p̄cipue q erūt ꝓpe equationē diei. Qn̄ autē erit significatio pluuialis duorū planetarū ⁊ fuerit significatio cōsūmens de tribꝰ rebꝰ non erit quicq̄. Cū fuerit significatio pluuialis de duobꝰ planetis aut tribus uel q̄ttuor i estate erit sūme mitis aura illiꝰ estatis ⁊ ꝑue caliditatis: nec erit aqua multa nisi fuerit significatio de quīqꝫ planetis. ¶ Itē si vis ⁊c̄. hoc ex. 5° ca° Alkindi. ¶ Hic possunt notari quedā q̄ ab alkindo dicunt̄ in istis capitulis vltra practicā p̄dictā. quere hoc ⁊c̄.

Capitulū quartū.

Item aspice hora coniunctionis aut p̄uentionis ⁊ q̄rta ⁊ prima ⁊ secūda ad lunā cū quo applicat̄ illa hora si cum venere ⁊ mercurio significa generationeꝫ pluuie in illa septimana ⁊ hora illiꝰ erit s̄m quantitatē graduū qui sūt inter lunā ⁊ planetas duos quibus applicatur ⁊ ponā scꝫ gradū ꝓ die ⁊ minutū ꝓ hora: ⁊ qn̄ luna consequit̄ gradū illius planete cui applicatur ⁊ venus in scorpione aut i capricorno aut in aquario erunt pluuie multe. similiter mercurius stat in aliquo illorū triū significat pluuiā. Et quando fuerit venus ⁊ mercurius in p̄dictis signis ⁊ luna opposita aut cōiuncta illis in quarta sui significat pluuiam ¶ Item aspice ⁊c̄. hoc Alkindus in. 6° ca° versus capituli finem.

Capitulum quintũ.

ITem nõ solum oportet considerare cõiunctionẽ uel op-
positionẽ luminariũ ad sciendũ fortitudinẽ uel mansue-
tudinẽ accedentiũ: ſ3 iudicanduȝ est etiam qñ luna fuerit
dimidiata in luce ⁊ erit principiũ signate mutationis ut
plurimũ ꝑ tres dies anteq̃ luna sit cum sole: ⁊ post etiam
ꝑ tres dies ita ꝙ sit in elongatione partiũ equaliũ. Simi-
liter sciemus hoc a ꝑticipatione quã habebunt cum planetis ⁊ q̃libet
horũ statuũ ⁊ aliorũ sicut est in sextili ⁊ trino aspectu ⁊ poterimus scire
mutationes sequẽdo concordantiã naturales planetarũ quas accipiũt
⁊ signorũ cũ aere nos circũdante ac ventorũ: ⁊ virtus horũ statuũ ꝑticu-
lariũ qui erũt die q̃libet erũt ꝓprie a stellis fixis que sũt luminis ⁊ ope-
rationis maioris cum apparuerint vespere siue mane ex parte orientis
uel occidentis respectu solis q2 reducũt ut plurimũ status ꝑticulares in
naturas earũ. Similiter erit nõ minꝰ ꝙ aliq̃d luminariũ transit ꝑ angu-
los ita ꝙ mansuetudo ⁊ fortitudo que erit in statibus cuiuslibet tempo-
ris accidunt qñ transibũt luminaria ꝑ hec loca sicut recentia ⁊ minutio
sunt ꝑ transitũ ꝑ hec loca ⁊ mutatio: statuũ ventoꝝ erit ꝓprie qñ transi-
bunt luminaria ꝑ hos angulos ⁊ mutatio sua erit vento qui erit a par-
te vbi erit latitudo lune. Et qñ ꝑticularia accidentia erũt similia vniuer-
salibus opus fortificabit̃ ⁊ certificabit̃. Item nõ solum ⁊c̃. hoc a Ptole-
meo. 12°. ca°. secũde ꝑtis. ¶ Sciendũ ſm haly ibidẽ ꝙ ꝑ oppositionẽ scie-
mus quid accidat in secũda medietate mensis si mẽsis fuerit cõiunctio-
nalis uel ꝑ cõiunctionẽ si fuerit oppositionalis. Et ꝑ quartã lunationis
sciemus id q̃d accidit in illa quarta iudicãdo sicut ꝑ cõiunctioneȝ ⁊ op-
positionẽ ⁊ ꝑ compationẽ ꝑticularis ꝙ vniuersali i sciemꝰ illud q̃d acci-
det in illa q̃rta. ¶ Itẽ sup̱ verbo illo signate mutationis ⁊c̃. exponit sic.
Luna currit ꝑ vnũ duobꝰ diebꝰ cc mpletl ⁊ vna ꝑte tertij ⁊ ex hoc posuit
Ptolemeus cõpletũ diẽ ꝓpter breuitatẽ. Et q2 virtus corꝑis lune est añ
uel post ꝑ. 12. gradus ꝓpter hoc fiunt tres dies. hoc eni dictũ exponitur
duobꝰ modis. Primo mõ ꝙ luna transit in. 6. diebꝰ duo signa cõpleta
⁊ transeũdo duo signa ꝑuenit ad tot numeros graduũ quot sũt in firma-
mento sextili ⁊ sic ibi oportet ꝙ applicet ad punctũ dñi significationis
in tribꝰ ante ⁊ in tribus post ⁊ hora qua ꝑuenit ad ipsũ mouet̃ significa-
tio illa. Secũdo modo intelligit̃ ꝙ virtus lune voluit̃ cũ virtute solis tri-
bus diebus ante suã applicationẽ ⁊ sic etiam remanet iuxta vsq3 ad tres
dies post suã applicationem q2 corpus solis habet. 15. gradus añ ⁊. 15.
gradus post. ⁊ corpꝰ lune. 12. ante ⁊. 12. post. Modus autẽ primus ma

gis cõcordat cũ opinioue Ptolemei nihilominꝰ vterqꝫ habet rationem
⁊c̃. ¶ Notandũ ꝙ sicut in morbis acutis q̃rta ut plurimũ est nũciatiua
septime ⁊ sic ꝑ tres dies añ apparet signũ salutis uel timoris ita suo mo
do añ ↄiunctionẽ uel oppositionẽ solis ⁊ lune potuit apparẽ principiũ
signate mutatiõis in aere. Quere igit̃ causã huiꝰ si placet in diebꝰ creti-
corũ. ¶ Sciendũ iterũ ꝙ qñ luna distat a sole. 45. gradibꝰ añ uel post di
cit̃ in centro a sole ⁊ ꝓpter ꝓpinquitatẽ cõiunctiõis ul' oppositiõis si aer
mutet̃ tũc sicut cõsueuit fieri potissime cũ luna ẽ in centro a sole ꝭm Al-
kindũ ⁊ plures alios magis ad sil'itudinẽ signationis uel oppositionis
mutabit̃ q̃ꝫ ad similitudinẽ signatiõis alteriꝰ figure: hoc aũt fit tribꝰ die
bus cõpletis añ cõiunctionẽ ⁊ tribꝰ diebus post. vnde signator cõiũctio
nis modicũ variauit locũ suũ in zodiaco in tanto tp̃e ⁊ iõ illũ locũ uel
stellã fixã quã aspicit: uel fuerit in centro ab eo qñ distat luna ab eo per
45. gradus. s. a sole. ¶ Sciendũ ꝭm haly vbi supra ꝙ in qualibet appli-
catione lune cum sole debes formare angulos ⁊ inspicere sicut prius in
cõiunctionibꝰ ⁊ oppositionibꝰ. ¶ Itẽ ꝭm haly ibidẽ stelle lucentes sunt
ille que sũt prime magnitudinis ⁊ postea secũde magnitudinis ⁊ sic de
aliis: ita ꝙ virtus earũ crescit cũ mane apparuerint exeũdo radios solis
aut intrãdo sub radiis solis ⁊ sic virtutes solis ⁊ lnne q̃uis sint victrices
tendũt tamen ad virtutes earũ ⁊ postq̃ꝫ ita est cũ stellis fixis magis de-
bet hoc iuenire in planetis. ꝑ cõmixtionẽ igit̃ virtutũ earũ poterimꝰ sci-
re accidentia ꝑticularia cuiuslibet diei. ¶ Itẽ haly exposuit sil'iter Non
minus ⁊c̃. vult dicere ꝙ qñ aliqđ luminariũ transibit ꝑ aliquẽ angulo-
rũ qui fuerit in applicatione sua prima signabit ꝑ additionẽ uel dimi-
nutionẽ accidentis applicatiõis ⁊ additio erit significatio sui transitus
fuerit ipsa met significatio radicis uel minutio si significatiões sunt di-
uerse. Et postq̃ꝫ ita est ꝙ applicuerit gubernatori aliqđ luminarium uel
ipsi gradui significatiõis faciet idẽ vnde gradꝰ significatiõis luminariũ
qđ fuerit supra terrã in illa applicatiõe post modicũ gradus solis ẽ gra
dus significatiõis. Sil'iter ꝭm fortitudinẽ ãguli erit fortitudo rei ⁊ man
suetudo: qñ ascendẽs ⁊. 10ᵘˢ fortiores sũt aliis: ⁊ etiã hoc pꝫ i crescentia
maris ⁊ nili. Unde qñ luna transit ꝑ aliquẽ gradũ sig̃tionis fit in crescẽ
tia additio. Vbi gratia: qñ luna transit ꝑ illud signũ qđ fuit ascendẽs in
cõiunctiõe uel oppositione añ introitũ solis in cancrũ uel aliud signũ ⁊
applicat gubernatori uel transiuerit ꝑ locũ ↄiũctionis uel oppositionis
sig̃t augmentũ nili nisi alia maior sig̃tio hoc distur bet. Item venti mo
uent̃ de vna ꝑte ad aliã hora qua transit aliqđ luminariũ ꝑ aliquẽ an-
gulũ ex angulis ascendẽtis sig̃tionis ꝭm ꝑtẽ ad quam declinat latitudo
lune ⁊c̃.

Capitulū sextum.

ITem si ille qui dn̄at in cōiunctione uel oppositiōe fuerit hume
ctans z cōmiscebit cū stellis fixis humectantib⁹ z locus cōiun
ctionis uel oppositionis q̄ p̄cessit in loco humido aut luna uel
sol in tali loco. hec res si vna. s. applicuerit alteri aspectu aliquo
signat ꝙ erit illa dies humida z multe pluuie. Et si saturnus rebus istis
applicueri t erit pluuia fortis z damnosa cū lubrigat̄. Et si iupiter erit tē
peries z tempus saporosum z omnes alias applicatiōes intelliges hoc
modo. ¶ Itē quottidianos imbres lunaris p singula ꝑgressio manife
stare poterit ipsi⁹ g̊ in cardines ingressus eiusq3 cū venere z mercurio ac
reliquorū cum ipsa stellarū dū alestina transit aut oppositori applica
tio cognitionē nō effugiat signa nāq3 aquosa ingrediens z supradictis
stellis applicās ipsa die pluuias signat z generat. ¶ Ad cui⁹ rei maiorē
euidenttā signa aquosa scire necesse humide: z sūt venus z mercuri⁹ na
ture z luna expressius tanq3 mercuri⁹ z venus z luna amicant̄ imbrib⁹.
venus itaq3 horis qōlibet signorū obtinens aut lune itidē applicās im
bres signat venus itidē cū mercurio in signis aquaticis z luna similiter
s3 in fine signi alteri eoꝝ applicans z multos ꝓfitent̄ imbres pauciores
tn̄ q̄3 in principio. luna itidē cum vener z absq3 mercurio in signis aqua
ticis itidē nō aliud q̄3 luna cū mercurio ibidē venere remota. Amplius
luna i huiusmōi quolibet veneri z mercurio applicās dū pluuiarū obti
neant signa. pluuiaꝝ notāt ꝯstantiā q̊usq3 luna ab eis recesserit. ¶ Ve
nus iterū mercuri⁹ z luna maliuolis applicantes nec eisdē cōiuncte die
ipsa pluuiā inducit. applicātes autē eidē aut cōiuncte negant: ven⁹ cum
sole locata dū vtriq3 mercurio z lune iungat̄ eadē die nubib⁹ redūdant.
Mercuri⁹ autē z ven⁹ capricornū applicās z luna in tauro aut i piscib⁹
idē. Irē p̄dictarū altera in capricorno z luna in tauro aut in virgine ve
neri z mercurio de oppositiōe applicās ad ipsu3 p̄cipue dū luna i tauro
cū cauda moret̄ z a saturno recedat: ac venus cū ipso marte in aquario
z mercurio in piscib⁹ aut capricorno ea nāq3 die imbrib⁹ ether onorat̄.
¶ Itē si ille zc. haly in fine glose. 11° ca° secūde ꝑtis q̈driptiti Ptolemei
Itē quottidianos zc. haomar in penultio ca° zc. Capiiulū septimū.

ITem cū sol est in hemisperio australi z ven⁹ sub radijs ei⁹ eide3
luna applicāte ipse die z hora p̄tendit imbres futuros: nō min⁹
quoq3 mercurio adusto si luna eidē applicat aut eidē opposita i
scorpione moret̄. hoc etiā idē martis z veneris sub scorpiōe ven
tos iudicabit. Itē cū sol est zc. Ista ꝓpositio cū consequentib⁹ habet̄ in
libro Cū multa zc.

Capitulum octauũ.

ITem sole in aquario existente luna eidẽ applicante aut in eiꝰ oppositione locata ⁊ venꝰ ibi cõmoreť in ipsa hora pluet. Itẽ quoq; solis ad venerẽ aut veneris ad solẽ applicatio luna in eoꝝ oppositiõe aut tetragono discurrẽs cũ venus cõbusta fuerit certũ de pluuijs fiet iudiciũ: qꝫ si cõuenerit ⁊ mercuriꝰ pariter cũ illis discurrat imbres cõtinuos eadẽ die reportet. lunaris etiã: vnde licꝫ i eis aspectꝰ nec imbres subierũt. Itẽ cũ sol in libra ⁊ venus in sagictario luna eis comitate ipa die pluuias inducũt ⁊c̃. Itẽ sol in aquario luna in leone eadẽ die minꝰ imbriũ erit discursus: Itẽ mars sol respiciẽs ⁊ luna dũ venus ⁊ mercurius hãc aut illũ comitanť imbres pñtes ⁊ grossas insinuũt guttas. Sic quoq; in domo veneris aut martis ariete videlicet aut scorpione stille grandes tonitrua ⁊ coruscationes generanť. Itẽ sol rursũ in piscibꝰ uel ariete discurrens luna in virgine aut libra uel sagictario cõmorante in vaporosis vtriq; locis ipsa die imbriũ tulit effluentiã. Ampliꝰ autẽ mercurij in eodẽ loco cũ sole in domo veneris discurrẽs ⁊ etiã luna imbriũ stillas grauissimas lampades ⁊ tonitrua ꝑtendit. Itẽ in leone virgo pisces ⁊ etiã ariete libra scorpius luna in solis oppositione aut cũ venere discurrẽs stillas nõ sine lampadibꝰ tonitruo ⁊ fulgure mittit. Itidẽ etiã luna in leone lãpades tonitrua ⁊ fulgura generanť: pari qꝫ mõ in regionibꝰ eqnoctialibꝰ linee subiectis in secũdo climate tertio uel q̃rto horũ inerit mediocritas i. 5º ⁊ in. 6º remissiꝰ. mars quidẽ retrogradꝰ si eũ aspexerit sol: fulgura quidẽ virentia cadũt. Item luna in hospitio martis. s. scorpiõe. Mars autẽ in suo dñio posito discurrẽs sol in aq̃rio uel i piscibꝰ situs die ipsa pluuiaꝝ notãt redũdãtiã. Sole quidẽ in piscibꝰ ⁊ luna ⁊ marte i respectu fulgura erũt ⁊ tonitrua ⁊ pluuiarũ redũdãtia ⁊ fulgurũ lapsꝰ. Itidẽ etiã sol i ariete ⁊ scorpiõe luna in leõe ⁊ sagictario aut i solis cõuentu. Itẽ sol in capricorno luna tauro aut virgine piscibus aut scorpiõe vẽtos generat frigidissimos nõ minꝰ eodẽ in capricorno ⁊ potissimũ in aquario existẽte dũ saturnꝰ in oppositiõe eorũ discurrat ⁊ alterũ luna aspexerit. Itẽ sole ⁊c̃. hoc ibi supra.

Capitulũ nonũ.

ITem si luna sit in centro a sole iudicandũ est sicut prius i oppositione uel cõiunctiõe. luna itaq; in mansionibꝰ eq̃lis cõplexionis ac siccis discurrens aut si deinceps stellis inferioribꝰ q̃ loco sunt rationis aut in signis aquaticis superioribus applicet pluuiarum in maxima parte est indicium. Signa autem aquatica sunt cancer leo scorpius ⁊ aquarius. Stella autem que rores portendunt sunt luna venus ⁊ mercurius. Si igitur lunam de huiusmodi signis

respiciāt aut cū ipsa morent̃ luna etiā de locis humidis eisdez applicet imbres innuit timendos: ea eni de locis siccis ꝛ equalibꝰ applicans uel respiciens mediocres oīno pluuias iuducit. luna itidē in singulari ꝛ ꝓpria natura nebulas ꝛ imbres etiā raras affert candidas ꝛc̃. Item cū luna ꝛc̃. hoc extrahit̃ a Japhar in ꝑagrapho Est itaqꝫ tetragonus. ꝛ forte hoc alibi ut credo satis habet̃. q̄re hoc. ¶ Uult tñ ibi ꝙ a ꝑmo ingressu solis in librā ꝛ ꝑ totū annū ꝛ in exordio anni ꝛ ꝯiūctionibꝰ ꝛ oppositionibus solis ꝛ lune ꝛ in centris lune fiat sicut docuit in cōiunctione ī illa ꝓpositione Inquires ꝛc̃. ad euidentiā ꝑdictorū.

¶ Sequit̃ quinta pars libri de iudicijs mutationū aeris ꝑ cōiūctiōes ꝛ aspectus lune cū alijs stellis. Et aliarū stellarū ad inuicē ꝛ de pñtia lune ꝛ aliorū a sole in certis locis zodiaci.

Um ad aliquē terminū certū dispositiōes aeris volueris ꝑnosticare: scias primo loca omniū plauetarū ad eūdem terminū: ꝛ ille planeta qui plures fortitudines uel testimonia habuerit ī suis signis erit dispositor tpis ſm sui naturā. Considera tñ fortitudinē aut debilitatē quā habuerit dispositor a cōiunctiōe uel aspectibꝰ suorū similiū aut suoꝝ contrarioꝝ: ꝛ ex loco suo in eccentrico ꝛ epicyclo ꝛ ex nā cōi temporis ꝛ ex hoc iudica qualitates aeris. Sic igit̃ poteris ꝑcognoscere qñ erit calor ꝑexcellens qñ plures planete calidi habuerint plura testimonia ꝛ cū hoc se asperexerint de tertio aspectu. Cognosces etiā frigus ꝑexcellens ꝑ testimonia frigidorū planetarū. Poteris etiā ꝑcognoscere humiditatē ꝑexcellentē ꝑ planetas humidos abundantes testibꝰ ꝛ potissime cū se asperexerint de tertio ꝛ in signis aquosis. Cū ad aliquem ꝛc̃. hoc extrahit̃ a quodā libello q̄ incipit Ad ꝓnosticandū diuersā aeris dispositionē ꝛc̃. ¶ Sciendū ꝙ iste auctor sic ꝓtendit. Primo ponit signorum qualitates sicut prius patuit ꝑ tabulā. Postea ponit nās planetarū nec oīno sicut alij dicūt: dicit: saturnꝰ est sūme frigidus ꝛ ex ꝯsequēti siccus. Jupiter ē temperate calidꝰ ꝛ humidus plus tñ abundat in eo caliditas q̄ꝫ humiditas. Mars superflue calidus ꝛ siccus plus tamen calidus q̄ꝫ siccus. Sol temperatissime calidus ꝛ siccus: ꝛ ut verius dicam: inter qualitates summe equalis. Uenus temperate calidus ꝛ superflue hu-

humidus.mercurius autē inclinat̃ ꝑ naturam suā ad eum planetaꝫ cui
cōplectit̃ ex planetis ⁊ signis: dicit̃ tñ in se frigidus ⁊ siccus. luna v̓o in
natura sua dicit̃ temperate frigida ⁊ summe humida. Unde dicit̃ fons
humiditatis sicut sol est fons caloris q̄uis sol sit temperatissime calid᷒.
¶ Postea dicit ꝙ planeta in domo sua habet quinqꝫ fortitudines ⁊ di-
gnitates seu testimonia.⁊ in exaltatione quattuor.in triplicitate tres.in
termino duas.in facie vnā. ¶ Postea ostendit que sit domus exaltatio
⁊c̃.sicut prius ⁊c̃.patuit ꝑ tabulā vbi ꝙ ponit leonem ꝓ domo solis:can
crū ꝓ domo lune. librā veneris.arietē martis. sagictariū iouis.⁊ capri-
cornū saturni.q̄ꝛ ut dicit ibi fuerunt creati in origine mūdi. Postea di
cit ꝙ quinqꝫ planete habent accidētales potestates in quinqꝫ signis re
siduis ut saturn᷒ in aquario.iupiter in piscibus. mars in scorpiōe.ven᷒
in tauro.mercurius in geminis vnde dicunt̃ eoꝝ accidentalia domici
lia.Sciendū tñ ꝙ nos vtimur hic.s.ꝙ planete in istis domicilijs tot for
titudines habent sicut in alijs ⁊c̃. Postea dicit ꝙ planete fortunant̃ qñ
aspiciūt seinuicē aspectu amicabili uel debilitant̃ si aspiciunt se aspectu
inimicitie. ⁊ hec amicitia uel inimicitia fit ꝓpter contrarietatē uel simi-
litudinē signoꝝ in qualitatib᷒ primis sicut patuit prius. Ponit etiam ⁊
aspectus sicut pirus. Postea dicit ꝙ cōiunctionē dicunt astrologi aspe-
ctum fortissimū.nos autē inuenimus multotiens oppositū.s.aspectus q
primus dicebant̃ esse fortiores ⁊c̃. Postea dicit ꝙ alie sūt fortitudines
uel debilitates planetarū quas accipiunt ex diuerso esse in suo epicyclo
scꝫ ortus ⁊ occasus ꝓgressio statio ⁊ retrogradatio: ⁊ sicut patebit infe
rius. Fortior est qñ est in ortu uel ꝓgressiuus q̄ꝫ occidentalis uel statio-
narius uel retrogradus. Postea dicit ꝙ omis planeta in sup̲iori p̲te sui
deferentis fortiorē habet in istis inferiorib᷒ op̲ationeꝫ q̄ꝫ in inferiori ⁊
hoc est ꝓpter eius motum velociorē s̃m reuolutionē diurnā. veloci᷒ mo
uet̃:ipse ꝓbat ꝑ hoc ꝙ paralellus equoctiali a planeta descriptus eo ex
istente in auge deferentis maior ⁊ plus distat a suo centro q̄ꝫ ille qui est
descriptus eo existente in opposito augis ⁊ sic cū magis spacium p̲tran
seat in equali t̲p̲e velocius mouet̃ s̃m reuolutionē diurnam. Cum g̊ s̃m
p̄hos ⁊ astrologos s̃m motus sup̲iorū mouent̃ ista inferiora. ⁊ hoc etiā
notabiliter patet ꝙ sol ascendit augē crescent̃ vegetabilia:qñ autē rece-
dit fit econuerso.hoc etiā patet potissime in effectib᷒ lune:q̄ꝛ in qualibet
oppositione ⁊ cōiunctione solis ⁊ lune fluxus est maximus: ⁊ hoc est q̄ꝛ
tunc est in auge deferentis. qñ autē est in quadraturis ad solē tunc flu-
xus minus ⁊ hoc q̄ꝛ tunc est in opposito augis. Et nota ꝙ oriente luna
cōgregant̃ vndiqꝫ aque ⁊ tumulant̃ ⁊ eleuant̃ quasi versus suā causaꝫ ⁊

originē: ꝛ cessat talis eleuatio donec venerit ad mediū celi ꝛ cu3 ibi fue
rit minuit̄ tumor ille ꝛ fluunt aque ad locum oppositū ꝛ generat̄ tumor
consimilis ꝛ hec est causa quare sunt duo fluxus in die naturali ꝛ sic ca
cumen aque mouet̄ sicut luna ab oriente in occidēs ꝛ se tenet semꝑ ver
sus lunā. ¶ Infortunant̄ etiam planete cū fuerint ꝓpinquiores zenith
capitis ꝛ debilitant̄ cum fuerint remotiores. Postea ponit tabulam ro
tundā ad cognoscendum fortitudinē planetarū ꝛ totum patuit ꝑ tabu-
las prius positas in introductorio. Postea ponit practicam ꝫ nō oīno
nec ita explicite sicut positum est: qđ tñ supius in textu dictū est extrahe-
re aut ab alijs que explicite dicunt̄ aut ab illis que ꝑ suu3 ꝓcessum ꝛ per
sua exempla dant̄ intelligi. ¶ Postea exemplificat ꝛ hoc ꝑ teipsum pos
ses facere: poterunt etiā adduci exempla ad tempus nostrū. ¶ Nota ꝙ
sicut ad cognoscendū quando erit aer aquosus cōsideranda sunt signa
aquosa ita intelligendū de calidis suo modo ꝛ sic de omnibus qualita-
tibus ꝛc̄. ¶ Dubitatur vtrū planete veloci⁹ moueant̄ motu diurno eis
existentibus in auge q̄ȝ in augis opposito. videt̄ ꝙ nō: quia qñ velocius
mouent̄ ꝓprio motu tardius mouent̄ motu diurno cu3 isti duo motus
sint ad oppositas partes igit̄ ꝛc̄. Item dubitat̄ vtrū plus influant in ista
inferiora cum sint in auge: ꝛ videt̄ ꝙ nō: qꝛ cum ꝑ lumen operent̄ ꝛ corpa
eoꝝ minora videant̄: minus vident̄ influere. Item exemplū de sole nō
videt̄ ad ꝓpositum: qꝛ ego dico ꝙ crescentia herbaꝝ ꝛc̄. nō fit ꝓpter prō
pinquationē solis ad augē ꝫ quia sol est magis ꝓpe zenith capitis.
¶ Item videt̄ male dicere ꝙ aque fluūt ad locum oppositū lune ꝛ gene
rat̄ ibi tumor quia cū luna sit quasi mater humiditatis videt̄ ꝙ in par-
te opposita nō debeat esse tumor aque imo tm̄ versus lunā. Ad primū
quere residuū. Capitulū secundūū.

Item cū volueris scire temporis varietatē: scito signa diuersorū
planetarū vtrū sint calida uel frigida: ꝙ si fuerint calida signāt
calorem in estate ꝛ temperamentū in hyeme. Si in signis frigi-
dis signant frigiditatē in hyeme ꝛ temperamentū aeris in esta-
te. Similiter cu3 cōiuncti fuerint in aquaticis signāt supfluas in hyeme
pluuias ꝛ temperamentū uel multitudinē roris in estate. ¶ Item cum
fuerint planete ponderosi quibus debet copulari aspectus solis in dire
cto alicuius ciuitatis. s. in signis septētrionalibus signāt siccitatē ꝛ terre
sterilitatē. Cu3 vo elongati fuerint. s. cū fuerint in meridionalib⁹ signat
multitudinem pluuiarū. ¶ Item ponderosi omnes orientales signant
multitudinē pluuiarū in hyeme ꝛ nimiā siccitatē in estate si occidenta-
les fuerint. Stella rursū in qualibet domo eiusdē nature discurrēs ꝛ re-
cepta dū recipiens bonū obtineat locum debitus oīno sequit̄ effectus.

optima quidē ⁊ maior de efficacia certitudo si in ipsiꝰ natura cōstiterit. Ad hec etiā luna cū ioue ⁊ venere ac mercurio ex vna pte applicans imbres generat estiuātes. In austro quidē magis imbribꝰ opportunū reuere potissimū ⁊ ioue receptis ⁊ luna gradū solarē in cōuentu euaserit. Saturnꝰ eni in signis humidis pluuijs minime ɔtradicit. ⁊ hoc modo ī lune applicatione exequendū erit. si vō in eadē pte ɔiūgant dū inferior sub supiori moret cuiusmodi sūt mercuriꝰ iupiter ⁊ venus ⁊ mars. luna etiā ⁊ saturnꝰ quotiēs igit ambo cuiuslibet inferiori applicet postq̄ inferior a supiori sese euaserit rores estuare necesse est. ¶ Itē cū volueris scire ⁊c̄. hoc habet in. 6°. ca°. messahalach: qualit debeā planetis ponderosis copulare solē. q̄re. Stella rursū ⁊c̄. hoc habet i libello q incipit Cū multa. ⁊ q̄ satis obscure loquit querat expositio. Capitulū tertiū.

Item testimoniū est ut cū mane videat quantū est a sole in saturnū ⁊ tantū a loco lune cōputet ꝙ si cōputatio finiat in domo martis uel solis serenitatē notant: saturni nubila: lune veneris pluuiā. mercurij ⁊ iouis ventos: mansio etiā notanda ē in qua finiat cōputatio si sit humida uel sicca ſm quā iudica. Itē si hāc partē mercuriꝰ aspiciat aut potius cū ea esse cōtigerit eadē die ventos ꝓcreari necesse est: fortiores quidē luna eā comitante p̄cipue si venꝰ eidem cōsors extiterit. Itē considera introitū lune i primo pūcto cuiuslibet signi ⁊ qui eā de proprio fouebit aspectu ducatꝰ officiū ꝓ huiꝰ rerū indagatione merito vendicabit. Itē magnū testimoniū ⁊c̄. hoc in quodā extrauagāti ca° q incipit Volens aūt scire. Idē Abraham auenezre. Idē in libro haomar in fine capl'i 2ⁱ q̄uis ibi dicat ꝙ ab haomar fuit p̄termissa hec pars: ipse tū nō posuit ꝙ si cōputatio finiat vsq ibi. Itē si mercuriꝰ hanc ptē aspiciat ⁊ p̄cedentes hoc vltimū nō ponūt. Sed si oīa hec cōcurrūt fortius efficiet iudiciū. Itē considera. hoc haomar in fine capituli secūdi. Capitulū quartū De hora pluuie.

Item luna intrās cancrū hora solis virginē hora veneris. librā hora iouis. sagictariū hora ꝓpria. taurū hora martis. geminos hora mercurij. si gt ſm naturā dñi ⁊ signi in quo tpe est. Itē cū luna intrat aquariū uel scorpionē uel capricornū hora saturni signat q̄ hora erit mutatio aeris. Qñ aūt ps. i. gradꝰ triū planetaꝝ q̄ veneris. s. ⁊ mercurij ⁊ lune erit in aliq̊ signoꝝ aque ⁊ diriget: in illo abūdabit pluuia adeo ꝙ nocebit pplo. Itē luna intrās ⁊c̄. hyspalensis idē nisi ꝙ ipse dicit signat pluuiā ad modū signi in q̊ dies signi uel hore est Alkindus etiam ibidem nisi ꝙ ipse addit leonem hora iouis aut etiam libram significat pluuiam ⁊ ventū ſm naturā signi ⁊ ꝙ erit de substanta istorum signorū erit. Similit idē haomar nisi ꝙ ipse dicit sagictariū

hora mercurij et ibi dicebatur geminos hora mercurij. dicit etiam geminos leonem aut libram hora iouis subintrans vbique imbres ventos atque fulgura signare creditur: Ea etiam rursum scorpij signum hora saturni ingressa ventos nunciat frigidos. nam ipsius in aquarium uel pisces ingressus aera perturbat et peruertit. Item cum luna intrat aquarium etc. Alkindus igitur sciendum quod ps hec accipitur pro gradu etc.

Capitulum quintum De signo oriente et asuph.

Item hora transitus stelle de signo in signum: oriens certissimum dinoscatur: vnde si fuerit signum aquaticum designat pluuias: melius quidem signum huius luna possidente pluuiarum administrat ducatum cuiuscumque luna applicabit stella. quotiens enim luna eam cui applicat stellam sequitur inundationes pluuiarum innuit. Uenus rursum atque mercurius quotiens vterque alter signum aquaticum possidet et luna eis adiuncta imbres adauget nisi forte in maliuolo aspectu uel coniunctione commoretur. Item saturno transeunte de vno signo in aliud fiunt dyachintes quos arabes vocant assub: uel quedam alia signa de natura ignis. Item venus intrans cancrum pluuiam facit. Item hora transitus etc. hoc haomar versus finem illius capituli Quottidianos etc. Item saturno transeunte etc. hoc in floribus hermetis. potest hic notari scilicet tempus generationis cometarum etc. quere de hoc. Item venus intrans etc. hoc Albumasar et plures alij etc.

Capitulum sextum.

Item luna in signo feminino si aspiciat planetam retrogradum in signo feminino statim pluet. Item luna iuncta planete retrogrado aucta lumine signum est pluuie. Item luna in signo etc. Hyspalensis addit cum luna fuerit in domo feminina ut orientalis uel occidentalis quarta et considerat eam planeta retrogradus in signo feminino necessario pluuia erit et videtur quod propositio hec supponat aliquam aliam significationem planetarum sicut per apertionem portarum et huiusmodi. et sic continuaretur cum dictis hyspalensis precedentibus. Item luna iuncta etc.

Capitulum septimum.

Scias iterum quod luna declinatione meridionali quando applicatur cum directis et est signatio siccitatis mouetur aer ad summum frigidum si fuerit minuens lumine. Et quando fuerit in declinatione septentrionali et calor est in estate et applicatur cum planetis retrogradis et erit addens lumine suo mouebitur diuersitas ventorum et si fuerit minuens lumine minuetur illud. Item si lune in scorpione opponitur mars pluuie abundabunt maxime si fuerit sol in aquario uel piscibus. Item cum luna est in opposito aut cum

venere in piscibus ariete libra ꝛ scorpione erunt lampades tonitrua ꝛ fulgura. Scias iterũ ꝛc̃. hoc Alkindus in fine quarti capituli. Itẽ si lune in scorpione ꝛc̃. Itẽ cũ luna ꝛc̃.

Capitulũ octauũ.

Item cũ sol est in hemisperio australi ꝛ venus sub radijs eius si luna sibi applicet statim pluet. Item cũ venus in scorpione uel aquario uel capricorno cõiungitq luna ei uel eã aspicit significat pluuiã multaz. Similiter mercurius in statione aliquo triũ p̄dictorũ signoꝝ sic fit tribus planetis cõiunctis in aquario. Item cum luna mercurio adusto applicat aut de scorpione opponit̃ pluuiã. Item cuz sol ꝛc̃. Itẽ cum venus ꝛc̃. Item cum luna mercurio ꝛc̃.

Capitulũ nonũ.

Luna igit̃ a marte discedens eadẽ die pluuias innuit in signo p̄cipue aquatico p singulos autem dies p signa que imbrib⁹ dicant̃ erit discretio sicut cancer scorpio aquari⁹ ꝛ leo: p̄cipue aquari⁹ ꝛ leo. Stelle iterũ pluuiaꝝ significatiue venus mercuri⁹ ꝛ luna: potissimũ venus ꝛ mars. venus iterũ p̄dictoꝝ qõlibet occupans dũ ea in extremo signi uel medio cõmoret̃. Luna iterum signa aquatica pmeando veneri applicans eadẽ die pluuiarũ innuit redũdantiã. Uenus itidẽ ꝛ mercurius dũ huiusmodi signa pambulant etiam luna siliter alteruter applicans ꝛ finẽ signi obtinens pluuias priorib⁹ tñ minores aduehent. Luna itidẽ ꝛ venus in signis aquaticis mercurio ab eis remoto pluuiarũ habet iudiciũ nec aliud dũ mercuri⁹ ꝛ luna ad hui⁹modi signa pueniũt licet venus in pluuioso nõ ambulet. Luna in eisdẽ signis veneri ꝛ mercurio applicans dũ similia gradiant̃ aut cũ eadem discurrant donec luna ab eis separet̃ pluuias renouãt. Luna igit̃ a marte ꝛc̃. hoc haomar i fine ꝛ aliqua ibi ponunt̃ que sũt similia eis seu illis que sequũtur in illa ppositione que sic incipit Item quottidianos imbres ꝛc̃.

Capitulũ decimũ De planetis pluuiosis.

Item ex cõiunctiõe saturni ꝛ iouis fit frigus. Item si sol saturnus ꝛ iupiter fuerint in aliquo signoruz aquaticorũ ꝛ cauda cũ illis timendũ est in illa parte signi de pluuiis multis cũ torrentibus corrũpentib⁹ ciuitates ꝛ hoc cum adiuncti fuerint in hyeme etiam similiter in estate ꝛ erũt nubes grando aut aues equitantiũ ꝛ hoc erit s̃m mãsionem lune cũ illis. Et si fuerit sol cõiunctus ꝛ saturn⁹ ioue ꝛ marte i vno

signo aqueo erit signũ pluuie, ⁊ torrentiũ nociuarũ ⁊ pluuiarũ: ⁊ fortius qñ adiungeť cum sole ⁊ marte in signo aqueo sicut ostẽdi tibi ⁊ aspiciet eos saturnꝰ ex q̃rto aut cõiungeť cũ eis. si fuerit in signo. 10º. inspice venerem qñ intrabit sub radijs sicut mulier sub viro. Itẽ ex cõiuctiõe saturni ⁊c̃. hoc in floribꝰ hermetis. Itẽ si fuerit sol iunctꝰ ⁊ saturnus ⁊c̃. hoc in 6º. caº. Alkindi. ⁊ nota si placet que sũt stelle significatiue aque. hoc dictũ est prius iõ nõ est vis. ⁊c̃. Capitulũ vndecimũ.

Item temperãtia aeris fit ex cõiunctiõe iouis ⁊ solis ⁊ hoc maxime cũ cõiũctio illa fuerit in signis aeris. Itẽ ex cõiunctione solis ⁊ martis in signo bicorpeo ⁊ tpe veris fit tenebrositas aeris ⁊ infirmitates frequenter cõtingũt. Itẽ estiuo tpe cũ sol in termino martis fit estus i hyemali siccitas ⁊ paucitas pluuiarũ. Itẽ cũ iupiter fuerit cõmixtus in aliqua virtute cũ marte estiuo tpe in signis aquilonaribꝰ certissime põt p̃dici ꝙ nubes ⁊ scintillatiões ⁊ tonitrua fient in aere: ita etiã ut piculũ sit hoĩbus futurũ ꝓpter aeris pestilentiã ex nimia coruscatiõe futura. Itẽ tẽperantia aeris ⁊c̃. hoc in floribꝰ hermetis. Itẽ cum iupiter ⁊c̃. hoc Albertus in fine capituli de tonitruis. ⁊ põt notari causa si placet ⁊c̃. Capitulũ. 12.

Item martis ⁊ veneris sub scorpione cõuentus pluuiam facit. Item venus in scorpione existens a marte respecta ꝓpter maria que scorpio habet pluuiarũ: si v̾o martis caret respectu ex relicto ducatu nõ multa imbriuz erit vbertas. Item martis ⁊ veneris ⁊c̃. Item venus in scorpione hoc in libello qui incipit Cũ multa ⁊c̃. Capitulũ. 13.

Item scias loca applicationis mercurij cũ tribus supiori bus ⁊ cũ quo applicať ⁊ a quo sepatus fuerit. Si cum saturno erit ventus fortis cum tenebra magna ⁊ puluere. Si cum ioue significat ventũ mitẽ absq; pluuia. Si cum marte ventos calidos. Si cũ sole ventũ calidũ cum corruptione. Si venus applicat cũ saturno significat pluuiã ⁊ erit forte grando in ea paruus ⁊. q. solis pluuie nõ residẽt in ea. Item qñ mercurius applicuerit cuz marte erit pluuia interpallata ⁊ ventus ⁊ fulgur. Et qñ venus cum ioue erit pluuia larga ⁊ descendet ⁊ ꝑficiet. Qñ luna cum saturno significabit nubes nigras cõculcatas vna pars conculcans aliã. Qñ cum marte: nubes interscissas ⁊ gelu ⁊ fulgura ⁊ forte apparebit arcus nec erit pluuia cõmunis. Qñ v̾o luna cum venere ⁊ ioue: erũt nubes ⁊ ros multe vtilitatis. Qñ v̾o cũ mercurio: ernt nubes pallide colores fumosi ⁊ ventus bonus cũ pluuia. Item scias loca ⁊c̃. hoc

Alkindus in octauo capitulo. Item qñ mercurius cũ marte ꝛc. hoc Alkindus octauo capitulo ꝛc.

Sequit̃ sexta pars de hora pluuie ꝛ vbi ꝛ qñ fortior aut debilior ꝛ que sint loca apta ad hoc ꝛ de duratione eiusdem. Capitulũ primũ.

Um planete erunt in sũmo ad significationem sup pluuiã ꝛ luna siliter i loco significationis ꝛ applicationis gradu ad gradũ de centris a sole ꝛ planetis cũ ascẽdentibus climatũ: ꝛ erit ascendẽs supra horizontẽ aliquorũ illud ẽ signũ hore pluuie in loco vbi sic ascendit. Et fortior significatio ẽ illi cui firmat luna illa hora i angulo terre sue dũ tñ fuerit cũ planetis significatorib⁹ in eqdistante equatori diei etiã si planeta sic ascẽdebat cũ luna supra horizonte qꝫ ꝑ horizontẽ fiat illa hora abscisio supra punctũ qđ ascendebat cũ luna in signorũ circulo etiã vbi luna fuerit in medio celi si sol sit in ascendente multiplicabit̃ res ꝛ qñ fuerit aliquis signatorũ in angulo terre aut orientali aut occidentali aut medio celi res durabunt donec cadant planete signatores. Durabunt etiã humores q̃diu sol ꝛ luna ꝛ signatores fuerint applicati pars eoꝝ parti. Et etiã res ſm numerũ planetarũ ad angulos illi⁹ terre tũc qñ ceciderit sol ꝛ luna ꝛ planete pars eorũ a parte de gradib⁹ applicationũ q̃uis planete sol ꝛ luna manserint in angulis: nõ erit aliqs vbi applicuerint ad inuicẽ ꝛ cũ hoc fuerit eorũ pluuialis dignior est significatio cũ fuerit applicatio grad⁹ cum gradu ꝛ vnus planetarũ ad angulos nõ erũt vires ita fortes ſꝫ minuet̃ multũ nisi fortificauerit hoc. Alia significatio aut ipsa met in seipsa ꝛc. Cũ fuerit sol i hora pricipij significationũ in medio celi debilitabit̃ ꝛ minuet̃. Qñ erunt loca eleuata erit significatio fortior: ꝛ qñ depressa durabit humiditas donec compleant̃ nature ꝛ abscindant̃ planete a centris planetis: cũ fuerit in hora applicationis cũ gradu planete ꝛ luna cadentes ab angulis horizõti aliquorum debilitabit̃ significatio apud eos ꝛ tũc erunt nubes cum fuerit sol in horizonte orientis ꝛ luna ꝛ planete significatores in horizonte occidentis ꝛ in angulo est signum pluuiarum ꝛ horarũ suarum.

Item cū fuerit sol in horizonte occidentis ⁊ luna in horizonte orientis ⁊ aliquis planetarū in angulorū terre aut in medio celi in hora applicationis signū est pluuie. Scias debiles significationes nō significat in littorib⁹ maris ꝓpter multā depressionē nisi rores ⁊ nubes: sꝫ significant in locis electis ⁊ erit pluuia cū fuerit sol ⁊ luna ⁊ planete pars cū parte i centris pluuialib⁹ ꝑdictis in horis applicatiōis gradus cuꝫ gradu ⁊ qñ fuerit aliquis planeta ⁊ signatores in aliquo angulo ꝛ si sol tūc fuerit super zenith capitū debilior erit significatio: si fuerit significatio pluuialis in aliquo loco ⁊ nō sit i alio tñ locus a quo ventus venerit supra populū ostendit: vbi fuerat significatio respectu sui. Aer eni soluit̄ partem frigidā humidā constrictā de parte calida. Qñ planete ⁊c̄. hoc Alkind⁹ caplo quinto paragrapho noiato ⁊c̄.

Capitulū secundū.

Cum errauerit modus ꝓphetandi. i. iudicandi cū venere ⁊ marte: ꝓpheta ⁊ iudica cū ioue ⁊ mercurio. si eni fuerit humidi aut frigidi ⁊ fuerit inter eos applicatio de cētris ⁊ de sole ⁊ luna ⁊ cōcordauerint applicatiōes ꝑs parti ⁊ hora tpis de. 4º 7º. 3º. ⁊ sextili aut cōiunctione illa est hora pluuie ⁊ de deblitate ⁊ fortitudine ⁊ loco ꝑ retrogradationē pausationē applicationē ⁊c̄. iudicabis sicut dictū est de venere ⁊ marte nisi ꝙ minus significāt q̄ꝫ mars ⁊ ven⁹ ⁊c̄. Similiter aspice saturnum ⁊ solē si fuerint humidi calidi aut frigidi humidi ⁊ iudica ꝑ applicationes ⁊c̄. sicut fecisti cū ioue ⁊ mercurio sꝫ remissius significant q̄ꝫ venus ⁊ mars iupiter ⁊ mercurius ⁊ significatio fortior est cū vni significationi addunt̄ alie. Itē significatio triū significatorū cōis est in omni loco ⁊ similiter. 4º 5º. 6º. 7º. nā nūq̄ꝫ fallit vsq̄ꝫ ad septem ⁊ sūt vires sue ꝟm elongationē loci ab equatore diei. scias ꝙ in locis in quib⁹ sūt aque fortior significationū forte te decipit in estate aut media invere: sꝫ i hyeme debilior nūq̄ꝫ fallit. in autūno forte ibidē poteris decipi quantū ad horam sꝫ in tpe generationis nō mentiet̄ quicq̄ꝫ. Scias ꝙ signū rerū ⁊ pluuiarū est qđ sit hora cōiunctiōis vnde luminariū significatio pluuialis ⁊ illud certius omni mense aut hora oppositiōis solis qꝛ mutat̄ temp⁹ de natura ad naturā. si eni fuerit significatio pluuiosa illud est fortius i omni quarta ꝙ fiat ad illud tempus. Cū errauerit ⁊c̄. hoc vbi supra cōsequentis ⁊ dependet hec ꝓpositio ex illa precedente. Si vis scire vim ⁊ debilitatem ⁊c̄.

Capitulū tertiū.

Die illa ⁊ hora pluet cum luna in cardine ⁊ in aqueo applicat veneri ⁊ mercurio ⁊ durat q̄ꝫdiu durat applicatio. Die illa ⁊c̄.

¶ Item cū fuerit luna applicās alicui planete aut ipsa sepata

z fuerit eoꝝ latitudo eqnoctialis: eadē die luna faciet opꝰ illiꝰ plāete. Cū fuerit luna in aliq̄ angulorꝫ hemisperij z planeta in ipso linee anguli eq distans cū luna: aut in aliq̄ angulo eiusdē hemisperij faciet opꝰ illiꝰ planete. Cū fuerit luna in oppositiōe alteriꝰ planete etiā fuerit eoꝝ latitudines ab ecliptica in diuersis ptibꝰ eq̄les uel fere: luna faciet opꝰ eius. Cū oriť luna aut occidit seu aliū angulū intrat z aliꝰ planeta sibi illū angulū attigerit ꝓpter varias latitudies licet etiā sint diūcti ꝑ gradꝰ eq̄les tñ faciet opꝰ illiꝰ planete. Jtē cū fuerit luna applicās zc. hoc in aliquo antiquo auctore inueni: sꝫ hoc a magistro meo habui zc.

Septima ps de mutatiōe aeris que ē ꝑ signalia supiora q̄ ꝑ methaurorū sniam hñt cognosci. Et quedā alia signalia vulgariť approbata.

Capitulū primū De coloris circa eclypsim significatione.

SI color lumiariū hora eclypsis uel apparēs circa luiaria fuerit niger uel tendēs aliq̄liť ad viridez sigt ea q̄ sūt de nā saturni. Sꝫ albū parū tendens ad croceū iouis. Si tenderit versus vermiliū clarū martj. Si croceus tendēs ad colorē aureū: splendidū venerj. Si vo colores diuersi fuerint mercurij. Jn oibꝰ alijs sigtionibꝰ ꝑ colores hoc mō iudicabis. Et hoc ē magnū iuuamētū z cognoscendū planetā dñantē: z si in toto corpe lunaris eclypsati aut in oibꝰ ptibꝰ q̄ sunt circa appuerit color signū ē ꝙ accidēs ab eclypsi erit i maiori pte regionū cū accidente ꝯcordantiū: si vo versꝰ illā ptē accidēs erit i regionibꝰ cū ascendēte ꝯcordantibꝰ q̄ sūt versꝰ illā ptē. Si color luiariū hora eclypsis zc. hoc extrahiť a Ptolemeo haly in. 9º. ca. 2ᶜ ptis q̄driptiti zc.

Capitulū secundū De comete significatiōe vbi z q̄n

ITē ꝑ cometas fiūt iudicia vnde accidēs erit i regionibꝰ ꝯcordātibꝰ cū signo in q̄ appuerit z in cuiꝰ signi directo extiterit z ꝑ colorē eiꝰ z formā scies cū q̄ planeta ꝯcordauerit ꝑ quē scies q̄litatē accidētis z ꝯm q̄litatis vtutis planete dñantis ibi erit virtꝰ accidētis. Tēpus etiā duratiōis signalis corrñdet duratiōi accidentis: z ꝯm haly aspice ad horas q̄ sūt inť signale z ascēdēs sicut fit in eclypsibꝰ z erit cito uel tarde ꝯm cōpatiōnē eiꝰ ad solē. vnde si i mane matutinali apparuerit erit cito. Si i vespe erit tarde z generaliť facias sicut i eclypsibꝰ. Jtē ꝑ cometas zc. hoc ab eisdē ibi supra. Capitulū tertiū.

ITem aspice ad signalia apparentia circa solē cū orit̄ ꝓ sciendo illa q̄ accidūt de die: uel dū accidit ꝓ sciēdo illa q̄ accidūt de nocte: ⁊ ꝓ sciendo ea q̄ multū durāt. Inspice in horis quib⁹ sol hꝫ ꝑticipationē cū luna de figura qꝛ q̄libet figura mōstrat ut plurimū statū q erit ab ipsa hora vsqꝫ ad horā q̄ luna se ponat in figura pᵒ modū veniēte. Itē aspice ⁊c̄. hoc ex. 13ᵒ caᵒ 2ᵉ ꝑtis quadriꝑtiti ⁊c̄.

Capitulū quartū De ꝓnosticatiōe aure ꝑ arcū uel angulū solis.

CUm sol orit̄ uel occidit clarus limpid⁹ sine nubib⁹ uel alia re ipsū coopiente sigt̄ serenū diē: si ⁊ circul⁹ ei⁹ fuerit diuersorū colorū uel trabēs ad vermiliū sicut ignis: aut ꝙ sint radij venientes a sole uel q sūt circa eū de vermilio: aut ꝙ sint nubes q̄ dicte sūt soles ab vna ꝑte ei⁹ ⁊ assimilent̄ colori nubis tendētis ad vermiliū ⁊ fuerint radij solis extensi ⁊ longi sigbūt ventos fortes ⁊ mouebunt̄ a ꝑte q̄ ipsa signalia apparebūt. Si vᵒ sol niger ascēdit uel ꝙ tendit ad viridē uel occiderit cū nubib⁹ aut habuerit ab ambab⁹ ꝑtib⁹ nubes q̄ dicte sūt soles uel radij qui de sole exeūt tenderint ad nigritudinē uel viridem sigbit aerē hyemalē ⁊ pluuias. Itē sol pur⁹ oriēs atqꝫ nō feruēs serenū diē nūciat: pallid⁹ grandinē. Si vᵒ occidit ꝑdie seren⁹ ⁊ orit̄ tantus certior fides erit serenitatis. Itē sol cōcau⁹ oriens pluuias ꝑdicit. Idē ventos cū aūt exorientē eū nubes rubescūt qꝫ si etiā nigre rubentib⁹ interuenerint ⁊ puluias. Itē si oriētis aut occidētis radij vident̄ coire pluuias ⁊ si cirra occidentē rubescūt ambos serenitatē futuri diei spondēt. Si vᵒ in exortu spargent̄ ꝑtim ad austrū ⁊ ꝑtim ad aqlonē licꝫ sit pura circa eū serenitas tñ pluuias cū vento sigbūt. Et si in ortu aut in occasu ↄtracti curuant̄ radij imbres mōstrant̄. Itē si in occasu ei⁹ pluat aut radij in se nubes trahūt asperā in ꝓximū diē tempestatē sigbūt. Luꝫ in oriente radij nō illustres eminebūt q̄ꝫ circa circūdati nō sint: pluuiaꝫ ꝓtendit. Si aūt exortū nubes globant̄ hyemē asperā denūciabunt si ab ortu repellunt̄ ⁊ ad occasū adhibēt serenitatē. Si nubes solari circūdāt quāto minus luminis relinquūt tāto rubedior tēpestas erit. Si vᵒ etiā duplex orbis fuerit contractior ꝙ si hoc in ortu uel in occasu ita ut rubescūt nubes maxima ostēdet̄ tēpestas ⁊ si non ambiūt sꝫ incūbant a q̊cūqꝫ vento fuerit eū ꝓtendunt. Si aūt a meridie imbrē. Si oriens tingit̄ orbe ex qua ꝑte rose ruperit vent⁹ expectet̄ si totus defluxerit equalit̄ serenitatē dabit. Itē si in ortu longe radius ꝑ nubes porriget̄ ⁊ medius inanis erit pluuias sigt̄. Si ante ortuꝫ radij se ostendāt aquā ⁊ ventū: si

circa occidens candidus circulus erit nocti leuē tempestatē. Si nebula
vehementiorē. Si candente sole ventū. Si autē circulus erit ex qua re-
gione ruperit se sigt̄ magnū ventū. Item sol in ortu suo maculosus uel
sub nube latens pluuiā ꝓsagit. Et si palleat tēpestuosū denūciat diē. Si
cōcauus videt̄ ita ut in medio fulgens radios ad austrū ⁊ aqlonē emit-
tat tempestatē humidā ⁊ ventosaz ꝓnūciant. Si pallidus in nigras nu-
bes ad aqlonē accidat ventū ꝓsagit. Sero rubens desigt̄ mane serenuz.
Si mane imbres denūciat ab aqlone fulgur tonitruū ꝓtendit ⁊c̄. Cū sol
orit̄ ⁊c̄. hoc vbi supra. ¶ Notandū ſm haly suꝑ illo verbo sigt̄ serenum
hoc est q₂ hoc ostēdit ꝙ est oī fumositati limpid᷒. Itē color diuersus in
circulo solis est mercurialis ⁊ color tendēs ad vermiliuz ignis cū fuerit
radij veniētes a sole uel q circū fuerint ē mercurialis. Itē nubes q̄ dicū
tur soles sūt q̄ reuerberāt radios solis ⁊ qn̄ tendūt ad vermiliū sunt etiā
fumi de natura martis. Silr̄ iter etiā radij longi extensi monstrant fūmū
siccū ⁊ ꝓpter hoc sigt̄ oīa ista ventos fortes a pte in q̄ apparuerint. Itē
nigredo ⁊ viriditas ꝙ fumositas ē de natura saturni. Itē nota ꝙ tota si
gnificatio signaliū ē certa si cōcordauerint cū figuris ꝓmis luminariū q̄
tales habeāt significatiōes ⁊ ꝑ oīa sic intelliges. Itē Alkind᷒ fere idē in
fine capl̄i qnti. Itē ☉ pur᷒ ⁊c̄. hoc extrahit̄ a quodaz libro qui incipit
De tempestiua q est de tempestatū ꝓsagijs vsq₃ ad istā partē. Item sol i
ortu ⁊c̄. hoc in quodā extrauagante Sero rubens. Idem Albertus.

Capitulū quintum

ITem aspice ad locum lune die tertia ante cōiunctionem
uel oppositionem: ⁊ die tertia anteq̄₃ sit dimidiata i luce
uel tertia die post has horas ⁊ clare fuerit ⁊ circū se nō te
nuerint rem aliquā demōstrat serenū ⁊ si subtilis vermi-
lia ⁊ qd̄ remanet de suo circulo siue luce fit clarū assimi
lando ꝙ moueat̄ significat motū ventoꝝ a parte qua de-
clinat ⁊ si fuerit nigra uel viridis spissa significat aerē hyemalem ⁊ plu-
uias. Item si circulus clarus solus circa eam fit qui paulatiue destruat̄
significat aeris claritatem ⁊ si fuerint duo uel tres significāt aerem hye
malē. Et si tenderit ad vermiliū fumum ⁊ sit intercisus significat aerem
hyemalem venientem per ventos fortes: turbidus aut spissus significat
etiam aerē hyemalem cum grandine minuto. tendens vō ad viridez cū
nigro ⁊ fuerit intercisus significat etiā aerem hyemalem ⁊ quanto plu-
res fuerint circuli ſm hoc res quas dixim᷒ erunt multe. ¶ Itē luna q̄rta
maxime obseruat egypt᷒. Si suspendēs exorta puro nitore fulserit sere-
nitatē. Si rubicūda ventos: si nigra pluuias ꝓtendit. In. 15. cornua ei᷒

obtusa pluuiá erecta ⁊ infesta ventos sp̄ signāt q̈rtá cū marie cornu eiꝰ acuminatū septētrionalē atq̧ rigidū illū p̄sagit vētū: inferiꝰ austrū vtra-q̧ recta noctē ventosā. Si q̈rtā rutilus orbis cingebat ⁊ vētos ⁊ imbres p̄mouebit: apud varronē ita ē. Si q̈rta die luna erit directa magnā tem pestatē p̄sagit i mari nō coronā circa se habeat ⁊ eā sincerā qm̄ illo mō ⁊ nō plenā lunā hyematurū ostēdit. Itē si in plenilunio p̱ dimidiū pura erit dies serenos sig̃bit: si rutila ventos: si nigra imbres: si aliquo orbe nubes incluserit ventos qua se ruperit: si gemini orbes cinxerint maio-rē tempestatē ⁊ maiorē ventū. Si tres aut magis infrupti aut distracti nascēs luna si cornu sup̱iori abstracto surget: pluuias decrescens dabit Si inferiore aut pleniluniū si i media illa nigritia fuerit imbrē in pleni lunio. Itē si plena circa se habebit orbē ex q̈ p̱te marie splendebit ex ea ventū ostēdet. Si in ortu cornua crassiora habuerit horridā tēpestatē. Si añ q̈rtā nō apparuerit vento flauonio flāte hyemalis toto mēse erit Si. 6ª vehementiꝰ ⁊ flāmea apparuerit asperas tēpestates p̄sagit. Sunt etiā ipsiꝰ lune. 8. articuli quotiēs in angulos solis incidat plerisq̧ intrat eos tm̄ obseruātibꝰ p̄sagia eiꝰ hoc ē. 1. 3. 7. 11. 19. 23. 27. ⁊ interluniū ⁊c̄. Itē aspice ad locū ⁊c̄. hoc ex. 13º. caº. 2ᵉ p̱tis q̈driptiti Ptolemei. ¶ Scien dū ꝙ qñ circulꝰ solis ⁊c̄. monstrāt ꝙ fumositas ē ⁊ ꝓpter hoc sig̃t serenū Itē intersio mōstrat motū ipsiꝰ fluuiiᵉ iō sig̃t vētos. Alkindꝰ fere idē dicit in fine q̱nti caⁱ ⁊c̄. Itē lunā q̈rtā ⁊c̄. hoc i libro tēpestatū p̄sagijs vsq̧ ad illā p̱tem Considera colores ⁊c̄. Capitulū sextū.

Item cōsidera colores circuloꝝ q̱ sūt circa planetas ⁊ stellas fi-xas lucētes ⁊ ƀm hoc sicut priꝰ iudica. Inspice etiā ad stellas fi-xas specialiť ad illas q̄ multū adiūctate vna circa aliā magnitu dinē ⁊ colores: vnde si apparuerint maiores ⁊ maioris lucis q̄s sole ⁊ sig̃nt cursū ventoꝝ a quacūq̧ p̱te fuerint. Itē nebulose ꝓprie sicut stella q̄ dicta ē p̄sepe ⁊ alie tales si assimilabunť coop̱te in tp̱e sereno ꝙ vix appareāt uel ꝙ sint spissi sig̃nt multas aquas. Itē ꝯsidera ⁊c̄. hoc ex 13º caº. secūde p̱tis q̈drip̱titi Ptolemei vsq̧ ad illā Itē cū repēte. ¶ Sciē-dū ƀm haly ꝙ q̄libet stella trahit fumū q̱ ꝯcordat cū nā sua. qñ igiť mul tus fumꝰ apparuit in p̱te alicuiꝰ eaꝝ sig̃t ꝙ virtꝰ illiꝰ vincet. Itē stelle que sūt multe adiūctate sūt stelle geminoꝝ ⁊ scorpionis. Itē stelle nebulose de quibꝰ facit mentionē sūt in magnitudine sexta. Idē fere Alkindꝰ in fi ne q̱nti capl'i ⁊c̄. Capl'm. 7. De p̱nosticatiōe aure p̱ stellas fixas.

Item cū repente stellaruz fulgur obscurať ut illud neq̧ nubila neq̧ caligine accidat graues signat tēpestates. Si volitarie plu res stelle videbunť quo feranť albescentes ventos ex his p̱tibꝰ nūciabūt aut cursitabūt certos. Si illud in pluribꝰ p̱tibꝰ fiet in-

constanti ventos ⁊ vndici. Si vo aliquā stellā errā incluserit orbis im/
brē sicut ⁊ i signo cācri ⁊ stelle pue aselli appellate exiguū inter illas spa
ciū obtinētes nubeculā quā p̄sepia appellāt hoc cū i celo sereno appa
rere desierit atrox hyems sequet̄. Si in alterā illarū aqloniā caligo ab/
stulerit auster zenith: si austrinā aqlo. Itē cū repente ⁊c̄. hoc in libro de
p̄sagijs tēpestatū ⁊c̄. Capitulū. 8. De pnosticatiōe ventoꝝ ꝑ cometas.

ITem stelle comate significāt siccitatē ⁊ vētos ⁊ qd inde ac
cidet erit ſm multitudinē harū rerū. Itē comete cū eas cir
cuit nigredo ⁊ tenebre signt siccitatē fortē ⁊ ventos in qua
pte apparuerint ⁊ ē duratio ſm quātitatē luis tenebre: ⁊ si
fuerit de ptib⁹ oppositis sigt vētos ⁊ pluuiā ⁊ nubis cū to/
nitruis ⁊ fulgure ⁊ cū fuerit in estate sigt pluuiā. silr̄ ⁊ i hyeme. ¶ Itē
cursus stellaꝝ ex vno angulo sigt ventoꝝ cursū a pte illa ⁊ si cucurrerēt
ex angulis diuersis significāt vētos iordiatos. Et de q̄ttuor angul' signt
diuersū aerē hyemalē ita q̄ pueniet ad tonitrua ⁊ lampades ⁊ silr̄ ⁊c̄.
Itē stelle comate ⁊c̄. hoc a Ptolemeo ex. 13.° ca.° 2ᵉ ptis q̄driptiti. ſm ha
ly comete fiūt oēs de fumo sicco ⁊ si apparuerint nebulose signat vētos
multos ⁊ siccitatē aeris ſm eaꝝ magnitudinē ⁊ durabit ſʒ eaꝝ duratio
nē. Itē comete ⁊c̄. hoc Alkind⁹ i fine ca' qnti. Itē cursus stellarū ⁊c̄. hoc
Ptoleme⁹ in. 13.° ca° 2ᵉ ptis q̄driptiti. Sciēdū ſm haly q̄ anguli sicut sūt
inter septētrionē ⁊ occidēs ⁊ sic de alijs ut supra ⁊c̄. Capitulū nonū.

ITē celū cū eq̄liter splendidū erit tūc i articulis tēpoꝝ que
ꝓposuim⁹ autūnū serenū p̄sagabit̄ frigidūʒ. Item si ver ⁊
estas nō sine refrigerio aliq̄ trāsierit in autūnū serenū ac
densū minusq̄ʒ ventosū faciēt. autūni vo serenitatē vento
sam hyemē facit. Itē celū ⁊c̄. hoc in libro de p̄sagijs Au
tūnū serenū ⁊c̄. Itē si ver ⁊c̄. hoc ibi supra.

Capitulū decimū De pnosticatione ventoꝝ ꝑ tonitrua.

ITem si i signis hyemalib⁹ audiant̄ tonitrua sicut in capricorno
uel aquario tūc i initio veris ⁊ forte ꝑ totū annū plus vētabit q̄ʒ
in alio āno. ¶ Itē cū in estate vehementi⁹ tonitruit q̄ʒ fulgurat
ventos ex ea pte denūciat ⁊ eō si min⁹ tonuerit q̄ʒ fulgurat imbrē cū sere
no celo fulgura erūt ⁊ tonitrua adhyemabit in hyeme acertissime: aut si
ex oib⁹ q̄ttuor ptib⁹ celi fulgurabit cū aqlone tm̄ in posterū diē aquā p̄/
tēdit cū a septētrione ventū cū ifestiuo tpe ab austro choro ul' fauonio
serena fulgurauerit ventū ⁊ imbrē eisdē regionib⁹ demōstrat. Itē toni/
trua matutina ventū signt imbrē meridianā. Itē si in signis hyemalib⁹
⁊c̄. Albert⁹ in cōpendio suo q incipit Passiōes ⁊c̄. in ca.° Deinceps i fine

Itē cū in estate vehementiꝰ ⁊c̄.hoc in libro de ꝑsagijs tēpestatū vsqꝫ huc
Itē fm ꝓnosticationē ⁊c̄. Caplm. 11. De diuersitate nubiū qd signt.

Tem cū nubes celo sereno in celū ferūt ex q̄cūqꝫ pte illud fiet venti expectent si in eodē loco globabunt appropinquante sole discutient ⁊ hoc aqlone fiet ventꝰ. Sꝫ austro imbres ꝓtendūt sole occidēte si ex vtraqꝫ pte eiꝰ celū petēt tēpestatē sigbūt vehementiꝰ arcu ab oriēte in nocte aqua minat ab occidēte in posterū diē. Si nubes ⁊ vellera lane spargunt multo ab oriēte aquā in triduū ꝑsagiūt: cū in cacuminibus montiū nubes ascenderint adhyemabit. Si hec cacumina pura fuerint asseuerabit. Itē nube grauida candidante ꝙ vocāt albā grando iminebit celo q̄ꝫuis sereno nubila q̄ꝫuis pua ꝓcellosū dabit: nebule aut mōtibus descendētes aut celo cadētes uel in vallibꝰ sedētes serenitatē ꝑmittūt. Itē cū nubes celo sereno ⁊c̄.hoc etiā ibi supra. Sciendū fm Ptolemeū in. 13ᵒ. caᵒ 2ᶜ ptis q̄driptiti ꝙ nubes q̄ assimilant floccis lane significant aliq̄n aerē hyemalē. Capitulū duodecimū.

Tem fm ꝓnosticationē rusticoꝝ q̄n in hyeme remittit frigꝰ expectant niues nisi sūt nnbes obscure. Aliud aūt signū ē ⁊ verius vapor niuis future lucidꝰ est ⁊ pallidꝰ ⁊ videt multꝰ ⁊ hoc est signū caritatis sue. Itē q̄nqꝫ stat in aere diu sicut p. 8. dies ⁊ hoc est signū caloris. Itē fm ꝓnosticationē ⁊c̄.hoc fm Albertū caᵒ. illo Nix autē ⁊c̄. Caplm. 13. De ꝓnosticatiōe ventoꝝ ꝑ diuersa signalia vulgi.

Tem tēpestuosa pluuia sꝑ est i vento ꝓcedente. Itē venti fortes fiūt ꝓcipue in autūnis. Itē tēpus flati aqlonis plus i vere ⁊ minus in autūno. Itē incensū frigꝰ ⁊ imensus calor sūt cā abscisionis ventoꝝ ⁊ pluuia sequēs est etiā causa abscisiōis eorū ⁊ hoc est fm qd. Itē an̄ tonitrua sunt venti validi ⁊ fortes. Itē tēpestuosa pluuia ⁊c̄.hoc Albertꝰ in caᵒ qd incipit In vtrisqꝫ aut ⁊c̄. Itē hoc supius scribebat. s. cū ventis ⁊ si placet fit vacuatio ventoꝝ fm Albertū in caᵒ. Dico aūt ventos. Itē intensū frigꝰ ⁊c̄. Albertꝰ in caᵒ. Dico aūt ventos. Itē ante tonitrua ⁊c̄. Albertꝰ caᵒ. Deinceps nr̄a ⁊c̄. Ca. 14. De grādinis sigtiōe.

Quando i vere uel autūno grando de celo ceciderit: tunc ꝑiculū iminet frugibꝰ dire gelideqꝫ pruine ⁊ hoc raro fallit nisi sol pꝰ grandinē calidior aerē terramqꝫ lustrauerit: grādo si media estate ceciderit circa solstitiuꝫ estiuale signū est in supiori aeris regiōe frigꝰ esse ꝑ maximū. Pars inferior aeris calefacta solis radijs liquefacēt grandinē descendentē in imensa quātitate molas faceret menstruosas. Itē q̄n in vere ⁊c̄. Albertus in caᵒ. grandines ⁊c̄. Caplm. 15. De ꝓnosticatiōe

aure p circulum celi siue iridē.

Tem arcus i diuersis tpibꝰ diuersa sigt in meridiē eni or-
tus magnā vim aquaꝝ mōstrat. Si vo circa occasū fuse-
rit tonabit ⁊ leuiter pluet. Si ab oriēte uel circa surrexe-
rit pmittit serenitatē. Jtē arcus si apparuerit cū aere hye
mali signat serenū ⁊ eꝫ. Et colores etiā ↄsiderādi sūt sicut
dictū ē priꝰ. Jtē arcꝰ duplices pluuias nunciāt, a pluuijs
serenitatē. Jtē arcus in diuersis tpibꝰ ⁊c̄. Albertꝰ in caº Restat vidē cau
sas ⁊c̄. Jtē arcus si apparuerit. hoc Ptolemeꝰ in vltimo caº 2ᶜ ptis q̄dri-
ptiti. ¶ Sciendū sm haly q cā huiꝰ est qꝛ in tpe sereno mōstrat addita-
mentū fumositatis aquose: ⁊ in hyemalibꝰ sigt minutionez ⁊ ppter hoc
sigt serenū. Jtem arcus duplices ⁊c̄.

Caplm. 16. Pronosticatio aure p colores nubiū.

Tem q̄druplex est nubes ↄtinēs ut frequenter forte toni
truū. s. nigra rubea viridis uel alba aliquantuluz nigra ⁊
spissa dat forte tonitruū specialit̄ si vapor intrinsecus sit
multꝰ ⁊ spissus. rubescēs aūt ex nigro ē nubes valde spissa
de se ꝫ vapor ignitꝰ iā resultat p ipsā ⁊ iō illa fortiorē fre
quēter dat ictū q̄ꝫ nigra: virēs aūt cū nigro ⁊ rubore puo
est pessima oiuz nubiū ⁊ timēda si directe sit circa ciuitatē aliquā ⁊ sigt
q frequēter emittit fulmina magnoꝝ lapidū q deijciūt turres ⁊ edificia
incendūt ⁊ hoies. Albā aūt nō oꝫ timere si eni fulmina cadāt sup edifi-
cia statim extinguūt̄ an̄q̄ꝫ tangant ea nisi sint valde sicca ⁊ cremabilia.
Jtē colores coruscatiōis ut plurimū sūt videlicet rubeꝰ clarꝰ ⁊ albus flā
meus ⁊ ruffus q̄ niuosus. primꝰ timendꝰ qꝛ incedit. 2ꝰ spargit se ⁊ nō le-
dit nisi facile cremabilia. 3ꝰ autē penetrabilis ē ⁊ talis frequēter scindit
fil' ⁊ incēdit. Jtē q̄druplex ⁊c̄. Albertꝰ in caº Deinceps. Jtem colores ⁊c̄.
ipse idem. Capitulū. 17.

Tem signa antecedētia terremotū sūt frigꝰ ex vapore frigido ⁊
sonus ex motu subterraneo. sequētia aūt sunt caligo ⁊ tenebre
circa solē ⁊ stellas p̄ter dispositionē nubiū. Jtē signa ⁊c̄. Alber
tus in caº terremotꝰ in fine. Caplm. 18. De pnosticatiōe aure ex igne.

Tem ignes terreni pallidi ⁊ murmurātes tēpestatū nūcij sequū
tur pluuie. Jā luceriꝰ fungi si flexu sese volitet flāma ventū ⁊ lu
mina cū sese flāmas elidūt aut vix accendit̄. Jtē cū pendēte scin
tille coeternant̄ uel cū tollentibꝰ ollas carbo adheret aut cū cō-
tentꝰ est fauillā discutit scintillā ve emittit uel cū cinis in foco concrescit
⁊ carbo vehement̄ plucet ventoꝝ ⁊ aquaꝝ ē sigtio. Jtē ignes ⁊c̄. hoc to-
tū in libro de p̄sagijs ⁊c̄. Caplm. 19. De pnosticatiōe aure ex mare.

Tē mare si trāquillū i portu cursitabit murmurabitve int se ven tū p̄dicit si illud in hyeme imbrē littoraq3 ripe resonabūt tranquille asperā tēpestatē. Itē ipsi⁹ maris trāquill⁹ sonit⁹ spume disperso aut aq̄ bullātes pulmōes re marini in pelago plurimorū dierū hyemē p̄tendūt seper silētio intumescit inflatūq3 alteri⁹ solito iam intra se ventos eē fatet̄ ꝛ etiā quidā son⁹ montiū nemorūq3 mugit⁹ mutationes aure p̄tendūt arborū siue aura q̄ sentient̄ folia ludētia. Lanugo ppl'i aut spine volitās aquisq3 pluuie ı̄natantes aut in cāpanis venturā tēpestatē p̄cedēs suus fragor celi ꝛ murmur nō dubiā significationē hn̄t. Itē mare ꝛc̄. in eodē libro p̄sagijs ꝛc̄. Capl'm. 20.

Tem delphin trāquillo luligo volitās conche adherētes echini astringētes sese aut aerena subintrātes tēpestatis sūt signa. Rane q̊3 vltra sonitū vocale ꝛ fulices matutino clangore. Itē mergia anates q̊3 pluuias rostro purgātes ventū. Cetereq3 aquatice aues cōcursātes: grues i mediterraneo festinātes mergiq3 uel came'maria aut stagna fugiētes: grues silētio p sublime volantes serenitatē sicut noctua in imbre garrula uel sereno tēpestatē: coruiq3 singultu quodam latrtanes seseq3 etiam cōcutientes si cōtumabūt. Si vo carptim vocem resoluebāt ventosū imbrē: gratuli sero a pabulo hyeme ꝛ albe aues cōgratulant̄: ꝛ cū terrestres volucres cōtra aquā clangorē dabūt p̄fūdētes sese hyemē, s3 maxime cornix ꝛ hyrūdo cū iuxta aq̄s volitāt ut pēna sepe p̄cutiant quecūq3 in arborib⁹ habitāt fugitās in nidis suis ꝛ anseres cōtinuo clangore intēpestini idē. Ardea in medijs arenis tristis: nec mirū aquaticos volucres intantū p̄sagia sentire aeris ꝛ aque cum sint fere eiusdē complexionis. Item Delphin ꝛc̄. vbi supra ꝛc̄.

¶ Item pecora exultantia ꝛ indecora lasciuia ludētia easdē significationes hn̄t: echones celū olefecrantes seq3 lambētes contra pilū turpes quoq3 porci Alcenos sibi manipulos feni laterātes segniterne etiā circa industriā ab aut formice cōcursantes aut oua p̄ferētes. Itē vermes terreni erūpentes trifoliū inhorrescere ꝛ foliū contra tēpestatem subrigere certū est: necnō in cibis ꝛ mensis nostris vasa quedā extulentiū addit̄ sudorē sup positorijs relinquētia duras tēpestates p̄nūciant. Itē cū sole ꝛ cordis ꝛ p̄tib⁹ corpis multis in sensib⁹ infinita p̄sagia apparebūt. Itē pecora ꝛc̄. In eodem libro vsq3 ad finē.

Repertoriū de mutatione aeris Finit.

Hyppocratis libellus de medicorū astrologia incipit: a Petro de abbano in latinū traductus.

Um legerē libros hyppocratis medicoꝝ optimi: īueni hūc ꝑuū ſꝫ magne vtilitat] librū: ⁊ valde neceſſe ē oībꝰ medicis. Qui hūc bn̄ ſcierit ſanitatē mortē uel vitā īfirmitat] poterit ꝓnūciare. Jubet ḡ hyppocras ut medicꝰ aſpiciat lunā qꝛ qn̄ plena eſt luīe: tūc creſcit ſanguis in hoīe ⁊ ī oībꝰ aīalibꝰ: ⁊ ī mari ⁊ in cūctis rebꝰ mūdanis eoꝝ creſcit cōplexio. Qn̄ igiẗ infirmꝰ occūbit oꝫ lunā iſpicē. Nā ſi exeat a ꝯiūctiōe tūc creſcit egritudo q̊uſqꝫ veniat ad graduꝫ oppoſitiōis. Et qn̄ fuerit ī oppōe vide ſi ſit cū mal' planet]: aut ī loco malo. aut ſi aſpexerit dn̄m domꝰ mortis: ⁊ ꝑ hoc poteris ſcire ſi īfirmꝰ mori debeat uel nō: uel ſi hēbit magnā īfirmitatē uel curā.

Signū arietis.

Nunc videamꝰ nām oīuꝫ ſignoꝝ iuxta principiū lune. Cū cuiqꝫ infirmitas accidat: ⁊ luna ſit ī ariete cū ♂ aut cū ſole erit egritudo ī capite ꝓpter nimiā caliditatē ☉. Et dolebit eiꝰ pulſꝰ capitis. Habebit q̊ꝫ febres calidas: ⁊ nō recedet ab eo caliditas. Patieẗ q̊ꝫ anxietatē: ⁊ vix loqueẗ. Jn pectore q̊ꝫ patieẗ nimiuꝫ calorē: ⁊ dolorē patieẗ ī pulmōe: ⁊ hēbit vehemētiſſimū pulſū. Neceſſe erit ei minuere ſanguinē de vena cordis: ⁊ vti rebꝰ frigidis: ⁊ cibo ⁊ potu minuētibꝰ calorē: ⁊ hec egritudo deueniet ī freneſi. Et ſi in eo fuerit ſaturnꝰ aut ♂ morieẗ ex hac egritudīe infra tres dies a die q̊ fuerit. ☽. cū. ☉. ꝑ q̄rtū aſpectū: ⁊ plus ē ⁊ hoc ſi. ☽. addat ſuo lumini. Si. ☽. fuerit in ariete ⁊ eā aſpexerit īfortuna ex. 4ª ul' oppōe. Si fuerit ſol erit hec egritudo ī capite: ⁊ iſta egritudo ducet eū extra vitatē ⁊ inſaniet: ⁊ nūc creſcit: nūc minuiẗ egritudo. Et ē ſilis illi q̷ vidē nō pōt. Qui aūt neſcit aſtronomiā nō poterit ſcire eiꝰ egritudinē. Et ſi fuerit ī diminutiōe ſui luīs: aut ī diminutiōe graduū qn̄ reuertiẗ ad primū aſpectū ſaturni qn̄ eū dimiſit ⁊ ꝑ aliū aſpectū eū aſpexerit terminaẗ īfirmitas ſiue ī bono ſiue ī malo. Qđ ſi aſpexerit infortunā morieẗ. Nota ꝙ. ☽. ⁊ dn̄s aſcendētis fortiſſime oꝑanẗ: ⁊ iō ſꝑ qđ ꝓmo aſpiciaẗ a iudicibꝰ ⁊ locꝰ ☽ ⁊ aſpectꝰ eiꝰ: deiñ dn̄s aſcēdēt]: Sꝫ meliorabiẗ ſi non aſpexerit. Et qn̄ īuenit. ♃. aut. ♀. ꝑ aliquē aſpectū an̄qꝫ veniat ad ꝯiūctionē: erit infirmitas ex aliq̊ flegmate albo: q̊ infirmꝰ primo ſentit grauedinē. Si. ☽. fuerit addēs ſuo lumini ⁊ gradibꝰ ⁊ fuerit ſol ⁊. ♂. ī ariete erit infirmitas ī capite ex flegmate albo: ⁊ exiet ſanguis de naribꝰ: ⁊ oportebit eū vti frigidis ⁊ erit ei opꝰ facē medicinā vnde apoſtema matureẗ. Et ſi fuerit. ☽. cū. ♀. ī loco. ☉. euadet infirmꝰ ſꝫ priꝰ habebit magnū ꝑiculū: iō mercuriꝰ ꝯcordat ſe cū. ♂. in vno negocio: ſꝫ mās nō facit ſic cū ſaturno. ⁊ morieẗ cū ſaturnꝰ erit in loco. ☉. Si fuerit iuppiter ibidē cū ea uel mercuriꝰ uel. ♀. hēbit infirmitatē diuerſā Si aūt aſpexerit eū. ☉. uel. ♂. in aliq̊ aſpectu opꝰ eſt ut des ei aliquam

leuē medicinā ⁊ leuē dietā: ⁊ qñqꝫ ſedeat qñqꝫ ſe moueat ⁊ voluat: ⁊ fac
eū ſedere i aliq̊ loco vbi poſſit ꝓ totū vidē ⁊ balneo vtat̃: ⁊ ſedeat plane
vbiqꝫ ⁊ ſicut velit: ⁊ da ei aquā bibere frigidā. Tauri.

Cum incidit īfirmitas ⁊. ☽ .ſit i tauro ⁊ aſpiciat eā. ♂ ex. 4º. iſta
infirmitas ē ex ſanguie: ⁊ ſentit calorē ⁊ ſiccitatē ⁊ dolorē i no
cte: ⁊ nō pōt dormire ⁊ hꝫ volūtatē bibendi vinū ⁊ res calidas
Neceſſariū eſt ei minuere ſanguinē: ⁊ dare medicinā q̄ reddat
eū frigidū ⁊ humidū. Sꝫ ſi fuerit i ipſo ſaturnꝰ cū. ☽ .aut venerit ad euꝫ
⁊ nō iuenerit fortunā moriet̃ vſqꝫ ad decem dies qñ cepit eū īfirmitas.
Primo ſi fuerit. ☽ .addēs ſui luie ⁊ gradibꝰ: ⁊ aſpexerit eā. ♂ .ex. 7º. ul̃. 8º.
⁊. ☽ .fuerit ad ſat̃nū ⁊. ☿ .cū ea fuerit: erit infirmitas hec ex flegmate: ⁊
erit debilis eger ⁊ diruptꝰ ⁊ vix poterit loq: ⁊ erit ſtomachꝰ indigeſtus: ⁊
nō poterit digerē cibaria ⁊ intus hēbit calorē. Et neceſſe ē ei medicina
laxatiua. Et cū. ☾ .ꝑuenerit ad oppoſitū locū īfirmabit̃ grauet̃ ⁊ moriet̃
niſi fuerit. ☽ .fortunata: ⁊ ſic euadet vſqꝫ ad. 4. dies. Qñ aliqs īfirmabit̃
ſi luna fuerit in tauro ⁊. ♂ .⁊. ☉ . cū ea infirmitas erit i pectore ⁊ maxie
de nocte: ⁊ erit ei lingua cōbuſta pre nimio calore quē patiet̃ in ore ⁊ i
oculis: ⁊ hēbit fluxū ventris ⁊ multū ſitiens: ⁊ erit balbutiēs. Et neceſſe
ē ei medicina cōſtrictiua ⁊ ſanguis minutio: ⁊ dieta eiꝰ ſit frigida: ⁊ a ca
lidis caueat. Et qñ luna fuerit in trino aſpectu ad. ☉ .ſi minuit̃ egritudo
euadet: ⁊ ſi augmentabit̃ moriet̃. Qñ fuerit in oppōe ſolis ſi iuenerit io
uem nō moriet̃. Et ſi eſt infortunata moriet̃. Geminorū.

Si luna fuerit i geminis cū aliqs icipit infirmari ⁊ fuerit in. 4º.
aſpectu ſat̃ni uel oppōe erit īfirmitas illa ex triſticia: uel quia
amiſit de rebꝰ uel qꝛ habuit nimiā cogitationeꝫ de aliq̊ nego
cio. Febris erit efimera uel putrida: ⁊ dolebit ꝑ totuꝫ corpꝰ: ⁊
patiet̃ magnū intus ⁊ in epate dolorē hēbit hec infirmitas ꝑ decē dies.
Cū fuerit. ☽ .in geminis augēs numero ⁊ luie: ⁊ aſpexerit eā mars. 8º. ul̃
7º. erit infirmitas febris ex colera rubea: ⁊ pulſus velox flebotometur: ⁊
dieta eiꝰ ſit frigida. Et ſi fuerit luna īpedita a ſat̃no ⁊ infortunata cū eo
moriet̃ qñ ꝑuenerit luna ad oppoſitū loci i q̊ erat qñ incepit infirmari.
Si fuerit fortunata euadet pꝰ diuturnā infirmitatē. Si aūt fuerit. ☽ .in
geminis erit infirmitas ex humidate. Et ſi fuerit ſaturnꝰ cū ea erit i capi
te ⁊ nō minuat̃: ⁊ caue ne vtat̃ frigidis ⁊ humidis ſꝫ vtat̃ tꝑatis. Et cū ꝑ
uenerit. ☽ .ad oppoſitū. ☉ .⁊ fuerit cū fortunis euadet ſi nō moriet̃. Si
aſpexerit eā fortuna ex bono aſpectu viuet: ſꝫ mutabit̃ i aliā egritudinē
ſꝫ qñ dimiſerit iſtā formā q̊uſqꝫ venerit i aliā oppoſitionē loci in q̊ erat:
erit infirmitas occulta ⁊ difficilis ad cognoſcēdū donec ꝑueniat. ☽ .ad
quartū aſpectū uel oppoſitū: ⁊ ſi fuerit cū fortuna euadet ⁊ ecōuerſo. Si

aũt fuerit mars ⁊. ☉ .⁊. ☽ .ĩ geminis patieƭ infirmitatẽ magnã ex calo-
re ⁊ lachrimabit eiꝰ vnus oculꝰ ⁊ forsan fiet freneticꝰ: ⁊ multũ timebit: ⁊
añ eũ apparebũt diuerse figure: ⁊ pulsus eiꝰ vix ĩuenieƭ: ⁊ pulsus capitis
dolebit ei. Caue igiƭ ne minuas eũ: ⁊ da ei leuẽ dietã: ⁊ paruꝫ sit in loco
tꝑato: ⁊ cũ ꝑuenerit ad q̃rtũ aspectũ morieƭ infirmꝰ si fuerit luna in for-
tuna. Si aũt fortuna euadet. Caue g̊ ne des ei farmatiã sꝫ vtaƭ leui die-
ta in balneo.

Cancri

SI fuerit. ☽ .ĩ cancro qñ alicui infirmitas accidit ⁊ aspexerit eã
saturnꝰ ex. 4º. uel. 7º. aspectu accidit ei frigꝰ post calorem sicut in
exitu balnei ⁊ nõ sentit dolorẽ: doletꝗ ei pectꝰ ⁊ hẽbit tussim ⁊
paruũ calorẽ. pulsus q̊ꝫ nõ ĩuenieƭ nisi mediocris: ei dolẽt lũ-
bi: ⁊ opus ẽ ei medicina ad pectꝰ purgandũ ⁊ tussim exprimendã. Si v̾o
nõ fuerit cũ luna aliq̃ fortuna: nec aspexerit eaꝫ fortuna donec ꝑueniat
ad. 4. aspectũ uel ad oppositũ loci in q̊ incepit ĩfirmitas morieƭ ĩfra. 10.
dies. Si aũt aspexerit eã viuet uƚ multũ grauabiƭ. Si aũt aspexerit eam
mars ex. 4º. uel opposito fiĝt vomitũ ⁊ eructationẽ ⁊ malã dispositioneꝫ
stomachi. Deƭ ei frigida: ⁊ medicina stomachi restrictiua. Et si nõ aspe-
xerit eã fortuna morieƭ añꝗ ꝑueniat ad q̃rtũ aspectũ. Si aũt fuerit va-
cua cursꝰ ĩfirmitas eiꝰ erit ex repletiõe ⁊ ex nimio potu ex q̊ vene sũt ni-
mis plene. hꝫ volũtatẽ sedẽdi ĩ altũ: ⁊ discooꝑit: ⁊ loquẽtẽ vult audire: ⁊
irasciƭ cito ⁊ grauiƭ se hꝫ ĩ nocte. vtaƭ rebꝰ tꝑatis: qñ veniet ad oppositũ
euadet. Si aspexerit. ☽ . fortuna. sꝫ si nõ ⁊ fuerit in aspectu marꝭ uel. ☉ .
absꝗ auxilio fortũaꝝ recadet: ⁊ cadet ĩ acutã febrẽ ⁊ pulsꝰ eiꝰ repieƭ vno
mõ. In ꝑ̀ncipio eni minutio ẽ necessaria. Si aũt ad. 45. gradꝰ fuerit aspe
ctꝰ fortunaꝝ alleuiaƭ: ⁊ eꝯ. uel ad. 90. uel ad. 280. ⁊ magis affligit eũ ĩfir
mitas ĩ nocte ꝗ̃ ĩ die: ⁊ parũ ꝗescit ⁊ clamat ⁊ anxiaƭ. Si fuerit fortuna ĩ
oppõe euadet: ⁊ si ĩfortũa mutaƭ ĩ aliaꝫ egritudinẽ ⁊ recadit. Et si debet
euadẽ euadet qñ. ☽ . venerit ad locũ ĩ q̊ fuit ĩ initio ĩfirmitatis. Et si fue
rit tũc fortunata euadet ⁊ eꝯ. Si aũt. ♃ . ⁊ satñꝰ fuerit cũ ea ĩ. 3ª erit mor
bus ꝯpositꝰ ex hũoribꝰ frigidis ⁊ tminabiƭ ĩ die. 4. Si aũt. ☽ . fuerit ĩ cã-
cro ⁊ satñꝰ ⁊ mars ⁊. ♀ . fuerit cũ ea ĩfirmitas actiõe uel deblitate. Da ei
res ꝯfortatiuas cũ ꝑuenerit ad. 4. aspectũ uel oppositũ: ⁊ si fuerit fortũa-
ta euadet ⁊ eꝯ. siƚiƭ ĩ oppõe. Sꝫ si fuerit ĩfortunata tũc determinaƭ. Et si
fuerit ei fortuniũ euadet cũ. ☽ . venerit ad locũ ĩ q̊ ĩcepit ĩfirmitas.

Leonis

CUm fuerit luna ĩ leõe ⁊ aspiciat eã. s. ex. 4º. uel oppõ
erit infirmitas ex humoribus corruptis uel flegmate vitreo: ⁊
malã habebit dispositionẽ stomachi. vnde nocet ⁊ sentiet do-
lorem capitis: ⁊ erit calor interius fortis: ⁊ exterius frigiditas
⁊ erit nimiũ constipatus: ⁊ erit infirmitas longa. Et cum luna ꝑuenerit
ad q̃rtũ aspectũ: ⁊ si nõ aspexerit eã morieƭ uel augmẽtabiƭ ĩfirmitas: et

si fuerit fortuna euadet. Si fuerit. ☽ .in leone et aspexerit eã mars i q̃rto aspectu uel oppositiõe erit ĩfirmitas ex abũdãtia sanguis et collere: et febris tertiane uel acute. Et si aspexerit eã fortuna euadet p⁹ magnã infirmitatẽ: et magnã fatigationẽ. Et male morieť qñ puenerit ad oppositionẽ leonis. sil'iť in. 4° aspectu. Luna vo i leone in. 4° aspectu. ☉ .uel marti existẽte. hẽbit magnũ calorẽ in pectore: et extrema ei⁹ frigescent: et hẽbit dolorẽ capitis. Opus ẽ ei minutio si põt qñ luna ẽ in illo signo. Sz si in illo signo nõ põt minuere dimittat donec venerit in medietate sui luis. Unge sibi pedes vnctiõe q̃ tollat sibi frigiditatẽ. Si aũt. ♂ .uel. ☉ .fuerit cũ ea in. 4° erit ĩfirmitas ex calore cordis: et qñ puenerit ad. 4. aspectũ si fuerit fortuna euadet: si infortuna morieť: uel recidiuabit ul' mutabiť in aliã infirmitatẽ. Qñ vo. ☽ .recedit de vno loco de locis q̃ diximꝰ et in uenerit iouẽ i itinere aut. ♀ .anq̃ꝫ veniat ad. 4. aspectũ opꝰ est cõponere balneũ: et i alto loco sedẽ. Sz si ipediat eã saturnꝰ impedit renes et vesicã Si aũt fuerit mercuriꝰ in. 4° cũ illis sigt turbationẽ sensus et infirmitatez aie. Cũ puenerit. ☽ .ad. 4. aspectũ si alleuieť infirmitas euadet: si augeť morieť. Sil'iť in oppõe et in. 4° aspectu et i eodẽ signo. Uirginis.

SI. ☽ .fuerit i vgine et saturnꝰ aspexerit ex. 4° uel oppõe in initio ĩfirmitatꝫ: patieť i stomacho et i vẽtre et i intestinis et hẽbit apostema merč. et erit ĩfirmitas occulta ꝙ vix poterit ġspiã eã cognoscere nisi sit astronomꝰ. Utať rebꝰ frigidis et tpatis et opꝰ ẽ ei ut sanet apostema: ita ꝙ nõ apiať ista ĩfirmitas futura et longa. Si vo fortuna eã aspexerit euadet pꝰ multos dies. Si ĩfortuna morieť ĩfra. 40 dies. Cũ. ☽ .fuerit i. 5° et aspexerit eã mars ex. 4° uel oppõe erit ĩfirmitas cũ magno calore interiꝰ ex abũdãtia colere: ut sũt disinterie uel fluxus vẽtris: et fluxꝰ ẽ ei fortis: et q̃nq̃ꝫ nõ inueniť anxietatẽ magnã patiť. hẽbit etiã malũ stomachũ. Est ğ ei necessaria medicina stiptica ↄfortãs: vtať q̃ꝫ rebꝰ leuibꝰ. Deť q̃ꝫ ei medicina leuis. Si aũt aspexerit eã fortuna euadet ĩfra. 3. dies: si ĩfortuna morieť. Cũ fuerit. ☽ .cursu vacua sigt fluxuz vẽtris et diarie et lienterie: et ipedimẽtũ vesice uel strãguiria ⁊c̃. Si ãt fuerit cũ ea. ♂ .uel. ☉ .uel. ♃ .tũc erit ĩfirmitas acutior et fortior cũ pturbatiõe sensꝰ et vix loqueť. Opꝰ est ei medicina q̃ paulatĩ fluxũ vẽtris restringat. Cũ ãt puenerit ad. 4. aspectũ uel oppositũ liberabiť p auxiliũ fortunaꝝ: et ğuabiť uel morieť p ipedimẽtũ maloꝝ. Si aũt saturnꝰ et. ♀ .et. ☿ fuerint cũ ea i initio ĩfirmitatis erit ĩfirmitas et durabit donec iterũ reuertať ad virginẽ uel ad. 4. aspectũ eiꝰ. Libre.

SI. ☽ .fuerit i libra: et aspexerit eã satñꝰ ex. 4° uel oppõe erit ĩfirmitas in capite et in pectore et pulmone. Et est maior infirmitas si fuerit luna decrescens: et dolebit eiꝰ frons et tempora: et rit ex repletione: et sternutabit multuz: habebit q̃ꝫ febres leues. Opus

est ei medicina tẽperata:⁊ cibo ⁊ poto leui vtať. Si autẽ aspexerit eam mars ex malo espectu morieť:⁊ si nõ:viuet. Et cũ ꝑuenerit ad q̃rtũ aspectũ liberabiť ꝑ aspectũ fortunarũ ⁊ ꝑ aspectũ malorũ grauabiť uel morieť. Si aũt aspexerit eã mars ex.4ᵃ uel oppositiõe:erit infirmitas ex sanguie:ut apostẽa uel pleuresis uľ ꝑiplemoniã: ⁊ habebit magnas febres ⁊ pulsus erũt vehemẽtes:⁊ in nocte videt pessimas visiões. Est eni ei necessaria minutio sanguis: ⁊ est ei opus medicina leuis:⁊ calor parũ vehemens:⁊ vigilie ⁊ turbatio mentis.⁊ si nõ aspexerit fortuna morieť infra. 20. dies. Si autẽ aspexerit fortuna euadet cũ ꝑuenit luna ad oppositionẽ sui loci. Cũ autẽ fuerit in cursu vacua habebit dolorẽ in pedibus ⁊ dolorẽ interius:⁊ oculos graues:⁊ balbutiet cũ loquiť. Erit ei medicina necessaria ⁊ dieta frigida ⁊ humida: ⁊ minutio sanguis. Cũ autẽ ꝑuenerit ad q̃rtũ aspectũ uel oppositũ liberabiť ꝑ fortunas:⁊ aggrauabitur ꝑ mala. Si aũt mars ⁊ sol eã aspexerit ex oppositiõe hec infirmitas erit valde magna:⁊ grauabiť magis in capite. Et si fuerit mercuriꝰ in.6. lachrymabũt sibi oculi:⁊ patieť dolorẽ in capite. Et medicina laxatiua ẽ ei necessaria. Cũ autẽ ꝑuenerit ad iouẽ uel venerẽ in diebꝰ creticis alleuiabiť ⁊ euadet:alioquin grauabiť ⁊ morieť.

Scorpionis.

SI luna fuerit in scorpione ⁊ aspexerit eã saturnꝰ ex.4.uel oppositiõe erit infirmitas ex sanguĩe putrefacto ⁊ de veneno. Et si nõ fuerit luna ĩ diminutiõe luminis ⁊ aspexerit eã infortuna morieť. Et si fuerit crescẽs in suo lumine ⁊ gradibꝰ ⁊ fortuna aspexerit eã viuet. Cũ autẽ luna fuerit in.7º. ⁊ mars cũ ea ⁊ iupiter aspexerit eã ex.4. habebit febrẽ validã. vnde necessaria ẽ ei medicina laxatiua tꝑata. Et cũ ꝑuenerit luna ad cõiunctionẽ iouis euadet. Cũ aũt fuerit luna in cursu vacua erit infirmitas leuis in p̃ncipio ⁊ ꝓ nullo habebiť: ⁊ augmẽtabiť ⁊ mutabiť in aliã egritudinẽ ut ipedimentũ vesice ⁊ iliorũ ⁊ hemoroidarũ:⁊ nascenť ei pustule ĩ naribꝰ. Cũ aũt lũa ꝑuenerit ad tertiũ aspectũ patieť febrẽ calidã:⁊ cũ ꝑuenerit ad solẽ si nõ obuiabiť ei fortuna morieť. Si aũt cõtulerit ei fortuna nasceť ei apostema ĩ ipocũdrijs ⁊ liberabiť. Cũ fuerit luna ĩ scorpiõe ⁊ mars cũ ea aut saturnꝰ. primo habebit infirmus febres calidas ex flegmate salso: Fac ut in die vadat ad sellã:⁊ non minuas ei sanguinẽ. Circa eũ ut decet cũ diebꝰ creticis. Si aspexerit eã fortuna erit crisis ad bonũ ⁊ ecõuerso. Si aũt in.4º.uel.7º uel. 10º.fuerit fortuna liberabiť.

Sagictarij.

CUm fuerit luna in sagictario ⁊ aspexerit eã saturnꝰ ex.4º.uel.7º. erit infirmitas ex flegmate:⁊ hꝫ calorẽ in toto corꝑe: ſꝫ pedes erũt ei frigidi. Durabit hec ĩfirmitas vſq; dũ luna iũgať satur

no nisi aspexerit eam fortuna: qꝛ si aspexerit durabit vsqꝫ qđ veniat ad oppositū loci in quo fuerat. Cū vo luna fuerit in. 8º ⁊ aspexerit eā mars ex. 4º aspectu uel opposito: ⁊ fuerit aucta lumine ⁊ numero erit hec infirmitas occulta: ⁊ medicus eā scire nō poterit ⁊ dolebit ei caput: ⁊ totum corpus: ⁊ ita accidit ei: qꝛ multum fuit in balneo: ⁊ nimiū se calefecit: ⁊ nimiū introiuit in pectus suū ⁊ in caput ⁊ alijs multuꝫ voluit ⁊ assellat. Opus ē ei medicina cōstipatiua. Utat̃ syrupi ⁊ leuibꝰ preacetosis: ⁊ vomet ⁊ patiet̃ fluxū nisi fortune aspexerint ipsā in. 4º uel. 7º uel. 10º uel. 11º ⁊. 24. die euadet. Si infortuna moriet̃. Cū autē luna fuerit in. 8º cū ioue ⁊ venere erit infirmitas ex reumate: ⁊ patiet̃ sitim ⁊ dolorem pectoris: ⁊ euadet cū venerit ad q̈rtū aspectū erit ei medicina mollificatiua necessaria. Caue ne balneat̃.

Capricorni.

Cum luna fuerit in capricorno ⁊ aspexerit eā saturnus ex 4º uel. 7º ⁊ fuerit decrescens gradibꝰ ⁊ lumine erit infirmitas ex nimia fatigatione sudorū: frigus post accepit euꝫ calor ē nimis clausꝰ ⁊ opillatus: ⁊ sternutat multū: frons ⁊ pectꝰ eius dolent. habet quoqꝫ febres ex sanguine. Utatur rebus temperatis ⁊ sirupo tēperato. Et si aspiciet eaꝫ fortuna euadet post longā egritudinē: ⁊ si non aspexerit moriet̃ vsqꝫ ad tres dies. Cū autē luna fuerit in nono ⁊ aspexerit eā mars ex. 4º uel. 7º significat abundantiā colere ⁊ malā digestionē stomachi: ⁊ dispositionē stomachi. Unde veniet ei vomitus: ⁊ fluxus ventris ⁊ disinteria: ⁊ ardebit ei stomachus: ⁊ inflāmabit̃ ⁊ habebit magnā febrē: ⁊ sudabit multum. Opus est ei medicina frigida: sꝫ pulsus nō inueniet̃ vniꝰ maneriei. Si aspiciant eā fortune euadet. Si nō moriet̃ vsqꝫ. 15. dies. Cum fuerit sol cū marte ⁊ aspexerit eā cū luna augebit calorē ⁊ infirmitatē. Erit aūt hec infirmitas ex nimia fatigatiōe ⁊ calefactione ad ignē: ⁊ accepit euꝫ ex colera citrina: ⁊ ꝑ auxiliū fortunarū euadet: ⁊ ꝑ impedimentū malorū moriet̃. Caueas a balneo ⁊ suꝑ ipsū nō fundat̃ aqua frigida.

Aquarij.

Cum luna fuerit in aquario addens suo lumine ⁊ gradibus: ⁊ aspexerit eā. s. ex. 4º uel. 7º infirmitas erit ex nimio labore: ⁊ perdet sanguinē: ⁊ hec infirmitas q̄nqꝫ crescet q̄nqꝫ minuet̃: ⁊ est timendū de eo ⁊ q̄n luna ꝑuenerit ad oppositionē si alleuiabit̃ viuet. Si augmētabit̃ viuet vsqꝫ ad. 42. dies. Et si fuerit cursu vacua erit infirmitas fortis in principio: ⁊ dolebit interius ⁊ erit infirmitas lōga. habebit quoqꝫ febrē calidā ⁊ multā patiet̃ anxietatē. Sꝫ q̄n lūa ꝑuenerit ad solē si aspiciēt eā fortune euadet: si mala: moriet̃. Aspice lunaꝫ q̄n

egredit̄ a sub radijs si inuenerit fortunā anteq̄ ꝑuenerit ad locū in quo incepit infirmari euadet infirmus: si non: moriet̄. Cū autē saturnus uel mercuriꝰ fuerit cū ea in. 10. erit īfirmitas de colera nigra. Et si luna fuerit addens sui lumine ⁊ gradibꝰ euomet. Et si aspexerit eā fortuna anq̄ ꝑueniat ad oppositū loci sui euadet.

Pisces.

Um luna fuerit in pisce addēs in numero: ⁊ saturnꝰ aspexerit eam ex. 4° uel. 7° erit infirmitas ex frigido: ⁊ patietur in capite ⁊ in ventre. Opus ē ei medicina calida. Si aspexerit eā fortuna euadet: sʒ dolebūt ei mēbra cū luna fuerit in. 11. addens sui lumine ⁊ numero ⁊ mars aspexerit eā ex. 4° erit infirmitas ex nimia repletiōe sanguis ⁊ colere. Et opus est ei ut minuat̄ sangnis: ⁊ minorē dolorē habebit i nocte q̄ in die: q̄ si non aspexerit eam fortuna in loco in quo accepit eum infirmitas moriet̄. Et qn̄ ꝑuenerit luna ad locū i quo erat: si venus aut iupiter fuerit cum ea euadet: si autē fuerit mars cum ea erit infirmitas ex colera ⁊ sanguie: ⁊ ꝑ auxiliū fortunarū ad lunā liberabit̄: ⁊ ꝑ nocumentum malorū moriet̄.

Hyppocratis libellus de medicorū astrologia finit: a Petro de abbano in latinū traductꝰ. Impressus est arte ac diligentia mira Erhardi Ratdolt de Augusta Imperante inclyto Johanne Mocenico duce Uenetorū: Anno salutifere incarnationis. 1485.

Uenetijs